





5.4.427



1860-1

Dr. David M. A. B. L. L. L.

Dr. David M. A. B. L. L. L.

Dr. David M. A. B. L. L. L.

Dr. David M. A. B. L. L. L.

Dr. David M. A. B. L. L. L.

Dr. David M. A. B. L. L. L.

Dr. David M. A. B. L. L. L.

5.4.427

LA FISICA
DEGLI ALBERI.

7...



LA FISICA DEGLI ALBERI

IN CUI SI TRATTA
DELL' ANATOMIA DELLE PIANTE
E

DELL' ECONOMIA VEGETABILE

Per servire d'Introduzione al Trattato completo dei
Boschi e delle Selve:

*Con una Dissertazione intorno al vantaggio, che si ritrae
dai Metodi della Botanica; ed una spiegazione dei termini
proprij di questa Scienza, e che si adoperano nel governo
dei Boschi e delle Selve.*

Del Signor DUHAMEL DU MONCEAU, dell' Accademia Reale
delle Scienze; della Società Reale di Londra; delle Accademie
di Palermo, e di Bifanzone; Onorario della Società d' Edimburgo
e dell' Accademia di Marina; Inspettor Generale della Marina.

OPERA ABBELLITA DI FIGURE IN RAME

P A R T E P R I M A .



I N V E N E Z I A

Nella Stamperia di CARLO PALESE

M D C C L X X I V .





P R E F A Z I O N E .

NELLA Prefazione al Trattato degli Alberi e degli Arbusti, già da alcuni anni pubblicato, ho detto, che i due presenti libri formar dovevano una parte di un Trattato generale dei Boschi, ch'io sto attualmente lavorando. Ho parimente avvertito, che il Trattato della Fisica degli Alberi, che ora si presenta al Pubblico, doveva, come una specie di Preliminare, che in sè contiene gli elementi d'una scienza, di cui gli alberi e gli arbusti non ne formano che una sola porzione. Credendo io non esser bastante lo acquistare solamente delle notizie vaghe e staccate, le quali altro non farebbero, che imprimere delle idee confuse, ma che far debbasi, per così dire, un corso completo dei Boschi e delle Selve, perciò, per facilitarne i mezzi, ho reputato opportuno l'espore in questa Prefazione, e prima d'entrare nel dettaglio di ciò, che i nuovi presenti Libri contengono, una idea delle diverse diramazioni, che colla di loro unione la scienza delle Piantе costituiscono, e che Botanica si appella, oppure, un compendio dei varj oggetti di cui m'accingo a trattare in tutti quei libri, che formar debbono un Piano intiero intorno alle Boscaglie.

La cognizione delle Piantе, che la terra rivestono, o che dalle acque spuntano, ella è una scienza molto estesa, e difficile, quando non si chiami in soccorso quella parte della Botanica, che *Nomenclatura* si chiama. Vano sarebbe ogni sforzo d'ingegno per chi come inutile mostrarla volesse, poichè forza è l'accordare, che lo studio della Nomenclatura deve preceder quello degli altri rami di questa scienza. Ed infatti, come si potrebbe ritrar dalle piante ogni possibile vantaggio, se prima queste non si conoscessero; e come conoscerle, se prima non si pensasse ad ajutar la memoria col soccorso dei metodi?

Vero si è, che la Nomenclatura è il sapere i nomi delle piante; ella però non consiste semplicemente nel saperne i nomi, ma deve anche guidare a conoscere le piante in se stesse. Non farebbe certamente considerato come un Nomenclatore, quegli che si contentasse di caricar la memoria di tutti i nomi e Sinonimi del *Pinace* (*), senza poi saperli giudiziosamente applicare alle piante, che al di lui sguardo presentansi.

Uno che dimori in Campagna giunge a conoscere quelle piante che ha sempre sotto degl'occhi; fa anche, per distinguere le une dall'altre, assegnar loro i nomi. Egli per esempio chiamerà *Rossiste*, *Turchinette*, *Girasoli*, *Viole Mammo-le* ec. ed è pur questa una specie di Nomenclatura, ma non può esser buona se non per chi l'ha fatta, nè potrà estendersi se non ad un piccolo numero di piante. Non è però così del vero Botanico: egli fa adattare i nomi a tutte le piante, che se gli paran davanti, perchè conosce la cosa a cui il nome convenga. Ed infatti, i metodi, che lo guidano lo mettono in necessità di considerare e di scolpire nella memoria le differenti parti delle piante ch'egli si propone di conoscere. Se il caso gli presenta qualche pianta incognita ai Botanici, questi metodi appunto gli accennano quali sieno i nomi a quella convenevoli. Oltre di che; tali metodi lo pongono in istato di farsi intendere dagli altri Botanici, e di parlar con quelli un linguaggio universalmente conosciuto. Non è per altro la Nomenclatura l'unica meta a cui tendono i Botanici, ma ella è un mezzo importante ed indispensabile per acquistare le più utili cognizioni: ella è, per dir così, un vestibulo, per cui devesi necessariamente passare, prima di giungere a quegli appartamenti, che formano l'immediata abitazione d'un bel Palazzo. Ciò farà trattato in un Articolo a parte.

Dopo di aver conosciute quelle Piante, che esser ci possono di qualche utilità, pensar bisogna a moltiplicarle. I

Kali

(*) Il *Pinace* di Gasparo Bavhino, contiene non solamente tutti i nomi delle Piante conosciute al suo tempo, ma ancora i loro Sinonimi.

Kali, i quali naturalmente crescono sulla riva del mare, non basterebbero a somministrare tutta la soda, che si consuma in Francia: tutte le radiche della Robbia, che cavar si potrebbero dai Boschi e dalle Vigne, ove ella nasce spontaneamente, non basterebbero a supplire al consumo delle nostre Tinture: Costretti saremmo a mangiare uno scarso numero di frutta di mediocre sapore, se avessimo quelle soltanto che vengono nei Boschi: l'erba dei campi non è gran cosa, confrontata con quella che somministrano le coltivate praterie: e soffriremmo la penuria dei Boschi, se non si coltivassero e rinnovellassero.

Ognuno sa quanto necessaria sia l'attenta cura delle Vigne, che ci donano la nostra più grata bevanda, e de' grani che formano la principal parte del nostro alimento. Basta questo per far comprendere quanto estender si debbano le ricerche dei Botanici sulla Cultura delle Piante, e non già nei soli giardini dei particolari, i quali dar non possono, che poca quantità di Piante, ma in grande, e nelle vaste Campagne, per procacciarsi poi delle copie raccolte. Non devono per altro le cognizioni Botaniche essere solamente limitate a quelle Piante, che si contentano dei nostri climi, ma devonsi anche sforzar la natura, per giungere ad allevare sotto i coperti e nelle conserve le straniere Piante, col soccorso dei letami e strami, e delle stufe. Non cercherà il più delle volte un Botanico di coltivarne un gran numero per porle in uso; ma coltivando pochi capi, giungerà almeno a conoscere le piante utili, che ci vengono dai lontani paesi, seccate, o in varie guise preparate. Non è forse utile il poter conoscere le piante, che ci somministrano la scorza della Cannella, della Quinquina, i grani del Caffè e del Cacao, l'estratto dell'Aloe, la Scamonea, il Mastiche, il balsamo del Perù ec. Oltre il diletto che provasi nel sapere d'onde ci vengano le droghe che adoperiamo, può l'analogia guidarci a scuoprire, o nel proprio nostro Paese, o nelle nostre Colonie o Provincie, qualche pianta che aver potrebbe le medesime proprietà: poichè questo particolar diletto, che conduce all'Analogia, tanto pericoloso per gli

spiriti troppo sistematici, ma di cui un'uomo savio, e nemico d'una precipitosa rapidità non abusa quasi giammai, può ridondare in massimo vantaggio della umanità; ed io son persuaso, che se la Botanica fosse una scienza più familiare e più estesa, si troverebbe nei Boschi di Cajenna la China-china, e forse qualche albero equivalente a quelli, che producono la Vernice della China.

Aggiungasi ancora, che se si coltivassero a solo oggetto di puro divertimento, le straniere piante, popolar si potrebbero le nostre Colonie d'alberi vaghi o utili, che allevati prima fossero nei nostri serbatoj. In questa guisa appunto fu introdotto il Caffè in tutte le Colonie della Francia: e quante altre piante ancora, come il Caffè, somministrar potrebbero nuovi rami di Commercio!

Chi si applica solamente alla cultura d'una sola specie di pianta, senza molta penetrazione d'ingegno, e quasi senza talento, può coltivarla a meraviglia, seguendo solo il metodo tramandatoli dai suoi antenati: così appunto il Vignajuolo coltiva le Vigne; l'Agricoltore il formento; l'Abitato del Gattinese lo Zafferano; quello della Zelandia, la robbia, ec. Ma dovendosi le mire d'un Botanico estendere sopra certe piante di natura assai diversa, egli deve farla da Fifico, e formarfi dei principj generali, che lo conducano in tutti i suoi tentativi, non abbandonandosi già a dei sistemi puramente immaginarj, che deviar lo farebbero dal giusto cammino, ma col dirigere tutti i suoi passi coll'esperienza e coll'osservazione: egli immaginerà coll'ingegnoso suo spirito nuovi esperimenti, e col suo giusto raziocinio ne tirerà dell'esatte conseguenze.

Se le cognizioni nostre intorno alla vegetabile economia fossero più estese, ragionerebbero anche più rettamente intorno ai mezzi di alimentar le piante e di farle venir belle e vigorose. Quanto più sono i medici esperti nell'anima- le economia, con tanta maggior felicità esercitano l'arte loro. E sebbene non si sieno fino al presente acquistate tutte le notizie possibili della vegetabile economia, forza è per altro l'accordare, che chi le ignora è men capace di ben rego-

rego-

P R E F A Z I O N E .

IX

regolare la cultura dei Vegetabili , di quelli , che le hanno acquistate . Scansiamo dunque due scogli , nei quali troppo spesso si urta . Alcuni lasciando troppo libero il freno alla immaginazione , e persuasi di saper tutto , pieni d'orgoglio si confondono e si smarriscono : altri sapendo in generale , che le umane cognizioni riguardo a moltissimi punti sono assai limitate, si credono esenti dallo imparare qualche cosa , e rimangono nella inerzia addormentati, sforzandosi di giustificare la di loro ignoranza con un'affettato apparato delle molteplici difficoltà non superate fino al dì d'oggi dai più instancabili Osservatori . Raguniamo tutte le possibili cognizioni; ma siamo sempre sinceri , e guardiamoci bene dal vantarci più abili di quello che siamo realmente . Guardiamoci soprattutto dall'imitare quegl'inerti Botanici puramente speculativi, i quali stanno con indolenza seduti nel di loro gabinetto aspettando che i Brevini, i Clusi, i Dalescampi, i Ray, i Turneforti, i Linnei abbiano accumulate le osservazioni e l'esperienze di cui credono di poterne disporre a capriccio colla loro fantasia . Se essi vanno niente lavorando colla loro fantasia, ella fa loro prendere le apparenze per cose reali, e le cose appena probabili per verità dimostrate: simili a quei fuochi fatui accesi per l'aria, che lampeggiano, abbagliano, cadono e in un momento si spengono . Questi Autori vagano e con bella alterezza passeggiano; ma presto l'illusione sparisce, ed invece di Filosofi profondi, altro non compariscono che uomini accesi dal fuoco d'un'entusiasmo, che suggerisce loro dei raziocinj imperfetti sopra certe cose, che hanno appena vedute . E non è già che molto pregiar non si debba una vivace immaginazione, e quella facoltà dello spirito, che sagacità si appella; ma deve per altro questa preziosa facoltà esser sempre regolata e diretta dalla osservazione . Cosa utilissima egli è, anzi necessaria l'informarsi e lo studiare le opere degli Autori, che vissero avanti di noi; ma congiungervi bisogna uno studio costante della natura, per poter trar profitto da quanto i passati Autori raccolsero, e per giudicar di quanta fede e credenza essi sien degni .

• Quan-

Quando ci affatichiamo col foccorfo della Nomenclatura a ben conoscere le piante, quando studiamo la coltivazione di queste per poi moltiplicarle; ciò facciamo coll'oggetto o dell'utile, o del piacere. Ed a che servirebbe il conoscere le piante tutte, che la terra ricuoprono, ed il moltiplicarle col mezzo della cultura, quando applicare non si sapessero agli usi umani? Tutto ci persuade a credere, che nulla d'inutile uscito sia dalle mani del Creatore; dal che deducesi non esservi pianta alcuna, che dotata non sia di una qualche particolar proprietà. Ma oltre al non essere a noi concesso di limitare le mire dell'Autore della Natura, e di decidere se tutto il creato abbia un rapporto immediatamente applicabile agli umani bisogni, abbiamo delle prove evidenti, che molte piante, che in verun modo direttamente servono all'uso nostro, ci riescono per altro utilissime e in varie occorrenze necessarie; per esempio, prescindendo dall'uso che si fa delle frutta del Moro, come alimento, e in medicina come rimedio per i mali di gola; prescindendo anche dall'uso che far si può dei filamenti della scorza del detto albero, per far delle corde, e del suo legno per usi diversi; le sue foglie nutrono un'insetto, che ci somministra la materia dei nostri vestimenti più belli. Supponghiamo che ignoto ci fosse l'uso della Seta, ci crederebbero in diritto di considerare il verme, che ce la dona come un malefico insetto, ed ignota ci sarebbe la maggiore utilità della foglia del Moro. Basta questo solo esempio per provare, quanto temerario farebbe chi trattar volesse con dispregio le produzioni più piccole della natura, l'uso delle quali ci rimane per anche sconosciuto: ed il vero Filosofo in vece di disprezzar questi esseri, che non sembrano fatti per altro, che per nostro danno, gli esamina attentamente e gli osserva; con ogni cura gli studia; e quelle ricerche, che a buon'ora sembravano semplici e vane curiosità, il più delle volte conducono a molte preziose scoperte.

Furono i soli Filosofi osservatori quelli che per molti anni pieni d'ammirazione videro le particelle del ferro attaccarsi ad una certa pietra che loro presentavasi. Essi furono
i fo-

P R E F A Z I O N E .

xi

i soli ad esaminare con attento sguardo le circostanze , che accompagnavano un fenomeno cotanto singolare; e finalmente si è resa loro manifesta la direzione della calamita: ed ecco una norma per dirigere il sentiero in mezzo ai mari . Ed era parimenti riservato ai soli Filosofi il potere attentamente riflettere sopra la singolar discordanza, che risulta dal mescolglio del Salnitro con una materia di carbone . Da questo studio, che sembrar poteva frivolo e ridicolo a certi spiriti vivaci troppo ed incapaci di lungamente fermarsi su d'un oggetto medesimo , è uscita fuori quella maravigliosa composizione , che scaglia per lunghissimo tratto la bomba, la quale dopo essersi sollevata sopra i più alti ripari, e per fino sopra le più erte montagne , ricasca come dalle nuvole nel centro d'una Fortezza in cui ella porta l'incendio e l'estermio . Tali scoperte cotanto luminose , rare sono , il confesso; ma finalmente non si acquistano se non a forza di studio, d'applicazione, e di stento; e quei casi fortuiti, a cui si sogliono attribuire molte scoperte, non sono in verun conto favorevoli a quelli , che disprezzano l'osservazione . Oltre di che , quand'anche mancasse a noi la speranza di giungere a così grandi scoperte, non dobbiamo tuttavia esser paghi e contenti, se le nostre fatiche ci guidano a qualche cosa che ci arrechi vantaggio? Tutto ciò, che tende ad un tal punto è pregevole; ed agli occhi d'un Filosofo non vi è nulla di piccolo, qualora risultare ne possa dell'utile alla società. Vedrassi, per esempio, nella presente Opera, che il Muscolo che si calpesta, che fa perir l'erba nei prati, che reca agli alberi a cui s'attacca più danno che giovamento, egli può nondimeno far le veci d'un terreno fertile, ed avendo egli la proprietà di ritenere l'umido senza fermentare, e difficilmente venendo fracido, può utilmente impiegarsi a conservare le piante, che dai lontani luoghi trasportansi . Non è già questa una scoperta luminosa, che confrontar si possa con quella della bussola , nè della polvere; anzi la estrema differenza appunto, che tra questi due oggetti ritrovasi, si è quella che mi induce a scegliere un tale esempio, per far conoscere, che agli occhi d'un Cittadi-

no

no filosofo basta che una scoperta sia utile per non essere in verun modo spregevole .

Ben vedesi ch'io non intendo già di limitare l'utilità delle piante, nè agli usi della sola medicina, nè agli alimenti. Un copioso numero di Scrittori, che hanno trattato dei Verzieri e degl'Orti, poco o nulla lasciarono da aggiungere intorno al vantaggio che si può ricavare dai vegetabili per il nutrimento degli uomini: e siccome la maggior parte dei Botanici furono anche medici, quindi si sono essi diffusamente estesi nell'esame delle medicinali proprietà delle piante. Credo dunque di poter fare a meno di discorrere espressamente di questi due rami preziosi della Botanica: ma quanti altri vantaggi mai ritrar non si possono dalle piante relativamente alle Arti diverse? Gl'olj, i balsami, le ragie, le gomme, che si cavano dai vegetabili somministrano degli aromi, delle vernici e delli smalti di somma utilità. La maggior parte dei colori si ritraggono dal regno vegetabile: addurrò solamente per esempio il Guado, l'Indaco, la Robbia, il Girasole, il Pastello gialletto, l'Azzurro, la Cocciniglia, i legni da tingere. Quanti Artisti, Taglialegne, Segatori, Fenditori, Facitori di Zoccoli, Falegnami, Carradori, Intarsiatori, Tornitori, Scultori, Ebanisti, Scrolaj, Bottari, Stacciaj sono impiegati a lavorare i varj legni? S'aggiungano a questi gli usi di diletto; gli smalti dei fioriti giardini, la bella verzura dei margini, le striscie e i contorni che formano i disegni dei giardini, gli arboscelli, che adornano i viali erbosi ove si gioca alle palle, le spalliere alte e basse che formano i boschetti, i pergolati, che tanto abbelliscono i giardinetti, i Filari, le Quinconce, i Mucchietti degli alberi, i gran viali che formano l'ornamento più bello delle ville e dei Castelli.

Da quel poco che ho accennato, ben vedesi l'estensione e la immensità degli oggetti dello studio d'un Botanico, e il reale vantaggio, che sperare si può dalle di lui fatiche. Una sola parte di questa scienza è stata bastante a far spendere la intiera vita ai più luminosi talenti. I Cesalpini, i Morisoni, i Ray, gl'Ermanni, i Boeravi, i Rivini, i Ru-
pini,

P R E F A Z I O N E .

XIII

pini, i Ludwigi, i Knauzi, i Turneforti, i Magnoli, il Linneo; tutti questi grand'uomini, non trascurando per altro le altre parti della Botanica, si sono principalmente applicati alla Nomenclatura. E cosa mai in tal genere non dovremmo noi sperare dal Signor Bernardo di Jussieu, qualora volesse egli risolversi a pubblicare una Teoria generale, da tanto tempo desiderata, e con tanta lode annunziata da quei Saggj, che egli va giornalmente comunicando ai suoi Discepoli? Io ben sò, che il sommo scrupolo, con cui egli giudica le cose sue, lo trattiene dal regolare un'Opera ch'egli per anche non crede perfezionata; ma le lievi macchie, da lui solo forse conosciute, farebbero bastevolmente compensate dal copioso numero delle rilevanti osservazioni, dalle giudiziose ricerche, e specialmente dai suoi principj d'analogia tanto atti ad estendere le cognizioni ed a perfezionare la scienza.

I Chiusi, i Lobeli, i Bavhini, i Dalescampi hanno composti dei gran Libri, in cui leggonfi molte belle descrizioni, e molti importanti dettagli sopra gli usi, e specialmente rapporto alla Medicina. Il Grewio, il Malpighi, il Perreault, il Mariotte, il Dodard, i Signori Halles, Bonnet, e Guettardo hanno rivolte le loro mire verso la Fisica delle Piante: molti Autori insomma hanno trattato della Cultura di quelle. Io mi limito nel presente Trattato ad argomenti molto ristretti: l'oggetto mio si confina tra gli alberi e gli arborescelli, che forger possono liberamente dalla terra; e nella Prefazione di due libri già da me pubblicati ho addotte le ragioni che mi hanno impegnato a comporre il presente lavoro. Io l'ho intrapreso ad oggetto di far sapere a quei particolari, che piantar vogliono i Parchi, estendere i boschi loro, ed abbellire i terreni di deliziosi passeggi, il modo di conoscere quegli alberi che più atti sono a compiere i loro disegni. Ho a tale oggetto fatto uso delle descrizioni generali e delle Tavole metodiche: ho accennata la particolar cultura a ciascheduna specie d'albero conveniente; e per allettare i detti Particolari ad abbracciare un'oggetto cotanto utile, ho fatto loro conoscere il vantaggio che

che ritrarre ne possono da ciaschedun'albero. Ma non averi-
do fatto altro nei due già pubblicati volumi, che toccar di
passaggio la maggior parte di questi oggetti, mi restava an-
cora l'impegno di entrare in certi dettagli, utili certamente
a chiunque voglia allevare, moltiplicare, e lavorare con eco-
nomia e guadagno le proprie boscaglie: questo sì è il fine,
ch'io mi sono proposto nei libri ch'io son per dare: pro-
curerò in quelli d'adempire e di esporne tutto ciò che bra-
mar si possa intorno a questa parte del mio lavoro, che può
riguardarsi come la meta veramente utile ove giunger si bra-
ma. Ma essendo mia intenzione di spianare, per quanto
io potrò, tutte le difficoltà, e di porre i Cultori dei boschi
e delle selve a portata di fare uno studio continuato, me-
todico e ragionato di quella parte della Botanica, che gli
risguarda, ho creduto opportuno, che per far meglio com-
prendere tutto ciò ch'io dovrò dire in appresso, cadesse in
acconcio il considerare gli alberi come corpi organizzati. E
questa sì è appunto la ragione, per cui in questa nuova Opera
io presento una Esposizione anatomica delle diverse parti de-
gli alberi, e l'accompagno con delle ricerche intorno agli
usi loro, rapporto alla vegetabile economia. Sperare ardisco,
che il Quadro ch'io m'accingo a pingere di tutte quelle
cose che formano il principale soggetto del libro ch'io pre-
sento al Pubblico, sarà giudicato non indegno anche dell'at-
tenzione di quelli, che direttamente non si occupano nell'
allevare e mantenere vegete le proprie boscaglie.

D'uopo è il ricordarsi, che in fronte del Trattato degli
Alberi e degli Arbutti, ho esposte alcune Tavole metodiche,
atte a porre anche quelli, che Botanici non sono, in istato
di ridurre al loro vero genere gli alberi e gli arbutti, che
non conoscono. Ma inutile farebbe a quelli un tale aiuto,
se omettessi di dar loro una idea precisa di ciò, che inten-
der si debba per *Metodo di Botanica*: adempio a questa ne-
cessità con una Dissertazione a parte, che ho posta dopo la
presente Prefazione. Dopo di aver trattato in generale dei
Metodi di Botanica, molti altri ne riporto, che furono pub-
blicati dai più Celebri Botanici d'Europa; e principalmente
in-

P R E F A Z I O N E .

xv

insisto sulla parte di quei metodi, che riguarda gli alberi e gli arbusti, acciò questi varj metodi concorrer possano con quelli da me dati nei miei primi Libri, a facilitare la perfetta cognizione di quei vegetabili che si ritrovano nelle Selve, nei Boschi e nei Parchi.

Rimaneva ancora da superare un'altra difficoltà, che avrebbe forse impicciato quelli che sperato avessero di trar profitto dalle mie fatiche. La Botanica, anch'ella come tutte le altre scienze, ha il suo particolar linguaggio; e si serve di certi termini e nomi non intesi se non da quelli che prestata v'abbiano una speciale applicazione. Per rendere intelligibile il mio lavoro anche a quelli, che notizia alcuna non abbiano della Botanica, mi sono ingegnato di definire, nel corpo dell'Opera, tutti i termini di questa scienza; ed ho oltre a questo fatto un ristretto vocabolario in cui vedesi la definizione di quelle parole, che non caddero opportune per essere espressamente spiegate nei miei libri.

Sembreranno forse noiosi alcuni dettagli, in cui mi fu forza d'entrare, a que' che non curansi di conoscere pienamente gli alberi e gli arbusti, e i quali non vorrebbero leggere se non ciò che precisamente spetta alla Fisica dei vegetabili; ma fu questo un'inconveniente impossibile ad evitarsi. E' sempre noioso e prolisso un libro per chi si contenta della superficie delle scienze; e sembra troppo conciso a chi cerca di penetrarvi fino nei più intimi fondamenti.

P I A N O D E L L ' O P E R A

L I B R O I.

NON si può stabilire fondamento alcuno, nè ragionevolmente discorrere intorno all'uso delle parti organiche degli alberi, se prima non si acquisti un'idea di tali organi considerati in se stessi, e indipendentemente da qualunque ministero; e perciò io comincio dal dare un'anatomica descrizione del tronco, dei rami e delle radici degli alberi. Queste parti sono generalmente formate della scorza, del corpo

po legnoso, e della midolla. In quanto alla scorza, esaminò l'epidermide, poscia la sostanza, che immediatamente trovasi situata sotto l'epidermide, o cuticula, la quale io chiamo *Involuppo Cellulario*; finalmente gli strati reticolari della scorza, i quali formati sono di vasetti linfatici, di vasetti che racchiudono un sugo, che diverso si manifesta in ogni pianta: poichè in alcune egli è gommoso, in altre resinoso, ed in altre latteo; e perciò *proprio* vien detto, a somiglianza de' vasi che lo rinferano. Oltre di questi vasi, si scorge anche una tessitura cellulare, vescicolare o parenchimatica.

Dopo di aver trattato in dettaglio delle diverse parti componenti quel generale involuppo, che *scorza* o *corceccia* s'appella, passo all'esame del corpo legnoso, in cui si scorgono, come appunto nella scorza, dei vasi linfatici, dei vasi proprj, e la cellulare tessitura: oltre a ciò vedonsi alcuni vasi fatti a spirale, detti *Trachee*. L'esame del legno ci apre necessariamente la strada a parlar dell'Alburno; e dopo di aver provato, ch'egli è un legno imperfetto, io esaminò, negli alberi di età diversa, la di lui conversione in legno, e la proporzione, che a un dipresso passa tralla grossezza dell'Alburno e quella del legno, non altrimenti che tralla grossezza della scorza, e quella del corpo legnoso. Non discorro in questo Libro della formazione del legno; ma pure dimostro, che il legno è formato dall'aggregazione di molti strati o anelli, che scambievolmente s'intrecciano, e siccome questi strati non sono tutti di una uguale grossezza per tutta la circonferenza del corpo degli alberi, ho giudicato conveniente di spiegare d'onde dipenda una tale eccentricità.

Sebbene abbia parlato sul principio di questo Libro, dei vasi, i quali col di loro intralciamento formano la tessitura della corteccia, e del legno, come pure dei diversi liquidi umori, che nei detti vasi racchiudonsi, torno ad esaminare particolarmente questi oggetti diversi; lo che m'apre il campo a trattare più precisamente della linfa, del sugo proprio, dell'aria nelle piante racchiuse, e dei vasi medesimi, per esaminare se questi veramente sieno tubi vuoti, oppure fili agevolmente paragonabili a quelli d'una matassa.

Av-

Avvertasi per altro, che queste varie questioni acquisteranno luce maggiore da quanto si dirà in appresso; poichè tutti gli organi componenti un' istesso corpo sono talmente tra di loro legati, che impossibile rendesi il poterli considerare indipendentemente dai rapporti che hanno tra di loro.

Le barbe o radici, e i rami, sono generalmente organizzate come il tronco degli alberi; ma pure era d'uopo il trattarne particolarmente, per far vedere qualche singolarità che lo sviluppo loro accompagna, sebbene una tal questione debba essere espressamente trattata in un altro luogo del presente Libro; il quale termina coll'esame della proporzione, che vi è tralla grossezza del tronco d'un'albero, e quella dei rami che da quello spuntano.

L I B R O II.

ESAMINATA nel primo Libro l'organizzazione del tronco e dei rami degli alberi, passo alla discussione delle parti, che i detti rami adornano e rivestono: e per conseguenza nel secondo Libro si parla dei bottoni del legno, delle foglie, dei peli, delle spine, e delle mani o viticci. Ognuno conosce le gemme o i bottoni degli alberi; e generalmente si sa, che si aprono a Primavera per produrre i rami novelli, le foglie e i fiori; ma entro in quei dettagli, che versano sulle loro varie positure riguardo ai rami che gli sostengono, e intorno alla forma loro, che è molto varia negli alberi di diversa specie. Mi servo poi della strada della dissezione per mostrare in dettaglio l'organizzazione dei bottoni, nel di cui centro scorgonsi gli embrioni del ramo, e alcune foglie che sviluppar debbonsi a Primavera. Appena aperti i bottoni, compariscono le foglie; e già veggonsi in varie forme piegate entro i bottoni: alcune son piegate in due, altre a guisa di ventaglio; altre come la carta d'una lanterna, altre raggrirate e rivolte sopra di loro. La positura delle gemme indica quella dei rami, e questa quella delle foglie; ma molte foglie corredate sono nel gambo o sia picciuolo di due o tre piccole foglie chiamate *Stripule*.

: PARTE I.

b

Sem.

Sembra che alcune piante sieno senza foglie ; ma quasi tutte ne sono adorne . Accenno quali sieno i loro stati diversi nel tempo del loro sviluppo , e quello dopo , che giunte sono alla di loro perfezione . Quelle delle diverse specie degli alberi hanno le forme molto variate ; e perciò mi sono indotto a distinguerle in foglie semplici , e in foglie composte : tanto l' une che l' altre , sono o lisce , o pelose , e quasi sempre di colore assai vario . Alcune son piccole e finiscono in una punta ; altre strette e filamentoze ; altre più o meno larghe , relativamente alla di loro lunghezza ; ve n' ha di quelle di contorno unito ed uguale , altre con orlo merlato o dentato , tagliato , o tagliuzzato , o intaccato ; e quando questi intagli si prolungano fino alle nervosità del mezzo , fanno le foglie composte , le quali formate sono di molte foglioline attaccate ad un nervetto o fusto comune . Entrando nel dettaglio intorno all' anatomia delle foglie , faccio vedere , che la distribuzione dei vasi influisce sulla di loro forma diversa : dopo di aver fatte osservare alcune singolarità , che appartengono ai picciuoli delle foglie , e alla inserzione loro sui rami , esaminò quali sieno le cause , che cagionar possano la caduta delle foglie , la quale può esser considerata come una muta o vicenda vegetabile molto singolare .

Non ha l' Autore della Natura formato con tanta provvidenza ed arte questo gran numero d' organi , perchè inerti rimangano : tutti i Fisici hanno dato loro qualche particolare attributo relativo alla vegetabile economia ; ma v' è chi ha considerate le foglie solamente come involucri atti a formare una util difesa ai frutti ed ai fiori ; altri han creduto , che il sugo ricevesse entro le foglie alcune preparazioni per renderlo poi più atto ad alimentare gli alberi , ed i frutti qualora torna a scorrere per i vasi loro . E' stato anche detto , che le foglie atte fossero ad attrarre l' umido dell' aria , per poi dispensarlo alle piante ; sono finalmente state considerate come gli organi secretorj dei vegetabili . Esaminando queste varie opinioni , mi sono impegnato a trattare diffusamente della traspirazione sensibile ed insensibile

bile delle piante , e ad esaminare se in certi casi le foglie agiscano d'accordo colle radici, per alimentar le piante con quell'umido che tirano a sè; ed intanto faccio vedere, che in certe circostanze particolari, vi sono alcune foglie destinate a somministrare una porzione della loro sostanza alle produzioni che dalle piante ne vengono, quasi appunto come il grasso degli animali serve per qualche tempo a nutrirli. Esamino finalmente se possano esser le foglie considerate come i polmoni delle piante, come alcuni Fisici hanno creduto; e con tale occasione io tento di conoscere per quale strada possa l'aria introdursi nei corpi dei vegetabili.

Le precedenti questioni mi hanno impegnato a parlare delle ghiande e dei peli, considerati da alcuni Autori come tanti vasi escretori, e da altri come tanti vasi assorbenti. Le mani o viticci di cui le fermentose piante si servono per arrampicarsi ai corpi solidi, che sono a quelle vicini, siccome questi, come le spine, attaccati sono ai rami, far dovevano una parte dell'oggetto di questo secondo Libro; e quindi riporto le osservazioni a questi spettanti, e faccio rilevare, che alcune spine possono, tanto per gli usi loro, quanto per la loro organizzazione esser paragonate all'unghie degli animali.

L I B R O I I I .

Di mano in mano che mi vado inoltrando nell'Opera, mi si affacciano delle questioni di maggiore importanza. Occorre di parlare in questo terzo Libro degli Organi della fruttificazione; e per prender la cosa più da lontano che sia possibile, incomincio dall'esame dei bottoni d'onde spuntano i fiori. Dissecandoli con diligenza, scorgonsi nei bottoni, non solamente i fiori, ma anche le particelle di cui sono essi composti; petali, stami, pistilli, nella base dei quali veder si ponno, in certi frutti, i noccioli e gli acini o granelli. Entro poscia nell'esame particolare delle parti componenti i fiori completi, i calici, i petali, gli stami, le cime loro, o le antere, le polveri, i *Nectarium*. Indi parlo dei

fiori non completi, una parte dei quali altro non ha che stami, ed un'altra non ha che pistilli. Seguendo in una ricapitolazione tutti i cambiamenti, che accadono alle varie parti dei fiori, dal momento in cui si ponno distinguere nei bottoni, fino alla intiera loro distruzione, veggonsi tutte le parti ora indicate succcessivamente perire; e finalmente altro non rimane, che l'embrione o il frutto novello, il quale venendo grosso va diverse forme prendendo. Non basterebbero volumi immensi, se riferir si dovessero tutte le osservazioni che far si potrebbero sull'anatomia dei frutti; e perciò mi son ristretto a dar solamente una esposizione anatomicamente esatta e dettagliata d'un frutto cogli acini o granelli, e d'un frutto col nocciolo, ed ho accennato qualche cosa dei frutti capsulari.

Dopo di aver fatto vedere, che i fiori e i frutti formati sono di molti organi inservienti alla fruttificazione, concludo, che gli stami ed i pistilli sono specialmente necessari alla formazione dei semi. Ma qual'è il ministero di questi organi? Siccome su di ciò diverse sono le opinioni, ho creduto opportuno di esaminarle; e questo esame appunto mi ha fatto strada a discorrere della gran questione del sesso delle piante. Sono inclinato ad ammettere l'esistenza dei due sessi, e la necessità che ambedue concorrano alla produzione dei semi fecondi. Gli stami sono gli organi maschi, i pistilli sono le femmine: stanno insieme questi due organi diversi nei fiori ermafroditi, e divisi stanno in quei fiori, che sono o solamente maschi, o solamente femmine. Vero si è, che vi sono alcune piante, nelle quali questi organi sono per anche ignoti, e ne riporto qualche esempio. Ma ammessa, che una volta sia la differenza dei sessi, naturalmente accader dovranno alcuni mescoli, in virtù delle fecondazioni, che faranno nascere alcuni alberi, per così dire, *bastardi*. Su di ciò m'estendo in qualche dettaglio, e procuro di far conoscere, che le mostruosità delle piante quasi sempre dipendono da alcune cause molto diverse da quelle, che producono le nuove specie o varietà di frutti.

P R E F A Z I O N E .

XXI

L I B R O I V .

BEN chiaro vedesi, che l'ufficio di tutti gli organi della fruttificazione consiste nel formare dei semi atti a moltiplicare le specie. Si ponno dunque paragonare i semi agli ovi degli animali, ma ad ovi già covati, nei quali è formato l'animaletto intiero. Oltre i principj del fusto, e della radice che si trovano nei semi, vi si scorgono anche certi organi che chiamansi *Lobi*, e che possono essere considerati come tante mammelle, il di cui ufficio si è di alimentare la pianta tenerella fintanto che abbia ella spuntate in terra radici bastanti ad attrarne il necessario alimento. Ponendo un seme sotto terra, questi lobi s'inzuppano d'umido, si gonfiano, aprono i loro inviluppi, e subito comparisce la giovinetta radice o la *barbicella*, o radicola la quale produce delle radici laterali atte ad attrarne dalla terra il sugo, ed a tramandarlo al novello fusto, che *penna* si chiama. Ecco già la pianticella in stato di vegetare senza l'ajuto dei lobi, i quali ricevendo anch'essi il nutrimento dalle radici, si slargano e formano quella specie di foglie chiamate *foglie femminali*. Questa pianta, che fino allora, per così dire, è nella sua infanzia, è tenerissima ed erbacea: il corpo legnoso a poco a poco s'indurisce nell'interno; e sul finir dell'Autunno formasi un'alberetto, esternamente coperto di una scorza ben formata: sotto di questa scorza avvi un piccolo cono legnoso il quale è vuoto, ed in cui stà la midolla; termina finalmente questo alberetto in uno o più bottoni.

Dimostro chiaramente, che appena che il filo legnoso che stà sotto la scorza di quella tenera pianticella, è convertito in legno, non si stende maggiormente nè in grossezza nè in altezza. Alloraquando era erbaceo, si è esteso in tutte le sue dimensioni; di mano in mano che lo indurimento s'avanza, diminuisce l'estensione; e perfezionato che sia lo indurimento, termina l'estensione. Come succede dunque l'accrescimento degli alberi? Crescono in grossezza in virtù dell'addizione di un certo numero di strati o anelli legnosi e cor-

P A R T E I .

b 3

tica.

ticali, che tra il legno e la scorza si formano. Mi sono impegnato in una lunga discussione intorno alla formazione di questi strati legnosi; e dopo di aver riportate molte esperienze tendenti a rischiarare questa questione, concludo: 1.^o Che la scorza può produrre dei nuovi strati corticali, e che ella può, indipendentemente dal legno, fare delle produzioni legnose: 2.^o Che gli strati corticali, i quali non fanno parte alcuna della corteccia interna, rimangono sempre corticali: 3.^o Che il legno può produrre una novella scorza, sotto di cui si formano delli strati legnosi: finalmente comunque ciò accada, certo si è che il corpo legnoso non aumenta in grossezza se non in virtù della sopra-addizione delli strati legnosi. Per quanto riguarda l'aumento degli alberi in altezza, facil cosa sarà il comprenderlo, qualora faremo persuasi, che i bottoni contengono i principj d'un novello ramo, come parimente la papilla, che è nell'estremità dei femi, rinferri i principj d'un novello fusto, e che da questi bottoni escono i novelli rami, come appunto i fusti escono dai femi; i quali nascenti rami col tempo si distendono in quella guisa istessa che si distendono i fusti novelli.

Dopo di aver trattato dell'accrescimento degli alberi, parlo della riunione delle loro piaghe, lo che mi conduce all'esame della unione degl'innesti, e parlo di tutte le maniere d'innestare, come pure di tutte le diverse questioni riguardanti questo istesso argomento: cioè, per esempio, se ogni genere d'alberi possa essere con felice riuscita innestato uno sopra l'altro; se l'innesto alteri e cambi le specie, ec.

Quantunque abbia detto qualche cosa nel primo libro intorno all'accrescimento delle radici, ne ritorno a parlare anche in questo; lo che mi dà motivo di parlare dei talli e delle marze ed accenno i mezzi di far riuscire queste utili pratiche d'Agricoltura. Le osservazioni, che ho avuto il campo di fare intorno allo sviluppo dei rami e delle radici, mi hanno impegnato ad esaminare con tutta la maggiore attenzione la singolar proprietà, che hanno i fusti delle piante, di uscire dal terreno in cui furono seminate, e d'alzarsi perpendicolarmente all'aria, come pure il naturale at-

P R E F A Z I O N E .

xxiii

tributo che hanno le radici di cacciarsi sotto il terreno: e se quest'ardua ricerca non sembrerà dilucidata e sciolta, comparirà almeno trattata ampiamente e sminuzzata. A tal proposito ragiono ancora della tendenza delle piante, che le fa piegare verso del Sole, di quelle che si rinchiudono nelle stanze, e che si ripiegano e vanno verso gli archi e le volte, come pure della retta o dell'obliqua direzione dei fusti e delle radici, e della proprietà che hanno le foglie di rivolgersi al Cielo o all'aria la faccia superiore. Questi diversi esami a poco a poco mi guidano a parlar delle piante *Spilungone* (*), cioè di quelle, che prive della luce crescono in guisa strana e mostruosa, e che acquistar non ponno i loro naturali colori.

Più che si esaminano i vegetabili, e più si scorge, che questi corpi viventi hanno qualche sorta d'analogia con quelli del regno animale: ciò nulla ostante, sembra molto probabile, che le piante prive sieno di sentimento, e che non provino sensazione veruna di dolore, qualora da quelle qualche ramo recidasi; ma pure col dimostrare, che le piante hanno alcuni movimenti simili in qualche parte alli spontanei movimenti degli animali, si scorgeranno in alcune certe apparenze, per verità confuse, di sensazione: un lieve irritamento, anzi anche la sola impressione d'un'odore gagliardo, le fa ritirare a scosse; l'azione del Sole e delle pioggie sulle di loro foglie, producono in quelle dei moti particolari; si aprono e si rinchiudono i fiori a certe ore determinate; e si vedono in alcuni frutti certi moti, che hanno qualche rapporto con quelli dei muscoli degli animali. Le osservazioni fatte su di questi diversi punti, mi sono sembrate degne dell'attenzione del Leggitore. Termino questo Libro dicendo qualche cosa dei varj colori, che prendono i fiori, le foglie, e i frutti, e riportando alcune riflessioni sulla prodigiosa fecondità dei vegetabili.

b 4

L I .

(*) I Francesi chiamano *plantes etioles* quelle, che rinferrate tra muri crescono troppo, ma stentate e sproporzionate, come appunto i Toscani chiamano uomini Spilungoni quelli che sono alti fuori dell'ordinario, ma non ben proporzionati e formati.

L I B R O V.

L'esame delle diverse parti dei vegetabili mi ha passo a passo condotto ad esaminare molte questioni assai curiose; poichè a misura che i dettagli puramente anatomici si esauriscono, si fanno davanti le altre questioni all'economia vegetabile appartenenti; e sebbene elleno sieno intrigate ed astruse, non ho potuto fare a meno di non esaminarle, e principalmente ad oggetto d'esporre agli studiosi dilettranti lo stato in cui elleno realmente sono, per animarli poi a superar gli ostacoli che ci trattengono. Io temo, che molti dei miei Leggitori abbiano da condannare la mia irrisolutezza, e la sospensione dei miei giudizi; ma spero altresì, che altri l'approveranno: pur troppo sono comuni, e praticati i modi di far passare per veri e reali principj le pure apparenze, onde chiunque a suo talento adoperargli potrà. Ma io disprezzo e non curo tutto ciò, che può illudermi: guardiamoci dal credere, che una nuova e inusitata parola possa esser valutata quanto una fisica spiegazione: siamo sempre veridici e sinceri: quando qualche bella osservazione ci fa scuoprire una verità, diciamo, *si fa questo*; ma ricordiamoci anche d'aggiungere, *non si fa altro che questo*, per eccitare gli altri Fisici a tentar nuove scoperte, ed a fare novelli esami, che rare volte infruttuosi faranno. Con tal cautela e moderazione io m'accingo all'esame della prima preparazione del sugo; delle sostanze, che contribuir possono alla di lui formazione; se scorger si possa nelle piante qualche sicuro indizio, che qualche porzioncella di terra dei governi o dei concimi passi nel corpo delle piante; se le piante tutte delle varie specie si nutrano del sugo istesso, che dalla terra ritraggono; come finalmente le piante parassite e gl'innesti contenti esser possano d'un sugo, ch'è loro in un straniero tronco preparato.

Deve il sugo senza alcun dubbio muoversi nell'interno delle piante: ed ecco una sorgente d'esami l'uno più importante dell'altro. Qual'è la causa, che fa ascendere il su-

P R E F A Z I O N E.

xxv

go nelle piante? Si prova abbastanza, che le radici tirano con molta forza il fugo e lo fanno salire; molte esperienze dimostrano, che i rami dal tronco staccati conservano molta forza per succiare; egli è certo, che questa forza è proporzionata alla traspirazione; ed altresì provasi ugualmente, che il fugo è talvolta in un gagliardo moto, mentre che quasi insensibile è la traspirazione; per esempio, nella circostanza delle lagrime. Ma siccome tutte queste cose lasciano molta incertezza intorno alla causa immediata del moto del fugo, procuro su di ciò d'acquistar qualche lume, coll' esaminare quale sia il moto del fugo nelle diverse stagioni dell'anno, e quali sieno le diverse cause fisiche, che influir possano sulla vegetazione. In una cotanto ardua carriera tentar conviene tutti quei mezzi, che dar ci possano qualche istruzione: e perciò esamino e ricerco, se alcuna sperar se ne possa dalle iniezioni; mi fisso a considerare la laterale comunicazione del fugo; esamino se questo nutritivo liquore s'alzi a traverso del legno, o della scorza, oppure tra il legno e la scorza; finalmente se negli alberi una porzione di fugo s'alzi verso i rami, mentre un'altra porzione alle radici discende. Sembrerà, che tutte queste ricerche guidar ci debbano allo scioglimento di quella questione, che ha tanto divisa l'opinione dei Fisici: *Circola forse o non circola il fugo nel corpo delle Piante?* Io la esamino in un'articolo a parte; ma ella rimane per anche indecisa. Dico per altro, che, esista o non esista la circolazione, certo si è, che le piante attraggono molta umidità dalla terra; e perciò passo ad esaminare come possa la terra supplire a tanto necessario bisogno.

Dopo tutto ciò, che nel presente quinto Libro si è detto, io credo, che negar non potassi esser le piante esseri viventi: hanno esse primieramente tutta la tenerezza propria dell'infanzia; cavano col soccorso delle radici, come dalle vene lattee, il chilo che le nutrice: il qual liquore riceve nelle viscere delle piante alcune secrezioni e molte preparazioni, che atto lo rendono ad essere nutritivo; e può anche darfi, che qualche fugo dalle foglie succiato si mescoli

co-

cogli altri fughi attratti dalle radici. Alcuni dotti Fisi- ci per via di molte osservazioni accuratamente fatte hanno conosciuto, esservi nei vegetabili una traspirazione sensibile ed insensibile, lo che deve molto influire sulla preparazione del fugo nutritivo; viene a poco a poco la pianta adulta; ed allora degli organi d'ambidue i sessi provveduta, ella produce dei semi fecondi, che ponno essere considerati come veri ovi, in cui a grado a grado gli embrioni o i principj si formano di quelle piante, che uscirne ne debbono. Generata che abbiano i vegetabili una innumerabile posterità, cadono nello stato della vecchiaja, ed alcuni più presto, altri più tardi periscono. Anche nei tempi del massimo loro vigore, soggette sono le piante a molte malattie, alcune delle quali principalmente derivano, o dall'eccesso di siccità o d'umidità, o da una viziosa qualità del terreno; i freddi, gl'infetti anch'essi molti mali producono; e con questo ho creduto di dover compiere la presente mia Opera.

Non pretendo di avere esaurito tutto ciò, che alla Fisica dei vegetabili appartiene; ma vedendo omai il presente Trattato troppo voluminoso, supplirò alle omissioni nei seguenti miei libri; ed intanto esorto chiunque voglia conoscere a fondo questa parte della Fisica, a consultare principalmente le Opere del Malpighi, del Grewio, dell'Hales, del Bonnet, e molte Dissertazioni, che trovansi sparse nelle Memorie dell'Accademia Reale delle Scienze, nelle Transazioni Filosofiche, nell'Efemeridi di Germania, nelle Memorie particolari del Linneo, e d'altri.



DISSERTAZIONE

INTORNO AI METODI

DI BOTANICA.

E LA Nomenclatura, come ho detto nella Prefazione, la vera chiave della Botanica; ed è questa l'unico mezzo, con cui gli studiosi di questa Scienza possono tra di loro farsi intendere, e comunicarsi le osservazioni fatte sopra le piante. Come dunque potrebbero altrimenti imparare la Nomenclatura se non per via d'un metodo, il quale, fissando alcune divisioni generali, ed alcune suddivisioni particolari, metta i principianti in stato di ordinare e disporre le specie, che vedono, e a quelli ignote, in questa classe o in quella; acciò poi venendo a confrontarle colle descrizioni di quelle piante contenute nella classe a cui esse appartengono, possano riconoscere quelle, che essi hanno sotto degli occhi, e adattare a quelle i convenienti nomi? Questo è il modo con cui giunger si può ad acquistar colle piante quella familiarità e domestichezza, che costituisce un vero Botanico.

Collo esaminare attentamente le piante tutte, se ne scorgono di quelle, che da per sè stesse si ordinano e si dispongono in famiglie; cioè, vi sono alcune collezioni di specie, che si somigliano per un numero tanto copioso di caratteri simili, e che sono separate talmente dalle altre specie, ch'egli è impossibile il non distinguerle; di maniera tale, che se si ravvisano in una pianta alcuni di questi caratteri, si può essere quasi certi, che vi si ravviseranno anche gli altri. Potrei recar per esempio le piante labiate, le granimate, le crucifere, le liliacee, le malvacee, le leguminose, le cucurbitacee ecc. ma mi restringo solamente a citar le conifere, e le ombellifere. Se m'imbatto in un frutto squamoso, duro e legnoso, i semi del quale annicchiati sieno sotto scaglie o squame, in quei frutti insomma che chiamansi *Coni* o *Pine*, allora io son certo, che l'albero che gli ha prodotti ha i suoi fiori maschi separati dai fiori femmine, e raggruppati entro un'integumento o reticella comune, a guisa di castore.

Così pure, osservata che sia la maniera, con cui le foglie delle om-

ombrellifere abbracciano i fusti, puossi, attentamente esaminando una pianta di tale famiglia, che non ha per anche prodotti i fiori, star sicuri, che questa novella pianta produrrà un'ombrella la quale sosterrà dei fiori di cinque petali, con cinque stami, uno stilo forcuto e un embrione doppio, che cambierassi in due semi nudi. Non dico già, che trovar non si possa qualche eccezione di questa regola, il *Bupleurum* ne è una; ma tosto che tali eccezioni ristrette sono dentro uno scarso numero, può dirsi che la regola sia generale; e gli esempi ora da me indicati bastano a fare intendere ciò che voglia dirsi per *metodo naturale*.

Una valida prova, che certe famiglie seco portino alcuni caratteri singolarmente distinti da tutte le altre, si è quella, che quasi tutti i *Metodici* hanno riunito tali sorte di piante: quantunque, per formare i loro metodi, alcuni si sieno appigliati alla posizione del fiore di quelle, relativamente alla forma dei petali; altri a quella dei calici; ed altri finalmente al numero degli stami e dei pistilli.

Chiunque attentamente esamini le famiglie, che congiunte sono tra di loro da certi caratteri talmente analoghi, che nessun *Metodico* non ha potuto separare, forza farà, che accordi l'esistenza delle famiglie naturali. E chi, ciò premesso, potrà avere il coraggio di decidere, che tutto il regno vegetabile sia così diviso dalla natura in un certo numero di famiglie, e che altro non ci rimane da fare se non alcune osservazioni per formare un metodo generale, le di cui classi e sezioni sarebbero tutte composte di famiglie naturali? Io reputerei molto ardua cosa lo assicurarlo, quantunque siavi qualche apparenza, che queste classi esistano, o almeno non è dimostrato, che esse non esistano. Ma che questo ordine generale possa essere o non essere stabilito; che un tal metodo, quale ora ho esposto, esista o non esista nella natura, le ricerche che si faranno per aumentare i frammenti, che abbiamo di questo metodo naturale, ridonderanno sempre in vantaggio della Botanica, poichè somministreranno qualche scoperta, che potrà far perfezionare i metodi artificiali, i quali tanto più perfetti reputare si debbono, quanto meno dall'idea che abbiamo del metodo naturale si discostano; ed ecco il punto di vista con cui mi fo coraggio di dire, che tutti i tentativi fatti finora per stabilire qualche metodo intorno alla forma dei calici, delle foglie, delle radici, dei peli, ec. sono assai utili, perchè somministrano dei materiali per dila-

DISSERTAZIONE.

XXIX

dilatate lo scarso numero delle cognizioni, che abbiamo intorno alle naturali famiglie.

Le piante, che tali famiglie compongono, tra di loro si rassomigliano, non solamente per la loro esterior forma, ma sono anche più tra di loro legate e congiunte per le interne qualità: se ne vede una prova negl'innesti i quali per lo più felicemente riescono sulle piante d'una istessa naturale famiglia, e che hanno ripugnanza di legare qualunque sorta d'unione con gli alberi d'una famiglia straniera. Oltre di che, sappiamo, che tutti i Titimali producono un latte caustico e potentemente purgante; i Papaveri tutti sono più o meno narcotici; quasi tutti i *Solanum* producono una specie d'ubriachezza e di mania; quasi tutti i Rubiacei più o meno una rossa tintura producono: e quindi può dirsi, che l'Analogia tanto alla Nomenclatura profittevole, molto anche serve allo studio delle proprietà delle piante, non già, per vero dire, a scuoprire una proprietà, ma ad applicare ed estendere la palese proprietà d'una pianta ad un'altra pianta analoga a quella. Un prudente Botanico farà anche più cauto e guardingo: s'asterrà dal decidere con asseveranza, che una tal pianta è narcotica, perchè ella ha molti esterni rapporti alla famiglia dei Papaveri; ma tosto, che crederassi in stato di poter credere, ch'ella abbia questa virtù, si vedrà costretto a fare alcune esperienze con cui riscontrare e convincersi se la detta pianta seguiti la generale analogia di quella classe, o se debba esserne una eccezione; dico un'eccezione; poichè non sono i sistemi, nè i ragionamenti metafisici sulle generali leggi della natura, quelli che guidare ci debbano a serbar fede a tali analogie; ma lo sono i fatti, le osservazioni, e le più volte replicate esperienze.

Dalle premesse riflessioni io concludo, che ricerche tendenti ad ampliare le naturali famiglie, ben lungi dall'essere di niun momento e puramente chimeriche, sono anzi di grandissimo rilievo ed importanza; e che lo appigliarsi ad un tal metodo, il quale forse non sarà mai perfetto, si è il più sicuro cammino per cui giungere si possa a perfezionare i metodi artificiali, i quali sono assolutamente necessari per far dei progressi nello studio della Natura: lo che a provare m'accingo.

Una vaga e passeggera occhiata sopra le piante tutte d'un prato abbaglia e confonde, e nulla insegna: il numero e la varietà sopra-

prende : tutto a prima vista comparisce confuso , e scorrendo troppi diversi oggetti in una volta , non se ne distingue alcuno : ma se si faccia di tutte quelle piante un'esame metodico e minuto , si sciolga a poco a poco il Caos , e diventa meno complicato l'oggetto .

Un Geografo, che ascenda su d'un luogo eminente, per fare una precisa e dettagliata descrizione d'una Provincia, delle Città, dei Borghi, dei Castelli, dei Villaggi, delle varie produzioni dei terreni, dei Boschi, delle Vigne, dei Prati, delle terre arative, e non prenda dal suo *Observatorio* se non un'idea imperfetta del tutto insieme; egli è appunto quel Botanico, che intraprender vuole lo studio della sua scienza senza il soccorso dei metodi. Ma il Geografo mal contento delle notizie acquistate da quella semplice generale ispezione, si porrà ad esaminare ciascheduno oggetto minutamente; percorrerà la Provincia; la esaminerà a parte a parte; farà tanti separati articoli degli oggetti di vario genere, che al di lui sguardo si presentano; stabilirà la di loro situazione, l'estensione ed il valore; e quanto più d'ordine e di metodo introdurrà nelle sue Memorie, tanto più s'istruirà, e meglio potrà comunicare altrui le acquistate notizie. Ecco il bello effetto, che in ogni genere di studio dai metodi ne risulta, e specialmente in quelli, i quali, come si è la Istoria Naturale, un vasto numero d'oggetti comprendono.

Torniamo ai Botanici: certo si è, che affaticando essi sopra gli oggetti formati dalla Natura, il meglio sarebbe per essi il seguitare un'ordine naturale, quale appunto può immaginarsi da quanto ho già detto di sopra; ma siccome ad essi mancano le osservazioni, hanno ottimamente fatto a formarli dei metodi artificiali, e ad avere singolarmente l'avvertenza di non dividere le famiglie, che sono state conosciute come naturali. Da questo nascono quei tanti metodi artificiali nei quali vedonsi le piante distribuite per classi, per ordini o sezioni, per generi e per specie. Ben vedesi, che tutti questi metodi sono come Dizionarij in cui procedesi con certi caratteri, in quella guisa appunto degli altri Dizionarij, in cui cominciasi dalla prima lettera della parola, che si cerca, poi dalla seconda, poi dalla terza, ec. Ma proviamo con un'esempio quanto giusto sia un tal paragone.

Mi si fa avanti una pianta di cui m'è ignoto il nome, la cultura, e l'uso: esaminò se questa conservi il fusto da un'anno all'altro:

DISSERTAZIONE.

XXXI

tro: quando ho saputo, che ella è nel primo caso, io concludo esser quella un'albero, un'arbofcello, o un'arbuslo, e che ella fa parte del nostro Trattato: osservo, che i fiori coi stami, o fiori maschi, sono separati dai fiori col pistillo, o fiori femmine; ciò basta per farmi conoscere, che l'albero o l'arbuslo da me esaminato, deve essere riposto nella prima classe del picciol metodo da me premesso sul principio del Trattato degli Alberi e degli Arbusli. Osservo anche, che i fiori maschi ed i fiori femmine, che separati sono gli uni dagli altri, stanno sul pedale medesimo; e ne concludo, che un tal albero è compreso nella seconda sezione. Proseguendo nell'esame dei fiori i quali, secondo un tal metodo, devono determinarmi, vedo, che i fiori maschi hanno quattro stami; una tale circostanza mi rende certo, che l'albero fino allora ignoto, egli è o una Betula, o un Moro, o un Buffo; e finalmente cercando questi tre alberi nel corso del mio metodo, per sapere a qual genere si riferisca l'albero che esamino, vedo, che essendo quest'albero provveduto di tre stili, ed ornato di fiori maschi solitarij, esser deve un Buffo, e non una Betula, nè un Moro, perchè questi due generi hanno i fiori maschi aggruppati sotto un'integumento, a guisa di castone. Null'altro mi resta a conoscere, che la specie; ma guidato sono da certe frasi, le quali sono descrizioni brevissime: vero si è, che non essendo queste sempre appoggiate a dei segni abbastanza chiari e distinti, utili il più delle volte non sono se non a chi ha già molte botaniche cognizioni; ma pure, vedendo io, che il Buffo che esamino è grande, e che le sue foglie sono orlate di bianco, io concludo esser questa la varietà chiamata dal Signor Miller *Buxus major, foliis per limbum argenteis*; posso allora informarmi della cultura di questo arbofcello e degli usi suoi, e di più imparerò col vedere gli Autori, che hanno trattato delle varie specie di Buffo.

Tener devesi in questo metodo l'ordine medesimo, che osservasi nei Dizionarij, nei quali se trovar vogliasi ciò che sia *vascello* si cerca primieramente la lettera V, poi la lettera A, poi la lettera S, ec. e finalmente trovasi la parola *vascello*, e se il Dizionario è ben fatto, rimanderà a quelli Autori, che hanno particolarmente trattato della loro costruzione, dell'ordine di caricarli e della loro arboratura: egli è appunto come se si guardassero le ventiquattro lettere dell'Alfabeto, per una delle quali ogni parola cominciar deve, come
tan-

tante classi; le seconde lettere delle parole, come le sezioni delle dette classi; le terze lettere, come i generi del primo ordine; le seguenti, come i generi del secondo ordine, o del terzo, o del quarto, ec. La differenza, che passa tra i Dizionarj e i metodi di Botanica, consiste in questo, che un Dizionario conduce dalla cognizione dei nomi alla cognizione delle cose; e i metodi botanici conducono dalla cosa, che non si conosce, ma che stà sotto degli occhi e soggetta all'esame, a quella del suo nome, il quale conosciuto una volta, ci apre la strada a sapere tutto ciò, che possano gli Autori fu di quel proposito aver detto.

I Metodi di tal sorta, chiamansi *Metodi* o *Sistemi artificiali*; poichè, come vedrassi nella epilogata enumerazione ch'io farò di qualcheuno dei metodi migliori, ciaschedun Metodico ha scelte a suo talento le parti delle piante, che egli ha credute le più atte e capaci ad essere conosciute. Se volessimo anche risalire avanti l'origine di quelle esatte divisioni, che *Metodi* ponno esser chiamate, si vedrebbe, che gli antichi Botanici hanno sempre cercato di ordinare le piante a schiere; vedrebbero, che alcuni hanno divise le radici in *bulbose*, *tuberose*, *cepaeae*, *colle radici perpendicolari*, *striscianti*, *fibrose*, *scagliose* o *squamosae*, ec. hanno altri distinte le foglie in *semplici*, *composte*, *lisce*, *pelose*, *merlate*, *intagliate*, *laciniate* o *orlate*; e le foglie composte in *palmate* e in *pennate*, ec. Molti Botanici hanno diviso i frutti in *secchi*; in *siliquosi* o *baccellini capsulari*, *squamosi*, *carnosi*, e *succulenti*, parte dei quali contengono degli acini o granelli, ed altri dei noccioli. E' stato anche osservato il numero dei semi; e molti hanno spinto lo sguardo sul numero e la posizione, o dei petali, o delli stami, o dei pistilli, e parimente sulla positura dell'embrione, relativamente al calice, le di cui diverse forme sono state parimente osservate. Da ciò nati sono i varj metodi giudicati da molti come contrarj ai progressi della scienza, ma a mio senso, certamente utilissimi, risultando da questi una più esatta cognizione di tutte le parti delle piante: per esempio, quegli che ha tentato di fare un sistema sulle radici, le ha certamente esaminate con maggior diligenza di qualunque altro Botanico: lo stesso dicasi dei calici, dei petali, e delli stami. Non dico già, che non si possa fare una scelta tra i varj metodi artificiali: quelli, che rappresentano il quadro più semplice, e che rimane più impresso; quelli, che

DISSERTAZIONE.

XXXIII

che piantati sono sulle parti le più sensibili e le meno soggette a cambiamento; quelli insomma, che più s'accostano al metodo naturale, sono certamente preferibili a qualunqu'altro: ma con tutto ciò ardisco dire, che due metodi piantati sopra principj molto diversi, possono essere buoni ugualmente, purchè nelle osservazioni uguale diligenza e chiarezza dimostrino.

Ma per fare un buon'uso dei metodi, importa molto il non discostarsi mai da quei principj, che formano la base di questi metodi artificiali; poichè se ci dipartiamo dal sentiero dai Metodici assegnato, tanto disordine e confusione ne nasce, che qualunque metodo rendono inutile e cattivo.

Se si esamina perchè in questi metodi vi sieno certi generi, i quali sebbene abbiano molta relazione tra loro sono non ostante gli uni dagli altri in molta distanza collocati, vedrassi nascer questo perchè la circostanza, che la differenza loro costituisce, si è quella appunto adottata dall'Autore del metodo per carattere principale, e dal medesimo stabilita come base del suo sistema. Ed ecco la ragione per cui nel metodo sessuale di Linneo si vede, che essendo le parti della fruttificazione nell'Ortica, poco da quelle del Moro diverse, sono queste due piante tra di loro vicine, quantunque molto distante sia la relazione, che passa tra loro; ma premesso che sia, che trattasi d'un metodo artificiale, non deve più far meraviglia il vedere le dette due piante vicine, come non deve farla il trovar due parole, diverse solamente nella prima lettera iniziale, poste l'una sul principio, e l'altra in fine d'un Dizionario (*).

Un Letterato, che raccolta avesse una vasta Libreria per proprio suo uso, e ad oggetto ancora di renderla utile alle persone di lettere, non otterrebbe il suo intento se ammonticchiasse tutti alla rinfusa i suoi libri; gli abbisogna indispensabilmente un indice metodico: ma può essere utile detto indice eziandio, se il Proprietario lo accomodi secondo diversi sistemi ugualmente buoni ed atti a compiere le sue intenzioni. Molti, per esempio, per il buon ordine e la simetria dei libri separeranno i libri *in foglio* da quelli *in dodici*;

PARTE I.

c

lo

(*) Debbo far osservare di passaggio, che secondo i principj del Turneforzio, il Moro e l'Ortica starebbero insieme, come nel Metodo del Linneo, se il Turneforzio non avesse separato gli Alberi dall'Erbe.

lo che vien quasi ad essere lo stesso di ciò che han fatto per i metodi Botanici, il Cefalpino, Moriffone, Magnolio, Rayo, Boerhaavio, Turneforzio, i quali hanno separato dall'erbe gli alberi e gli arborescelli. Questa si è una distinzione quasi indispensabile nelle scuole di Botanica, perchè non farebbe ben fatto il piantare in un giardino l'uno dietro dell'altro, un'albero grande ed una piccola erbetta; il Pistacchio, per esempio, nel sistema del Linneo, collo Spinace, o la Canapa colla Quercia, il Noce colla Pimpinella; ed in tutti gli altri sistemi, il Trifoglio e la falsa Acacia. Ma nei Trattati di Botanica un tale inconveniente non sussiste; e per evitare la divisione dei generi, mettendo, per esempio, il Sambuco cogli alberi, e l'Ebbio coll'erbe; Rivino, Ruppio, Ludwige, Knaut, e Linneo non hanno fatta distinzione alcuna tra gli alberi e l'erbe: la natura gli produce alla rinfusa e senz'ordine; questi Autori nella guisa istessa gli descrivono e gli dispongono, e quindi imitano quel Bibliotecario, il quale senza curarsi della forma dei libri, gli dispone secondo le materie in quelli trattate.

Intendendo io di ragionar solamente degli alberi, sono stato costretto a separarli dall'erbe; ed ho prescelto l'ordine alfabetico, quello cioè dei Dizionarj, acciocchè arrivando a saperli il nome d'un'albero, si possa subito acquistare l'idea della sua statura, della sua cultura e degli usi suoi. Mi sono per altro accorto del difetto d'un tal metodo; ho conosciuto, che uno che ignorasse il nome d'un'albero trovato in un Bosco, non potrebbe fare uso alcuno della mia Opera, perchè la semplice ispezione dell'albero non è bastante a suggerirli quel nome ch'egli non sa, nè in qual libro rinvenir possa le da lui bramate notizie. E perciò come fanno tutti i Botanici, sono stato obbligato a supplire al difetto dell'ordine alfabetico colle Tavole metodiche, tolte dai caratteri più sensibili, e che si manifestano dalla sola ispezione dell'albero, che non si conosce, ma che stà sotto degli occhi, e che non si può esaminare. Ecco, a mio credere, una gradazione, che fa conoscere l'origine, il principale vantaggio dei sistemi Botanici, ed il motivo, che ha impegnato i Naturalisti a disporre le specie dalla natura prodotte, sotto le varie classi divise poi in sezioni, le quali pure son divise in generi, e questi composti sono di molte specie.

Per quanto utili sieno i detti metodi, per quanti encomj sieno
 stati

stati fatti ai di loro inventori, non incontrano per altro l'universale approvazione. V'è qualche Autore, che si è provato a farli comparir come inutili, o come un pomposo apparato immaginato dai Botanici per dare alla loro scienza un maggiore risalto. Si può, è stato detto, conoscer le piante a forza di vederle e di maneggiarle, senza la direzione di verun metodo particolare. Perchè, viene anche detto, voler considerare i rapporti, che tra di loro hanno le piante, nelle sole parti della fruttificazione? Soggiungono finalmente, che tutti questi metodi hanno dato alle piante una moltitudine tale di nomi più difficili a ritenersi alla memoria, della forma, della statura e delle proprietà loro. Esaminiamo un poco tutte queste critiche.

Accordo anch'io, che gli Abitatori della Campagna, a forza di vedere perpetuamente le piante, che hanno davanti, arrivano a conoscerle, sebbene nemmeno sappiano cosa sia metodo e sistema; ed accordo ancora, che se le piante, che conoscer deve un Botanico, ristrette fossero entro un picciol numero, se, per esempio, non oltrepassassero quelle coltivate dal giardiniere in un'orto, potrebbero agevolmente conoscersi senza il soccorso di verun metodo, ed anche senza quello della Nomenclatura: poichè il conoscere gli esseri è indipendente dai nomi, i quali a null'altro servono, che a richiamare alla mente l'idea di quelle cose, che già conosciamo, o a tramandare altrui quelle notizie, che abbiamo acquistate. Il seguente esempio farà veder ciò più chiaramente.

Ad un Giardiniere, che coltiva dieci specie di Lattughe, può bastare, per di lui particolar lume, di contrassegnarle Lattuga N.º 1. N.º 2. ec. ed allora dice tra sè: La Lattuga N.º 4. è delicata; quella N.º 5. fa bei grumoli o garzuoli; quella N.º 8. è soggetta ad andare in tallo: ed ecco come molti Botanici si sono contentati di distinguere per via dei Numeri le piante dello stesso genere.

Prima di più inoltrarmi, d'uopo si è l'avvertire, che sebbene la cognizione dei Giardinieri sia circonscritta dentro d'un scarso numero di piante, ciò non ostante si sono fatti naturalmente una specie di metodo, mentre hanno essi riunite sotto una medesima denominazione le piante analoghe, i Cavoli, le Lattughe, le Cicorie; ma la distinzione delle specie in numeri forma un'imperfetta Nomenclatura, la quale non imprime idea veruna della cosa, non è applicabile se non ad un scarso numero di piante, e non serve se non

per quelli, che se la sono fatta famigliare. Un Giardiniere non farà mai inteso da un'altro Giardiniere a cui mandasse dei semi di Lattuga, N.º 9. ma farà bene inteso da tutti i Giardinieri, avvisandoli ch'ei manda loro il seme di Lattuga-Conchiglia, di Lattuga d'Olanda ec. perchè coll'ajuto di questa nomenclatura, nota a tutti i Giardinieri, l'epiteto *Conchiglia* indica una Lattughetta delicata e di buon sapore, che fa i grumoli durissimi, e l'altro *Olandese*, una Lattuga grossa, che non ha gran sapore, che fa i grumoli sfosci, e che è tenerissima. Questa è una vera Nomenclatura inventata dai Giardinieri, i quali non si vantano certamente di dottrina; non è questa molto dissimile da quella dei Botanici, perchè Gasparo Bavhino ha chiamata una Lattuga *Lactuca Sativa*, Lattuga domestica; Giovanni Bavhino ha chiamata un'altra *Lactuca Romana*, Lattuga Romana. Vero si è, che bisogna fare in guisa, che gli epiteti, che distinguono le specie, rappresentino un carattere il quale possa essere conosciuto colla sola ispezione della pianta; come *Lactuca crispa laciniata*, Gi. B. Lattuga crespa colle foglie intagliate. Questa frase descrive la pianta meglio di quello faccia l'epiteto *Olandese*. Come pure, *Lactuca Romana, longa, dulcis*, Gi. B. Lattuga Romana colle foglie lunghe, e dolce di sapore, dà una idea più esatta delle parole *Lattuga Romana* usata dai Giardinieri, i quali hanno fatto meglio a chiamare una Lattuga la *Panacea*, la quale è la *Lactuca maculosa*, Ga. B. Queste frasi così brevi fondate sopra d'un punto distinto, sono a mio credere molto migliori delle lunghe frasi del Morisone, e di altre molte le quali sono talmente imbrogliate, che molto si stenta a formarvi un'idea del vero loro significato. D'uopo si è l'osservare, che i Giardinieri, con tali metodi da essi fatti quasi senza saperlo, si sono per altro procurati uno dei principali vantaggi, che ritrarre si possano dai Metodi dei Botanici: ed eccone il come.

Hanno essi veduto, che non era ben fatto il troppo moltiplicare i nomi; e che era quasi impossibile il ritenerne a memoria 12 in 13 mila: per evitare un tale inconveniente, hanno preso il ripiego di porre sotto un'istessa denominazione tutte quelle specie, che hanno tra di loro un certo rapporto, e distinguerle con alcuni epiteti, che formino delle brevi descrizioni. E quindi il nome *Lattuga* richiama alla memoria il genere; e se la frase è esatta, gli epiteti *caule, foliisque aculeatis*, indicano la specie. Non si potrà certamente fare a me-

meno di non conoscere l'utilità dei nomi generici, e della introduzione delle frasi inventate per sollievo della memoria; ma s'odono delle lagnanze, perchè i Botanici hanno trascurato di conservare i nomi già ricevuti e stabiliti.

Vi sono alcuni casi, in cui era indispensabile il cambiamento delle ricevute denominazioni: Turneforzio, per esempio, ha dovuto chiamar *Granadilla* una pianta, che gli Autori tutti avanti di lui chiamata avevano *Clematis* o *Clematisis*, perchè il carattere, che questo Autore dà al genere delle Clematiti, non conviene in conto alcuno al fiore della Passione; ma convengo anch'io, che alcuni celebri Botanici con troppo di libertà hanno fatti dei cambiamenti dei nomi generici già accolti e stabiliti. Non comprendo, per esempio, perchè in una eccellente Opera di tal genere sia stato cambiato il nome comune e volgare di *Lilac*, già per lo avanti adottato dal Turneforzio, per sostituirvi poi quello di *Syringa* ugualmente comune, ed assegnato già ad una pianta molto diversa, da lui chiamata *Philadelphus*; e non comprendo perchè sia stato dato all'*Ananas*, nome già accolto dai Botanici tutti, quello di *Bromelia*, il quale è un'altro genere di pianta fissato dal Padre Plumier. Non so neppure, perchè l'Autore, che condanna i nomi i quali colla loro etimologia possono suggerire delle idee false, richiama e rende il nome di *Passiflora*, per sostituirlo a quello di *Granadilla*, preferito già dal Turneforzio e dal Boerrhavio, perchè i noti attributi della Passione non vi appariscono in verun conto, come si credeva vederli nelle specie tutte di questo genere. Quanto a me credo, come pensa il Turneforzio, che vada sempre bene il conservare le denominazioni generalmente accettate; nemmeno sono queste diverse denominazioni di tanto imbroglione e confusione quanto vien creduto: adoperi pure un Botanico o quelle del Turneforzio, o quelle del Boerrhavio, o quelle del Linneo, tutti gli altri Botanici lo intenderanno.

Un'altra sorgente delle diverse denominazioni date alle piante, si è l'incertezza in cui siamo di distinguere quelle, che considerarsi debbono come semplici varietà, da quelle, che meritano il nome di specie: d'uopo è ch'io faccia conoscere d'onde una tale incertezza derivi. Prendono i Botanici il termine di *specie* in senso diverso da quello, che ordinariamente si prende. Una piccola differenza nel colore d'un fiore d'orecchia d'Orso o di Tulipano, è bastante a con-

folare un dilettante di fiori contento di avere una specie novella di Tulipano o d'orecchio d'Orfo; ma i Botanici considerano come varietà queste pretese specie: e pretendono, per attribuire ad una pianta il titolo di *specie*, ch'ella possa perpetuarsi tale qual'è per via dei semi: mi spiego:

Molte sono le maniere di moltiplicare gli alberi: si moltiplicano per via delle barbatelle o propaggini, per via di marze, talvolta per via d'innesti, finalmente per via dei semi, ed è questo il modo più naturale. Tanto nelle barbatelle, che nelle marze, e negl'innesti, si fa vegetare il ramo d'un'albero; nelle barbatelle, e nelle marze, coll'obbligare il detto ramo a produrre delle radici; e quando si fanno gl'innesti, coll'unire un ramo ad un'albero già provveduto di radici, che porgono l'alimento all'innesto; in tutti questi casi non può accadere nelle specie cambiamento veruno; tanto il ramo, che ha prodotte le nuove radici, come l'altro, che si è congiunto ad un tronco straniero, vegetano come se fossero sul proprio tronco. Non è già così di quelle piante, che si moltiplicano per mezzo dei semi: alcuni alberi non sentono cambiamento veruno. Se, per esempio, si seminano degli alberi di Giuda, nasceranno degli alberi del tutto simili a quello da cui furono raccolti i semi; ma non sarà già lo stesso degli acini o granelli delle pere e delle mela, come pure dei noccioli di pesca e di susina: la maggior parte di questi produce delle frutta molto diverse da quelle da cui viene il seme. A norma della regola generalmente ricevuta, da questi fatti se ne dovrebbe concludere, che l'albero di Giuda egli è una specie, e che tutte le varie sorte di Pesci e di Susini altro non sono che varietà; eppure risalendo alla sorgente di tali differenze, ben si comprende, che quasi sempre dipendono dalla cagione, che il frutto d'un'albero fecondato essendo, dalle polveri d'un'altro albero; il nocciolo produce un'albero bastardo: e quindi nei giardini nostri poche essendo le specie dell'albero di Giuda, la specie comune conservare si deve; ed all'incontro trovandosi nelle Spalliere e negli orti nostri molte diverse specie, o dicansi varietà, di Pesci e di Susini, risultar ne devono molti mesugli, che alla di loro posterità tramanderanno. Ma perchè una *Caprina primaticcia*, che sarà stata fecondata da una *Mignona*, avrà prodotto un frutto bastardo, ne viene dunque, che la *Caprina* non sia una specie? Mi sembra, che la

acir-

circostanza di essere stata fecondata da una straniera polvere non possa degradar la *Caprina*, per metterla nella serie delle varietà, in quella guisa appunto, che non cessa una Cagna barbina d'essere di quella specie di cane, perchè ella è stata coperta da un Levriero: il titolo dunque di varietà non può convenire se non a quell'alberi, che dai noccioli della *Caprina* nasceranno; come parimente il titolo di varietà non potrà esser dato se non alla posterità dei bastardi, che dalla barbina verranno. E chi potrà frattanto distinguere tra tutte le specie delle pere, delle mela, delle pesche, delle susine allevate da noi, quali sieno le specie originarie e quali le secondarie? Chi mai potrà decidere se un'albero sia una specie, ed un'altro un bastardo od una varietà? Ho creduto sempre, che su di ciò abbia prevaluto l'arbitrio nella decisione dei Botanici: vero si è per altro, che alcune sorte di pesche non provano molto cambiamento quando si facciano venire dal nocciolo; lo che forse deriva per esser queste per alcune circostanze della *sporificazione* meno esposte ad essere fecondate da altre sorte di Peschi.

Osservasi anche, e questa osservazione è assai difficile a comprendersi, che nel Delfinato ove le migliori specie di Pesche vengono naturalmente, quasi tutti i Noccioli, che si seminano, producono buonissime pesche; ed all'incontro nelle nostre Provincie, i Peschi venuti dal nocciolo, ordinariamente cattive frutta producono. Io so che v'ha chi crede, che un buon frutto venuto dal nocciolo non degeneri, moltiplicato ch'ei sia per via di seme, ed un frutto innestato soggetto sia a degenerare; ma essendo una tale asserzione destituta affatto di prove, ed anzi inverisimile, inclinerei piuttosto a credere, che nel Delfinato, ove i Peschi crescono spontanei, atterrati e distrutti sieno i tristi pedali, che o cattive o mediocre frutta producono, e perciò le reciproche fecondazioni non possono se non le buone frutta produrre.

Ma supponendo anche, che vera fosse la regola dalla maggior parte dei Botanici adottata; e che riguardar non si dovessero se non come varietà, quelle specie, che moltiplicarsi non possono, quali esse sono, per via di seme, il modo di assicurarne troppo lungo sarebbe, ed in qualche occasione anche forse impraticabile: e quindi io ripeto esservi nella decisione dei Botanici molto arbitrio su di ciò, che riguardar si deve o come specie, o come semplice varietà; e

credo, che far dovrebbero qualunque sforzo per scansare i due scogli in cui molti Botanici inciamparono: alcuni dei quali ad oggetto d'arricchire la scienza, hanno inventate delle frasi per adattarle alle minime differenze delle intagliature delle foglie, del colore dei fiori, o del portamento delle piante; ed altri han preso il più delle volte per piante diverse la istessa specie, secondo che in fertile o in magra terra la esaminavano. Non è già questo il modo d'arricchire la scienza, ma di confonderla e d'oscurarla: altri, per evitare un tal difetto, hanno considerate come varietà molte sorte di piante, che meritano il nome di specie al pari di molte altre a cui hanno creduto giusto di conservarglielo.

L'ho già avvertito: io credo di aver descritte nel mio Trattato degli Alberi e degli Arbusti molte varietà come tante specie; ma ho reputato convenevole il farle conoscere, per la ragione che potevano essere utili o dilettevoli. Questa sospensione per altro non cade sopra le cose le più importanti, poichè nei generi ben fissati e stabiliti non si trova una tale incertezza: un pugno di granelli d'Olmo produrrà costantemente degli Olmi; alcuni colle foglie più grandi, più intagliate, più ruvide al tatto delle altre, ma sempre Olmi faranno: dicasi lo stesso delle Querce, dei Castagni, dei Noci, dei Mori ec.

Ciò nulla ostante, questa incertezza tra ciò, che considerato esser deve come specie, e ciò che deve esser riguardato come semplice varietà, ha prodotta delle differenze nella maniera d'adattare i metodi; e sono state sublimite e ingrandite per addurle poi come prove del poco conto, che far dovevasi dei sistemi botanici; ma dopo di averle bene esaminate, mi sono sembrate dirette sopra cose indifferenti. E per mostrar questo, d'uopo è il ricordarsi, che Linneo non ha fissato che un genere solo di Sufini, d'Albicocchi, e di Ciriagi, il quale comprende più specie di *Padus* e di *Mabaleb*. Con tali riunioni il genere dei Sufini troppo numeroso sarebbe stato, se il detto Autore considerato non avesse una gran parte di questi diversi alberi come tante varietà; ed in tal caso sarebbe stato costretto a dividere il genere dei Sufini in varie schiere, distinguendoli, forse, in Sufini a grappoli, a fiori in mazzetti, a fiori solitarij, o con qualche altra distinzione da lui creduta adattabile; senza di che, volendo distinguere le specie, abbisognato sarebbe d'inventare frasi lunghissime.

DISSERTAZIONE.

XLI

Lo che a mio credere verrebbe ad esser lo stesso di ciò, che ha fatto il Turneforzio, di formar cioè tanti generi, quante fossero le *Schiere*, mostrando esservi molta rassomiglianza tra alcuni generi, i quali non possono esser distinti, se non per qualche minima circostanza straniera alle parti della fruttificazione. Egli è quasi lo stesso, come se il Turneforzio avesse detto: io credo che i Sufini, gl' Albicocchi, i Ciriegi formino un solo genere; ma più mi piace il separarli, per non ammassare troppe specie in un medesimo genere, e per non esser costretto a cambiare le già ricevute denominazioni; ed ecco ciò, che sembrava utilissimo al Turneforzio.

Quantunque sia inclinato a seguire anch'io questa strada, la quale nei due primi Tomi mi ha determinato a conservare i nomi ricevuti, non farei per altro cotanto ardito di condannare la opposta maniera tenuta dal Signor Linneo, perchè col mezzo della sottrazione di ciò che egli considera come varietà, egli ha reso meno vasto il numero dei generi, ed ha alquanto reso più semplice lo studio della Botanica.

Sono per altro le riunioni di molti generi in uno, buone soltanto per i Botanici; poichè nell'uso comune, non si può quasi necessariamente confondere i Sufini, gli Albicocchi, ed i Ciriegi: la maggior parte dei Botanici ha formato un solo genere di Nespoli, di Bussi, di Lazzeruoli, di Spina alba, dei *Peri Cervini*, quantunque tutti questi alberi sieno dai Giardinieri conosciuti e distinti sotto di questi nomi diversi.

Lo scarso numero degli alberi, che nei giardini coltivansi, può agevolmente ritenersi a memoria; ma dilatar volendo lo sguardo sopra tutti i vegetabili, è d'uopo, per sollievo della memoria, disporre, come ho già detto, e collocare sotto un'istessa denominazione le piante tutte, che hanno qualche rapporto tra loro. E per questo appunto il Turneforzio ha riunito al genere dei Ciriegi, i Viscioi, i Duracini, i Ciriegi Moscadelli, i *Padi*, ed i *Mabaleb*; ed il Signor Linneo sotto d'un'istesso genere ha riunito le Querce, gli Elci, il Kermes, e il Sughero, per far vedere, che tra questi diversi alberi passano le medesime relazioni, che si osservano tralle diverse piante, che compongono un'istesso genere: poichè bisogna sempre ricordarsi, che ciò che in Botanica si chiama *genere*, egli è un'ammasso, una unione di piante, che in molte parti si rassomigliano, e che

e che riunite vengono sotto d'una comune denominazione, per separarle da quelle, che non hanno tali punti di somiglianza. Ma questi caratteri generici, questi punti di somiglianza devono essere unicamente cavati e dedotti dai loro rapporti prossimi ed apparenti; intendendo dire, dalla struttura delle parti, che scelte furono per fissare i caratteri, e non dai rapporti, che agli occhi non si presentano, come sono le virtù, e i luoghi ove esse nascono; di modo tale, che devono essere considerate come piante dello stesso genere tutte quelle in cui trovasi il carattere comune e sensibile, che da tutte le altre piante le distingue.

Posto che sia ciò bene inteso, mi si accorderà, che la Spinalba o sia l'*Oxyacantha*, il Lazzaruolo, il *Pero Cervino*, il Cotogno, la Spinalba o l'*Oxyacantha Dioscoridis* sono del genere dei Nespoli: se tutti questi alberi fossero somiglianti in tutte le parti loro, formerebbero una sola specie; ma siccome le piante d'un medesimo genere differiscono sempre tra di loro per alcune particolarità, che si trovano tra quelle parti, che non costituiscono il genere, ne risultano differenti specie: e quindi in un metodo che sia ben fatto, il carattere generico deve esser semplice, facile a conoscersi, e convenire alle specie tutte di quel genere, esclusivamente a qualunque altra. Ella è una disgrazia, che la precisione vada rare volte colla chiarezza congiunta: se il carattere d'un genere è troppo ristretto, può temersi, che non si distingua abbastanza dal carattere degli altri generi; ma se per schivare la oscurità, si entra nei dettagli sopra le parti tutte della fruttificazione, vi è il pericolo di fare troppe eccezioni, e di trovarsi poi necessariamente costretti a moltiplicare i generi oltre il dovere. Diamo a conoscerlo con un esempio.

Secondo il Turneforzio, il Sufino egli è un genere di pianta; 1.° il di cui calice è un picciol gottò diviso in cinque; 2.° i di cui petali, che sono cinque, restano attaccati agl'incavi del calice e disposti a guisa di rosa; 3.° il di cui pistillo s'alza dal fondo del calice, ed ha l'embrione nella sua base; 4.° il di cui frutto, che nasce dall'embrione è carnoso, ovale o tondo; 5.° il di cui frutto un'osso nocciolo rinferra, in cui stà chiuso un seme. Ecco un carattere molto preciso: si è per altro accorto il Turneforzio esser questo un carattere proprio ugualmente dell'Albicocco, del Ciriegio, ed anche del Pesco; e per questo appunto egli avverte, che quando vogliam di-

di-

DISSERTAZIONE.

XLIII

distinguere questi diversi generi, ricorrere è d'uopo al portamento o alla esterna abitudine o apparenza delle piante, detta dai latini *habitus plantæ* ovvero *facies exterior*. Avrebbe certamente tolta qualunque difficoltà, col farne un genere solo; ma egli ha creduto bene il non confondere quegli alberi, che sono stati sempre separati; ed io in questo convengo di buona voglia con esso lui.

Secondo il Signor Linneo, il Sufino è un genere di pianta; 1.º il di cui calice è d'un solo pezzo, formante un gotto intagliato fino alla metà in cinque segmenti ottusi ed aperti, i quali cadono, allegati che sieno i frutti; 2.º i cui petali, che sono cinque, sono grandi, rotondi, incavati nella di loro estremità, vuoti a guisa di cucchiajo, e attaccati agli orli del calice; 3.º gli stami, che sono venticinque, della figura d'una lesina, sono lunghi quasi al pari dei petali; nascono o spuntano dalle interni pareti del calice; le cime loro o antere sono doppie; 4.º il pistillo è composto d'un'embrione rotondo e d'un pezzo solo; lo stile è filamentoso, della lunghezza delli stami, e terminato in uno stimato o punta ottusa; 5.º il frutto è una bacca o coccola rotonda, divisa per tutta la sua lunghezza da un piccolo solco; 6.º il seme è un nocciolo rotondo, compresso sui lati, tagliente nel contorno, e in un dei suoi lati vi è un cauletto o fossetta alquanto fonda.

Egli è questo un carattere molto esteso, e che rappresenta la descrizione di tutte le parti della fruttificazione: eppure si adatta ugualmente anche all'Albicocco, al Ciriegio, ed al Lauro-Ciriegio, ed al Sufino; lo che ha indotto il Linneo a farne un solo genere nel suo Trattato *delle Specie*. Avrebbe potuto anche comprendere in questo istesso genere i Mandorli e i Peschi; perchè vi sono alcuni Peschi, che hanno i petali rotondi; le pesche lisce non hanno l'embrione peloso; ed i solchetti, che chiaramente caratterizzano i noccioli delle pesche, appena si vedono sopra d'alcune mandorle: insomma non devono distinguere le pesche dalle mandorle, per la circostanza, che la carne di queste ultime è secca, perchè io aveva un Mandorlo i di cui frutti erano grossi e succulenti quanto le belle pesche, ed il loro nocciolo era una vera mandorla.

Concludasi da tutto questo, che tutti i frutti sono, rigorosamente parlando, d'un medesimo genere; ma che per non confonderli è necessario, come dice il Turneforzio, fare dei generi d'un secondo ordine,

dine, da cui si cavano i segni caratteristici di tutte le parti dell'albero; poichè se, per scansare un tale inconveniente, si descrivessero scrupolosamente, nel carattere generico, tutte le parti della fruttificazione, ci troverebbammo nella dura necessità di moltiplicar troppo i generi: supponghiamo, per esempio, che si desse un vero Sufino considerato per tutti i versi, ma che avesse il pistillo visibilmente più lungo degli stami, o le incisioni del calice molto minori della metà della sua lunghezza; si dovrà dunque per questo segregar questa specie dal genere dei Sufini? Sembrerebbero certamente tali differenze di troppo lieve momento. Sarebbe dunque molto meglio di non farlo entrare nel carattere generico. Non ho già addotto questo esempio ad oggetto di condannare il metodo del Signor Linneo; anzi io mi protesto di veder volentieri in quello le parti tutte della fruttificazione; ma ho giudicato opportuno il far conoscere la ragione, che ha indotto il Turnesorzio a restringere i suoi generi al puro necessario: ed egli stesso in molti luoghi chiaramente il dichiara; ma vien troppo dimenticata e negletta la lettura della Prefazione delle sue Istituzioni; ed io la considero in questo genere un Capo d'Opera.

Per l'istessa ragione appunto per cui sono state unite quelle piante le quali hanno certi punti di somiglianza, per farne poi dei generi, sono anche stati uniti i generi, che in certe parti si rassomigliano, per formarne delle truppe o schiere separate, che *Classi* s'appellano. E quindi i caratteri, che costituiscono le *Classi* e le *Sezioni*, debbono essere più semplici e più generali di quelli, che costituiscono i generi; come pure devono questi esser più generali di quelli, che distinguono le specie; di maniera tale, che secondo l'espressione del Cespino, il regno vegetabile, dopo tutte queste distinzioni, si trovi diviso, come un corpo di Truppe, in Reggimenti, in Battaglioni, e in Compagnie. Altro non mi rimane se non che riportare le ragioni, che hanno indotto i Metodici a cavare i loro caratteri dalle parti della fruttificazione.

Vien detto, che per ben conoscere le piante, debbano esaminarsi con attenzioni tutte le parti delle medesime: non si limitano i Giardinieri all'esame esatto dei fiori e dei frutti, ma osservano diligentemente tutte le parti delle piante, radici, fusti, foglie, fiori, frutti, semi; e corredati di tali notizie distinguono i Peri tutti, che

nei

nei loro semenzaj coltivano, dai loro frutti, allorchè i detti alberi ne sono adorni; conoscono dalle foglie quando non sono essi da frutto; e nell'inverno, spogliati che sieno delle foglie, gli distinguono dal legno e dalla forma delle gemme e dei bottoni. Si semina pure in una striscia di terra alla rinfusa del Cerfoglio, del Prezemolo, delle Rape, delle Cipolle; appena, che queste piante spunteranno dal terreno, i Giardinieri le sapranno conoscere. Questi son fatti da non poterli negare; e così appunto quando i Botanici hanno voluto far conoscere in particolare una pianta, hanno procurato di darne una totale descrizione. Si vantano gli esperti Botanici di conoscere la maggior parte delle piante in qualunque stato esse si trovino, se anche fossero sfigurate e mozzate: Riportano molte piante al di loro vero genere, colla sola ispezione dei granelli e dei semi; e talvolta col raccogliere e riunire i frammenti delle lacere foglie, dicono a quale pianta esse convengano; lo che prova ad evidenza, che essi minutamente osservano e ritengono in mente tutte le parti. Se dunque ciò è vero, e perchè, dirà taluno, hanno i Botanici prescelto le parti della fruttificazione, per formare le classi e le sezioni? Forza è il credere, che a ciò gli abbiano indotti delle valide ragioni, mentre vedesi, che i Metodici tutti che hanno esaminata la Natura, su d'un tal punto concordemente procedono; hanno essi veduto, che negli organi della fruttificazione vi sono da osservare molte più cose, che in tutte le altre parti; ed infatti, gli organi sono, per così dire, ammassati nei fiori. Ha fatto anche conoscere l'osservazione, che i caratteri tratti dalle parti della fruttificazione sono soggetti a variare meno di quelli, che piantati sono sopra tutte le altre parti; è stato finalmente osservato, che le piante che nelle parti della fruttificazione si rassomigliano, hanno anche molti rapporti nelle altre loro parti. Non furono dunque le ragioni metafisiche quelle, che hanno fatti determinare il Cesalpino, Morisone, Ray, l'Ermanno, il Turnesorzio, ed il Signor Linneo a ritrarre i caratteri dalle parti della fruttificazione; ma furono essi indotti a questo dalle medesime osservazioni, che hanno fatte tutti gli altri Botanici; le quali hanno fatto chiaramente loro conoscere, che i caratteri dedotti dalle parti della fruttificazione sono i più comodi, i più sicuri e i più conformi all'indole ed alla condotta della Natura. Purchè per altro s'adempiano le condi-

zio-

zioni necessarie alla formazione d'un faggio e retto Metodo , ritrarre si ponno i caratteri da qualunque parte si voglia . Lo che bene inteso , ora io m'accingo a percorrere brevemente i metodi dei più accreditati Botanici ; ma più d'ogn'altro esaminerò quella parte di questi metodi , che spetta agli alberi , agli arborescelli ed agli arbusti ; perchè accoppiando un simile dettaglio alle Tavole metodiche , che impresse veggonsi sul principio dei due miei primi Tomi , ciò potrà esser bastante per rischiare questa parte della Botanica , che forma il mio principale oggetto .

Compendio delle viste di molti Botanici..

GESNERO , Medico Svizzero , è il primo , che ha conosciuto necessario di ricercare le differenze caratteristiche delle piante nelle parti della fruttificazione , anzi che nelle foglie ; ma egli morì prima di poter formare un metodo sopra un tal piano .

CESALPINO , Professor di Medicina nell'Università di Pisa , poi primo Medico del Pontefice Clemente VIII. diceva , che molto ragionevolmente erano stati stabiliti molti generi di Piante sopra la struttura dei frutti , perchè la natura nella produzione di verun'altra parte delle piante non impiega mai un numero tanto copioso di pezzi differenti . Questo Autore , il quale fu il primo a gettare i fondamenti d'un metodo appoggiato alle parti della fruttificazione , cominciò dal separare gli arborescelli dall'erbe ; poscia divise tanto gli alberi quanto l'erbe in molte schiere , le quali poi suddivise per formarne quindici Classi . Se si rifletta allo stato in cui allora trovavasi la Botanica , e si venga per conseguenza ad esaminare il suo Metodo , in lui scorgesi un vasto ingegno capace di superare tanti difficili scogli per gettare i primi fondamenti di tutti i metodi fino a' dì nostri compariti . D'uopo è però di confessare , ch'egli ha lasciato questo prezioso germoglio molto involupato e confuso ; e per questo appunto io non mi dilungherò di vantaggio .

FABIO COLONNA , d'una illustre famiglia d'Italia , mostrò nella sua Istoria delle Piante pubblicata nel 1616. molto ingegno nel fissare ch'ei fece i generi : egli fa sapere ch'ei non fa verun conto delle foglie , e che soltanto ponesi ad esaminare le parti della fruttifica-

DISSERTAZIONE.

XLVII

ficazione : per mala sorte egli a quelle univa il sapor delle piante , il quale somministrar non può se non caratteri equivoci ed incerti .

Il Celebre GASPARO BAVHINO era di parere , che si stabilissero i generi sopra le virtù delle piante . Non avrei mai il coraggio di condannare quelli , che hanno fatto dei Trattati delle piante usuali disposte ed ordinate secondo le di loro differenti virtù . Opere tali sono utilissime alla pratica della Medicina ; ma recar certamente non possono vantaggio alcuno per guidare alla perfetta cognizione delle piante : aggiungendo anche , che le proprietà delle piante sogliono essere talvolta incerte ; e le più costanti e certe , sono quelle appunto che nulla al di fuori si manifestano . Nulla v'è che m'insegna , riguardando esternamente un Papavero , ch'egli abbia una qualità narcotica ; la Sena , il Reobarbaro , la Scamonea , non mostrano certamente la di loro virtù purgante : oltre di che , può avere la pianta istessa molte proprietà o sia in medicina , o sia nell'arti ; ed in tal caso non è facile a sapersi in qual classe debba riporsi . Eppure era talmente impressa una tale idea nello spirito dei Botanici , che i Metodi non hanno fatto avanzamento alcuno finchè non è comparso MORISSON Medico Scozzese , il quale fu fermato in Francia da S. A. R. Gastone , Duca d'Orleans .

Metodo del MORISSON.

Questo Medico , a cui eran ben note le Opere del Cesalpino e del Colonna , ha formato un Metodo di Botanica meno imperfetto di quelli dei di lui predecessori . Proponendosi egli di stabilire un Metodo col mezzo dei frutti , ha ordinate tutte le piante in diciotto Classi , tre delle quali destinate sono per gli alberi , per gli arborescenti e per gli arbusti , e le altre quindici per l'erbe : Parlerò delle prime tre solamente .

PRIMA CLASSE.

Degli ALBERI. Egli divide questa Classe in dieci Sezioni .

I. SEZIONE . *I Coniferi* : il Pino , l'Abete , il Larice , il Cipresso , il Thuya o l'albero della vita , l'Ontano , il Tulipiero , la Betula , volgarmente *Scopa* .

II. SEZIONE . *I Ghiandiferi* : La Quercia , l'Elce o il Leccio .

III. SEZIONE . *I Nociferi* : Il Noce , il Nocciuolo , il Pistacchio , il Lauro , il Faggio , il Castagno .

IV.

- IV. SEZIONE. *I Pruniferi*: Il Prugno o Sufino, l'Albicocco, il Pefco, il Mandorlo, il Giuggiolo, il Cirioglio, il Celtis o il Loto, l'Azedarac, l'Olivio, l'Elaeagnus o il Salcio Siriaco, il Lauro-cirioglio.
- V. SEZIONE. *I Pomiferi*: Il Pomo, il Pero, il Pomo Cotogno, il Sorbo domestico, l'Arancio, il Pomo granato, l'Anona, il Fico.
- VI. SEZIONE. *I Bacchiferi*: 1. d'una mandorla sola: il Lentifischio, il Molle, il Lauro-Saffra, il Taffo: 2. di due mandorle: la *Bordana*: 3. di tre mandorle; il Ginepro: 4. di quattro mandorle: lo Smilace: 5. d'un numero indeterminato di Mandorle: il Moro, il Corbezzolo, il Sorbo, l'Aliso o il Loto.
- VII. SEZIONE. *I Siliquosi*: 1. colle foglie semplici ed uniche: l'Albero di Giuda: 2. quelli colle foglie composte di due foglioline: (*).... 3. quelli colle foglie composte di tre foglioline: l'Anagride o legno fetido: 4. quelli con le foglie composte di quattro foglioline. Non ci è noto, che un solo Citiso con quattro foglie, il quale non vedesi nel Motifone: 5. quelli che hanno le foglie composte d'un numero indeterminato di foglioline: il *Gleditsia*, la *Pseudo-Acacia*, l'*Acacia*.
- VIII. SEZIONE. Quelli dai frutti fasciati d'una membrana: l'Aceto, il Carpino, l'Olmo, il Tiglio, il Frassino.
- IX. SEZIONE. Quelli che hanno i fiori o i frutti uniti ad una specie di Cotone o d'ovatta: il Platano, o il Pioppo, il Salcio.
- X. SEZIONE. Quelli che non si ponno riportare nelle Sezioni sopradette...

SECONDA CLASSE.

Degl' ARBOSCELLI. Ei la divide in sette Sezioni.

- I. SEZIONE. Degl' Arboscelli *Coniferi*...
- II. SEZIONE. *I Nociferi*: L'albero dell'Uva o lo *Staphylodendron*, lo Storace.
- III. SEZIONE. *I Pruniferi*: Il Mandorlo nano, il Corniolo maschio.
- IV. SEZIONE. *I Bacchiferi*: 1. Quelli d'una mandorla sola: il Sanguine, il Viburno, l'Oppio, il Somacco o il *Rhus*, il Legno gentile, o la Laureola, la Coccigria o il Cotino, il *Cassia-poetica*, la Galla, il *Chionanthus*: 2. quelli di due mandorle: il Ligustro, il Crespino, il *Chama-Cerasus*: 3. quelli di tre semi: la Savina, l'Alaterno, il Bosso, la *Chamaelea-tricoccas*, l'*Empetrum*, il Sambuco, il Portacappello, il Pruno, il Ramno: 4. Quelli con quattro semi: l'*Evonymus* o la Fuffagine, il *Grevia*, l'Agno-Casto: 5. quelli con un numero indeterminato di semi: il Mirto, il Nepolo, la *Vitis-Idea*, il Rosajo, l'Uva Spina.
- V. SEZIONE. *Dai Fiori leguminosi*: la Ginefra, lo *Spartium*, il Citiso, la *Colutea*, la *Barba-Jovis*.
- VI. SEZIONE. *Dai frutti Capsulari*: 1. quelli a due tramezzi: il Lila o Lilac: 2. quelli a quattro tramezzi: la *Syringa*: 3. quelli a cinque tramezzi: il Cisto: 4. quelli d'un numero indeterminato di tramezzi: la *Spiraea*, la *Coriaria*, l'Erica.
- VII. SEZIONE. Quelli coi frutti uniti ad una specie di Cotone o d'ovatta: il Salcio piccolo, il Tamarisco, il *Nerion*.

TER.

(*) Segnerò coi puntini quelle Sezioni in cui non vi sono alberi, che possano alzarsi in alto.

TERZA CLASSE.

Dei SOTTO-ARBOCELLI o ARBUSTI. Egli li divide in tre Sezioni, le quali comprendono le sole piante fermentose.

I. SEZIONE. Quelle che hanno le *mani*: la Vite, una specie di *Bignonia*, lo Smilace.

II. SEZIONE. Quelli che s'arrampicano coi rami: il *Periclymenum*, il Gellomino, il *Dulcamara*, il *Cappero*, la *Clematide* o la *Vitalba*.

III. SEZIONE. Quelli che si attaccano colle radici: l'Ellera.

Nota. Questo Autore si diparte dal suo metodo quando forma le Sezioni d'Alberi per via delle foglie; anche più si diparte quando tratta dell'Erbe, poichè ricorre per le suddivisioni, ora al numero dei petali o al di loro colore, ed ora alla forma delle radici. Distingue anche a parte le piante, che fanno latte; ma non starò ad entrare in questi dettagli.

Metodo del Signor RAY.

Il Celebre Ray, Ministro Inglese, a cui molto deve la Botanica; Oltre al conoscere perfettamente questo dotto Autore l'erudizione di questa scienza, riempiendo la sua Istoria delle Pianta di tutto ciò, che sopra ciascheduna delle medesime scritto avevano i migliori Botanici prima di lui, ha saputo anche riformare i Metodi del Cesalpino, e del Moriffone, e riunire molte Classi all'ordine naturale: in tutte le di lui Opere egli mostra molto discernimento, ed uno spirito assiduo ed instancabile.

Per distinguere gli Alberi e gli Arboscelli dall'Erbe, egli comincia dal separare le piante, che hanno il fusto e le fronde rivestite di bottoni, *Gemmi-pare*, da quelle che non hanno bottoni, *Gemmis carentes*.

D'uopo è il riflettere, che il carattere di avere i rami carichi di bottoni, il quale perfettamente caratterizza gli Alberi e gli Arboscelli, esclude gli Arbusti o sotto-Arbusti; e perciò il Ray gli colloca trall'Erbe; ma avendo io reputato necessario d'inserire nel mio Trattato gli Arbusti, vi ho comprese tutte le Pianta, che da un'anno all'altro il fusto loro conservano. Farò anche osservare in tale incontro, che gli Arbusti, come appunto il Rosmarino, l'Abrotano ec. realmente non hanno bottoni, poichè le foglioline, che sono

PARTE I.

d

in

in punta ai rami, non sono rinchiusa tragl' involuppi squamosi, ma solamente circondate da un' aggregato di foglie, che vanno sempre scemando in grandezza, a misura che si avvicinano alla estremità del ramo, il quale termina in piccole foglie, le une contro le altre attaccate, alle quali altro non manca per formare un vero bottone, che l'essere ricoperte da squamosi involuppi. Torniamo al Metodo del Ray.

Dopo molte divisioni generali, Ray dispone tutte le piante sotto trentatré Classi, sei delle quali destinate sono per gli Alberi e per gli Arborescelli.

PRIMA CLASSE.

Degli ALBERI Arundinacei, *Arundinaceae*...

SECONDA CLASSE.

Degli ALBERI coi fiori separati dai frutti, o senza petali, *Arbores flore a fructu remoto seu apetalae*.

- I. SEZIONE. I Coniferi, *Coniferae*: l'Abete, il Pino, il Larice, il Cipresso, il Thuya, la Savina, la Betula, l'Ontano.
- II. SEZIONE. Quelli dai fiori sparsi, o separati tra loro, *Floribus sparsis*: il Buisso, il Terebinto, l'*Empetrum*.
- III. SEZIONE. Quelli che hanno i fiori maschi radunati nei Castoni o aggruppati in un' integumento comune, *Juliferae*: il Noce, il Nocciolo, il Carpino, la Quercia, l'Elce, il Faggio, il Castagno, il Platano, il Pioppo, il Salcio.
- IV. SEZIONE. Quelli che fanno le bacche o coccole, *Bacciferae*: il Cedro, il Ginepro, il Tasso, il Moro.

TERZA CLASSE.

Degli ALBERI coi frutti che terminano in un ombellico, *Arbores fructu umbilicato*, il quale è formato degli avanzi del calice.

- I. SEZIONE. Quelli dai frutti grandi, succulenti e pieni di semi, *fructu humido polypyræna majori*: il Pero, il Pomo, il Cotogno, il Sorbo, l'Aliso, il Nespolo, il Melo granato, il Rosajo.
- II. SEZIONE. Quelli dai frutti piccoli, succulenti e pieni di semi, *fructu humido polypyræna minori*: il Ribes, la *Vitis idæa*, il Caprifoglio, il Sambuco, l'Eltera, il Mirto.
- III. SEZIONE. Quelli colle bacche o coccole disposte a guisa d'ombrella, e che hanno un seme solo, *Bacciferae, umbrellatae, monopyrænae*: il Lauro Tinno,

DISSERTAZIONE.

LI

no, l'Oppio, il Viburno, la *Casta-poetica* (*) Il Corniolo, il Saffras.

- IV. SEZIONE. Quelli dai Coccole piene di semi, *Baccifera polypirena*: il Gelsomino, il Ligustro, la Bordana, l'Alaterno, la Vite, la Fufaggine, l'Agrifoglio, il Ramno, il Capperò, l'Arbuto.

QUARTA CLASSE.

Degli ALBERI il di cui frutto non termina in ombellico, *Arbores fructu non umbilicato*, o i di cui fiori cominciano a spuntare dalla base del frutto, *seu quarum flores fructus basi coherent*: i frutti di questa Classe sono succulenti, o almeno polposi, *fructus in his semper pulposus*.

- I. SEZIONE. I Pruniferi, *Prunifera*: l'Albicocco, il Sufino, il Pesco, il Mandorlo, il Ciriogio, il Giuggiolo, il *Celtis* o il Loto, l'Oliu, l'Azeradach, il Lauro-Ciriogio.
 II. SEZIONE. I Bacciferi da un seme solo, *Baccifera monopyrena*: il Vischio, la Filaria, la *Laureola*.
 III. SEZIONE. I Pomiferi, *Pomifera*: l'Arancio, l'Anona, il *Piqueminier*, lo Storace, l'*Uva-Ursi*, il Rovo.

QUINTA CLASSE.

Degli ALBERI dai frutti secchi, *fructu secco*; i quali non sono nel baccello, *non siliquoso*, e senza ombellico, *nec umbilicato*.

- I. SEZIONE. I di cui semi sono rinchiusi dentro un'involuppo alato, *vasculis seminalibus, ala membranacea auctis*: l'Apero, il Frassino.
 II. SEZIONE. Ray fa qui una Sezione ch'egli chiama Mescolanza, *Miscellanea*, in cui comprendonfi gli alberi, che non hanno una esatta relazione cogli alberi precedenti: l'Alloro, lo *Staphylodendron*, il Tiglio, il *Virex*, il Tamarisco, il *Porta Cappello*, lo *Spiraea*, il *Toxicodendron*, il *Camelia*, l'*Erica*, il Cotino, il Lilac, l'Olmo, il *Cbamarodendron*, il Sumaco.

SESTA CLASSE.

Degli ALBERI che hanno i baccelli, *Arbores siliquosa*.

- I. SEZIONE. Quelli i di cui fiori non sono papilionacei, *non papilionacea*; la Caroba, il Nerione, l'Acacia.
 II. SEZIONE. Quelli con i fiori papilionacei, e con le foglie semplici, *flore papilionacea, foliis simplicibus*: il Siliquastro o l'Albero di Giuda, la Giunstra, lo *Spartium*, la *Genista-Spartium*.

d 2

III.

(*) Il Frutto di quest'albero, rigorosamente parlando, non è a guisa d'ombrella.

- III. SEZIONE. Quelli con i fiori papilionacei , e colle foglie palmacee composte di tre foglioline, *flore papilionacea, foliis trifoliatis*: il Legno fetido, o l'Anagiride, il Citiso, il Citiso-Ginefra.
- IV. SEZIONE. Quelli con i fiori papilionacei , e colle foglie aguzze, e conjugate, *flore papilionacea, foliis pinnatis*: il Colutea, il Coronilla, il *Barbajovis*, la Falsa-Acacia, l'Enero.

S E T T I M A C L A S S E.

Degli ALBERI Anomali, *Arbores Anomale*: Il Fico.

Molti Metodici dopo il Ray hanno fatto qualche cambiamento nel di lui Metodo, appigliandosi sempre ai frutti per fare il fondamento delle prime divisioni, e non servendosi dei petali, se non in alcuni casi particolari per le suddivisioni; ma siccome questi dettagli troppo ci scosterebbero dal nostro proposito, passerò al Metodo del Turneforzio.

Metodo del TURNEFORZIO.

Non v'ha alcuno, che abbia proceduto nei Metodi di Botanica con tanto ordine quanto il celebre Turneforzio, della Accademia Reale delle Scienze di Parigi, Professor di Botanica del Giardino Reale delle Piantе. Egli ha pure, come il Gesnero, il Cefalpino, il Colonna, Morisfone, e Ray, piantato il suo Metodo sulle parti della fruttificazione; ma invece di principiare dall'esame dei frutti, egli comincia dall'esame dei petali, essendo questi quella parte più visibile, e che dà più negli occhi, che sia nei fiori; e non si ferma tanto sul di loro numero, come molti Metodici han fatto, quanto sulla di loro forma.

Dopo ch'egli ha separati dall'Erbe gli Alberi e gli Arborescelli, tanto nell'una famiglia che nell'altra, egli distingue i fiori che hanno i petali da quelli che ne sono senza. Ed essendo i fiori coi petali molto numerosi, ei gli ha suddivisi in fiori semplici e in fiori composti; quelli che formati sono dall'aggregazione di molti fiori, sono o a mezzi fioretti, o a fioretti, o radiati; ed i semplici sono o monopetali, o polypetali: tanto gli uni che gli altri son suddivisi in fiori regolari ed in fiori irregolari. Di tutte queste divisioni egli ne forma ventidue Classi, diciassette delle quali son destinate all'Erbe, e le altre cinque agli Alberi e agli Arborescelli. Ciascuna delle dette Classi è divisa in molte Sezioni; ed i caratteri distinti di que-

DISSERTAZIONE.

LIII

queste Sezioni sono relativi ai frutti, che vengono dal pistillo o dal calice, i quali sono o molli o secchi, formati a baccello o a capsula, ad uno o più strati o cellette ec.

Potrebbero molte volte essere considerate come del medesimo genere tutte le piante componenti una Sezione: per esempio, la Sezione in cui si comprendono l'Erbe da fiore, a campana o a bacinio, il di cui calice diventa un frutto carnosio, comprende tutte le cucurbitacee; di modo tale, che fare non potrebbe che un solo genere delle Coloquintide, di Cocomeri, di Poponi, di Meloni, di Angurie, di Zucche, ed anche di *Momordica*; ma vedendo, che questo genere stato farebbe troppo numeroso, ed essendosi il Turneforzio fatta una legge di lasciare, per quanto avesse potuto, le abbracciate denominazioni, egli ha procurato di dividere le cucurbitacee in più generi, con alcuni caratteri presi dalle parti lontane dalla fruttificazione, ma che per altro generano talvolta un poca di confusione. Ed infatti il *Momordica* è diverso dal Cocomero, perchè il di lui frutto propriamente parlando, non è carnosio. Il Cocomero è diverso dalla Zucca, perchè egli è meno grosso; dal Melone, per la sua figura; si distingue l'*Anguria* per le sue foglie intagliate molto: e finalmente la morbidezza delle foglie delle Coloquintidi fa che si possano distinguere dalle Zucche. L'istesso dir si potrebbe degli alberi, che hanno i fiori leguminosi, i di cui diversi generi non si distinguono se non dalle foglie. Vedo anch'io, che questi caratteri generici si dipartono dallo spirito del Metodo; ma da ciò non può mai nascerne un grande inconveniente; poichè non vi sarà alcuno, che si trovi imbrogliato nel distinguere le piante comuni ed usuali. In quanto poi a quelle, che sono rare e note solo ai Botanici, non farebbe un gran danno, che un Botanico ne collocasse una tra i Meloni, ed un'altra la riponesse tra i Cocomeri, purchè tanto l'uno che l'altro avessero l'avvertenza di collocarle nella Sezione, che all'una o all'altra pianta convienfi; poichè torno a ripeterlo, secondo il Turneforzio, quasi tutte le cucurbitacee potrebbero formare un solo e medesimo genere.

Quanto alla distinzione delle specie d'un'istesso genere, il Turneforzio la rileva da qualche cosa di particolare, che nella struttura d'alcune delle loro parti discernasi, fusti, foglie, radici, che a lui servono per combinare ed inventar le sue frasi con tutta la possibile

PARTE I.

d 3

bre.

brevità; per esempio: *Corona solis, tuberosa radice: Corona solis, foliis profunde incis: Corona solis, alato caule*. Queste frasi son brevi, eppure chiaramente accennano i segni principalmente distinti, de' dotti alcuni dalle radici, altri dai fusti, e gli altri dalle foglie.

Tutte queste divisioni e suddivisioni le une dall'altre a maraviglia derivano; nè può bramarfi un'ordine più bello; il piano dell'Autore ovunque si manifesta; insomma, egli ha inventato un progetto d'un Metodo artificiale mirabilmente concepito; e sarebbe stato desiderabile, che i dotti Metodici venuti dopo di questo illustre Autore, anzi che creare nuovi metodi, appigliati si fossero a perfezionare il suo. Forza è per altro il confessare, che il Metodo del Turneforzio ha anch'egli i suoi difetti, e che in qualche luogo non è chiaro abbastanza. L'Autore medesimo il conobbe, anzi esorta quei Botanici, che dopo di lui verranno, a renderlo migliore con delle nuove osservazioni; addita loro il cammino, coll'esaminare ch'ei fa le varie parti della fruttificazione, che adoperar si potrebbero nei Metodi, e adduce le ragioni che lo hanno indotto a prescegliere i petali per far le sue prime divisioni. La sua Opera è abbellita da molte belle figure, le quali, chechè ne dicasi, servono di molto ajuto. Convegno ancor io, che le figure, per quanto esatte esser possano, qualora corredate non sieno dalle dichiarazioni, ad altro non servono, che ad un frivolo diletto; ma congiunte ai discorsi, sono esse il vero mezzo per restringere e troncare molti dettagli; le idee dell'Autore con queste più chiare divengono ed istruttive. Io mi contenterò di qui riportar solamente quella parte del suo Metodo, che gli Alberi e gli Arboscelli riguarda.

PRIMA CLASSE.

Degli ALBERI e degli ARBOSCELLI, che hanno i fiori senza petali, *Arbores apetalæ*.

I. SEZIONE. Quelli le di cui parti maschili, o gli stami, unite sono alle parti femminine, o ai frutti; e per conseguenza questi fiori sono ermafroditi, *hermaphroditi*: il Frassino, la Caroba.

Nota, che si danno alcuni Frassini coi petali, e che il più delle volte, nei fiori ermafroditi, vi è uno dei due sessi malamente costruito.

II. SEZIONE. Quelli che hanno i fiori maschi divisi dai fiori femmine, sebbene tanto gli uni che gli altri alloggino su dell'istesso pedale, *flos mas & femina in eadem Arbore*: il Basso, l'Empetrum, l'Ephedra.

III.

DISSERTAZIONE.

LV

III. SEZIONE. Quelli i di cui fiori maschi e femmine stanno su degl'individui separati, *flos mas in una arbore, flos femina in altera*: la Galla, il Terebinto, il Lentischio, il *Ranunculus*, la Cassia, il Fico.

Nota. Si ha scoperto, che i fiori maschi ed i fiori femmine stanno rinchiusi nel frutto, che chiamasi Fico.

SECONDA CLASSE.

Degli ALBERI e degli ARBOSCELLI i di cui fiori maschi sono aggruppati su di una membrana comune, chiamata Castone, *Arbores Amentaceae*; sono i Castoni formati di stami, o di squame attaccate ad un fletto: in questa Classe i fiori maschi sono sempre separati dai fiori femmine; ma ora si trovano tutt'a due sullo stesso individuo, ed ora su diversi individui.

I. SEZIONE. Quelli i di cui fiori maschi, aggruppati nel Castone, sono separati dai fiori femmine, sebbene sieno sullo stesso pedale, e i di cui frutti hanno dentro un nocciuolo, *flos mas & femina in eadem arbore, fructu ossa*: Il Noce, il Nocciuolo, il Carpine.

II. SEZIONE. Quelli che hanno i fiori maschi aggruppati nel Castone, e separati dai fiori femmine, quantunque sieno sul pedale medesimo, ed i cui semi sono acini o granelli, *flos mas & femina in eadem Arbore, fructu coriaceo*: la Quercia, l'Elce, il Suvero, il Faggio, il Castagno.

III. SEZIONE. Quelli che hanno i fiori maschi aggruppati in Castone, e separati dai fiori femmine, quantunque sul pedale medesimo, e i di cui frutti sono squamosi o comiferi, *flos mas & femina in eadem arbore, fructu squamoso*: l'Abete, il Piceo, il Larice, il Thuja, il Cipresso, l'Ontano, la Bercia o Sempino.

IV. SEZIONE. Quelli che hanno i fiori maschi aggruppati in Castone separati dai fiori femmine, ora sul pedale medesimo, ed ora su pedali diversi, ed i cui frutti succulenti sono piccole bacche o coccole, o di piccole bacche composti, *flos mas & femina in eadem arbore aut in diversa, fructu molli*: il Cedro, il Ginepro, il Tasso, il Moro.

V. SEZIONE. Quelli coi fiori maschi aggruppati in Castone, e separati dai fiori femmine, quantunque sul pedale medesimo, ed i cui frutti secchi sono fissi ed uniti in forma di gomito o di pallottola, *flos mas & femina in eadem arbore, fructu siccus*: il Platano.

VI. SEZIONE. Quelli i di cui fiori maschi aggruppati in Castone nascono sopra pedali diversi da quelli dei fiori femmine, *flos mas & femina in alia arbore*: il Salcio, il Pioppo.

TERZA CLASSE.

Degli ARBORI e degli ARBOSCELLI, i di cui fiori sono monopetali, *Arbores monopetale*.

I. SEZIONE. Quelli i di cui pistillo diventa un frutto succulento, che riserra degli acini o granelli, *pistillum definit in fructum mollem, seminibus callosis*: il Nespolo, il *Thymelaea*, l'Alaterno, la *Phyllirhea*, il Ligostro, il Lauro, il Gelsomino, l'Arbuti, il *Chamaelea*.

- II. SEZIONE. Quelli il di cui pistillo diventa ona bacca, in col trovanfi uno o più ossi piccoli, *pistillum definit in fructum carnosum, seminibus effis*: lo Storace, l'Olivo, l'Uva-Ursi, l'Aquifolio, il *Piqueminier*.
- III. SEZIONE. Quelli il di cui pistillo diventa un frutto membranoso, *pistillum definit in fructum membranaceum*: l'Olmo.
- IV. SEZIONE. Quelli il di cui pistillo produce un frutto secco, diviso in molte cellulette o tramezzi, *pistillum definit in fructum multicapsularem*: il Lilac o il Ligustro orientale, l'Erica, il *Virex*, il *Chamerodendros*.
- V. SEZIONE. Quelli il di cui pistillo diventa un baccello, *pistillum definit in fructum siliquosum*: il *Nerion*, l'Acacia.
- VI. SEZIONE. Quelli il di cui calice diventa ona bacca, *calix definit in baccam*: il Sambuco, l'Oppio, il Viburno, il Lauro-Tino, la *Vitis idæa*, il Caprifoglio, il *Periclymenum*, lo *Xylosteon*, il *Symphoricarpos*, il *Chamaecerasus*, l'*Elaeagnus*.
- VII. SEZIONE. Quelli il di cui fiori maschi sono separati dai fiori femmine, che producono i frotti: *flor mas a famina separatus*: il Vischio.

QUARTA CLASSE.

Degli ALBERI e degli ARBOSCELLI, che fanno i fiori a rosa, i di cui petali sono attaccati in tondo attorno al fiore, *Arbores flore rosaceo*.

- I. SEZIONE. Quelli il di cui pistillo diventa un frutto, che ha una sola cavità, *pistillum definit in fructum unicapsularem*: il *Cosino* o la *Coccigria*, il *Toxicodendron*, il Somacco, il Tiglio, il *Matrone d'India*.
- II. SEZIONE. Quelli il di cui pistillo diventa ona bacca, o on frutto composto di molte bacche, *pistillum definit in baccam*: il *Celtis* o Loto, la *Bordana*, l'Ellera, la Vite, l'*Oxyacantha* o sia il Crespino, il *Rovo*, il *Molle*, l'*Anona*.
- III. SEZIONE. Quelli il di cui pistillo diventa un frotto da doe o più celllette; *pistillum definit in fructum multicapsularem*: l'Acero, lo *Slaphylodendron* o il Pistacchio salvatico, il Lauro-Tolipero, la *Syringa*, il *Tamarisco*, lo *Spirea*.
- IV. SEZIONE. Quelli il di cui frutti sono baccelli, *pistillum definit in siliquam*: il *Bonduc*.
- V. SEZIONE. Quelli il di cui pistillo diventa on frutto carnoso, che racchiode dei granelli, *pistillum definit in fructum carnosum, seminibus callosis*: l'Arancio.
- VI. SEZIONE. Quelli il di cui pistillo diventa on frotto col Nocciolo, *pistillum definit in fructum carnosum, ossiculo factum*: il *Susino*, l'Albicocco, il *Ciriegio*, il *Pesco*, il *Mandorlo*, il *Lauro-ciriegio*, il *Giuggiolo*.
- VII. SEZIONE. Quelli il di cui calice diventa on frutto con i granelli, *calix definit in fructum carnosum, seminibus callosis*, il *Pero*, il *Pomo*, il *Cotogno*, l'Aliso, il *Sorbo*, il *Melo granato*, il *Rosajo*, il *Ribes*, il *Mirto*.
- VIII. SEZIONE. Quelli il di cui calice diventa on frutto carnoso, in col trovanfi molti ossolini, *calix definit in fructum carnosum, ossiculis factum*: il *Corniolo*, il *Nespolo*.

DISSERTAZIONE.

LVII

QUINTA CLASSE.

Degli ALBERI e degli ARBOSCELLI coi fiori leguminosi, *Arbores flore papilionaceo*.

- I. SEZIONE. Quelli colle foglie semplici ed alternate, lungo i rami distribuite, *folia singularia*: la Ginefra, lo *Spartium*, la *Genista Spartium*, l'Albero di Giuda.
- II. SEZIONE. Quelli colle foglie a trifoglio, o che hanno tre foglioline nell'estremità d'una coda, *folia ternata*: il Legno fetido o Anagiride, il Citiso, il Ginefra-Citiso.
- III. SEZIONE. Quelli colle foglie pennate o accomodate a paja su d'un filo comune, *folia pinnata*: la Falsa-Acacia, la *Colutea*, l'*Ehretia*, la *Coronilla*, la *Barba-Jovis*.

Non mi fermerò molto sull'Opere di molti Metodici, che hanno scritto seguitando i principj del Turneforzio. Alcuni hanno disposte nelle Classi già stabilite le piante, che andavano essi scuoprendo; altri hanno fatti dei nuovi generi, ed anche delle nuove Classi, quando lo hanno creduto necessario; altri finalmente hanno corretti alcuni difetti, che trovati hanno nel Metodo originale. Queste ricerche potrebbero essere molto importanti; ma tropp'oltre mi condurrebbero.

Metodo del MAGNOL.

Non posso fare a meno di non accennar qualche cosa intorno al Metodo del Magnolio celebre Professor di Botanica a Montpellier. Questo per verità altro non è, che un'abbozzo che egli non ha potuto render compiuto: e fu pubblicato dopo la di lui morte tale e quale trovato fu tra i suoi scritti; ma non sarebbe giusto il non parlare in verun conto d'un Metodo appoggiato a principj da tutti gli altri affatto diversi.

Egli distingue due specie di calice: esterna l'una, che involupa e sostiene il fiore, e che è il calice propriamente detto; e l'altra sorte di calice, da lui chiamato interiore, è il pericarpo o il frutto: e quindi secondo questa idea, hanno tutte le piante o un calice esterno, o un calice interno, o tutte due insieme. Una tal riflessione ha indotto il Magnolio a cavare le sue principali divisioni da questa sola circostanza, che gli somministra tre Classi; cioè:

I. CLAS.

I. CLASSE. Le Piantе che hanno solamente il Calice esterno, *calix externus tantum*.

II. CLASSE. Le Piantе che hanno solamente il Calice interno, *calix internus tantum*.

III. CLASSE. Le Piantе che hanno un Calice esterno ed un Calice interno, *Calix internus & externus simul*.

La PRIMA CLASSE è suddivisa in due Sezioni, cioè:

I. SEZIONE. Le Piantе il di cui Calice esterno involupa il fiore: questa Sezione comprende 1. tutte le Piantе il di cui fiore non è noto abbastanza; 2. quelle coi fiori a stami; 3. molti fiori monopetali; 4. molti fiori polypetali; 5. i fiori composti.

II. SEZIONE. Le Piantе il di cui Calice esterno sostiene i fiori: questa Sezione comprende, 1. molti fiori monopetali; 2. molti fiori polypetali.

La SECONDA CLASSE, composta di quelle piante, che non hanno che un calice interno, comprende sotto una medesima Sezione ogni sorta di piante bulbosе o tuberose, e così moltissime altre, che si avvicinano allo stesso genere.

La TERZA CLASSE la quale è composta di Piantе, che hanno un Calice interno e un Calice esterno, è divisa in quattro Sezioni, cioè:

I. SEZIONE. I fiori monopetali.

II. SEZIONE. I fiori bipetali, e tripetali.

III. SEZIONE. I fiori quadripetali.

IV. SEZIONE. I fiori composti d'un numero indeterminato di petali.

Io credo di dovermi solamente restringere a queste generali indicazioni per ciò che riguarda le Erbe; ma entrerò in qualche dettaglio intorno alla parte di questo Metodo, che spetta agli Alberi e agli Arboscelli.

Il Magnolio gli divide ugualmente che l'erbe, in tre Classi generali cioè:

I. CLASSE. Gli Alberi e gli Arboscelli, che hanno un solo Calice esterno.

II. CLASSE. Gli Alberi e gli Arboscelli, che hanno un solo Calice interno.

III. CLASSE. Gli Alberi e gli Arboscelli, che hanno un Calice esterno e un Calice interno.

Poi divide la PRIMA CLASSE in cinque Sezioni, cioè:

I. SEZIONE. Gli Alberi col Castone, i di cui semi rinchiusi stanno entro i Castoni, *Julifera, semine in julis*: il Salcio, *Salix*; il Pioppo, *Populus*.

II. SEZIONE. Gli Alberi col Castone, i di cui frutti separati dai fiori rinchiusi sono in un Calice esterno, *Julifera fructu separato, in calycibus externis*.

DISSERTAZIONE.

LIX

nis: il Noce, *juglans*; il Nocciuolo, *Corilus*; il Castagno, *Castanea*; il Faggio, *Fagus*; la Quercia, *Quercus*; l'Elce, *Ilex*.

III. SEZIONE. Gli alberi Coniferi, *conifera*: il Cipresso, *Cupressus*; l'Abete, *Abies*; il Pino, *Pinus*; il Larice, *Larix*.

IV. SEZIONE. Gli Alberi coi frutti sferici, composti di molti semi, *pirulifera*: il Platano, *Platanus*.

V. SEZIONE. Gli Alberi coi fiori monopetali, in un Calice esterno riuniti, *flore monopetalae*, *intra Calycem externum*: il Fico, *Ficus*.

La SECONDA CLASSE è divisa in tre Sezioni, cioè;

I. SEZIONE. Gli Alberi coi fiori monopetali, *flore monopetalae*: l'Olmo, *Ulmus*; *Cassia-poetica*; il Ramno, *Rhamnus*; l'Olivio salvatico, *Elaeagnus*; l'Alaterno, *Alaternus*; l'Acacia.

II. SEZIONE. Gli Alberi coi fiori a quattro petali, *flore tetrapetalae*: il Sanguine, *Cornus farnia*.

III. SEZIONE. Gli Alberi i di cui fiori hanno un numero indeterminato di petali, *flore polypetalae*: il Pistacchio salvatico o lo *Staphilodendron*, *Staphylo-dendron*; la Vite, *Vitis*.

La TERZA CLASSE è divisa in cinque Sezioni, cioè;

I. SEZIONE. Gli Alberi coi fiori a stame, *flore flamineae*: il Moro, *Morus*; il Baffo, *Buxus*.

II. SEZIONE. Gli Alberi coi fiori monopetali, *flore monopetalae*: il Lila, *Lilae*; l'Albero Casto, *Vitex*; l'Erica, *Erica*; il Nerion, lo Storace, *Stryax*; la Fava greca, *Gnajakana*; il Ligustro, *Ligustrum*; il Viburno, *Viburnum*; la Coriaria; il Sambuco, *Sambucus*; l'Oppio, *Opulus*; il Corniolo, *Cornus mas*; il *Periclymenum*; l'Olivio, *Olea*; il Lauro, *Laurus*; il Lauro-Tino, *Tinus*; l'Aquifolio, *Aquifolium*; il Gelsomino, *Jasminum*.

III. SEZIONE. Gli Alberi dai fiori a quattro petali, *flore tetrapetalae*: il Frassino, *Fraxinus*; la *Syringa*.

IV. SEZIONE. Gli Alberi i di cui fiori hanno un numero indeterminato di petali, e i di cui frutti non sono in baccello, *flore polypetalae*, *non siliquosa*: il Tiglio, *Tilia*; la Fuscagine, *Evonimus*; la *Spiraea*; il *Taxicodendron*; il Cotino, *Cotinus*; il Tamarisco, *Tamariscus*; il Marone d'India, *Hippocastanum*; il Crespino, *Berberis*; il Melisso, *Armeniacae*; il Pesco, *Persica*; il Mandorlo, *Amigdalus*; il Ciriogio, *Cerasus*; il Giuggiolo, *Ziziphus*; l'*Azradac*; il Melo, *Malus*; il Pero, *Pyrus*; il Sorbo, *Sorbus*; il Nespolo, *Mespilus*; l'Avorno o la Frangola, *Frangula*; il Rosajo, *Rosa*; il Pomo granaro, *Punica*; l'Arancio, *Aurantia*.

V. SEZIONE. Gli Alberi i di cui fiori hanno un numero indeterminato di petali, e i di cui frutti sono baccelli, *flore polypetalae*, *siliquosa*: l'Albero di Giuda, *Siliquastrum*; la falsa Acacia, *Pseudo-Acacia*; il Cistiflo, *Cytisus*; il *Barbajovis*; la Ginestra, *Genista*.

Paffo sotto silenzio le aggiunte e le correzioni fatte dal Signor Linneo a questo Metodo, poichè ho voluto darne qui solamente una semplice idea; e quindi passo al Metodo completo del Linneo; Questo Metodo confermerà quanto ho detto di sopra, che si ponno
fare,

fare, cioè, dei buoni Metodi Artificiali, procedendo anche con principj diversi.

Metodo del Signor LINNEO.

Non si ponno mai decantare abbastanza le tante obbligazioni, che hanno i Botanici col Signor Linneo, celebre Professor di Botanica a Upsala (*). Chi volesse fare un conveniente elogio a questo instancabile e dotto Autore, basterebbe solo di fare un Quadro esatto di tutte le di lui Opere; e si scorgerebbe in quello un Naturalista, che accoppia una profonda erudizione alla più esatta osservazione della Natura. Ripieno egli lo spirito dell' Opere dei Botanici, che lo hanno preceduto, e conoscendo le piante colle di lui proprie osservazioni, ha fatto un numero di combinazioni, su di cui formar si possono dei Metodi, tanto Naturali, che Artificiali; e ne ha tra gli altri ridotto uno completo, il quale può essere considerato come un *Compendio* di tutti quelli già fatti avanti di lui, perchè i caratteri dei generi son cavati dalla forma dei Calici, da quella dei petali, dei pistilli, dei *Nectarium*, dei frutti, dei semi. Ma la base principale di questo Metodo consiste in quelle parti, che fino ad ora meritata non avevano la intiera attenzione dei Metodici, intendo dire degli stami e dei pistilli: Cerchiamo di darne un piano ristretto.

Il Signor Linneo non separa gli Alberi dall' Erbe; ma deducendo il suo metodo dagli organi della fecondazione, egli distingue quelle piante in cui le dette parti non sono conosciute, o appena visibili, da quelle in cui elleno sono chiare ed apparenti. Tralle piante in cui ben si conoscono gli organi inservienti alla fecondazione, alcune contengono gli organi dei due sessi, gli stami, cioè, e i pistilli; e queste sono Ermafrodite, ed altre contengono solamente gli organi d' un sesso, o dei soli pistilli, o dei soli stami; ed allora elleno sono o maschi o femmine. Queste due specie di fiori trovansi talvolta separati l' uno dall' altro, ma sul medesimo individuo; oppure un' individuo istesso porta solamente i fiori maschi, ed un' altro solamente i fiori femmine: queste osservazioni inducono il Signor Linneo a fa-

(*) Medico Ordinario di Sua Maestà il Re di Svezia; dell' Accademie di Petersburgo, di Stoccolma, di Berlino, di Montpellier; della Società Reale di Londra, Corrispondente dell' Accademia Reale delle Scienze di Parigi.

DISSERTAZIONE.

LXI

a fare molte divisioni generali, le quali distribuite sono in suddivisioni.

E primieramente considerando i fiori ermafroditi, i quali sono in gran numero, distingue quelli in cui gli stami sono del tutto tra di loro separati, da quelli in cui gli stami in alcuna delle loro parti si uniscono, o che si congiungono al pistillo; distingue anche quei fiori in cui gli stami sono separati tra loro, in due schiere, quelli cioè in cui gli stami non hanno tra di loro veruna costante differenza, relativamente alla di loro lunghezza, da quei fiori in cui due stami sono più corti degli altri. Con queste divisioni e suddivisioni, in cui si esaminano solamente gli stami, il Signor Linneo trovasti in grado di stabilire ventiquattro Classi. Divide queste Classi in molte Sezioni, che differiscono solamente o nei pistilli o nelli stili; poichè sebbene sia preciso ed esatto in distinguere lo stilo, il quale altro non è che una parte, dal pistillo che è il tutto, io lo confonderò. Sono finalmente queste Sezioni composte di molti generi, i caratteri dei quali presi sono da tutti gli organi della fruttificazione. Per esporre alcuni dettagli di questo Metodo, d'uopo farò il percorrere le ventiquattro Classi, perchè l'Autore non ha separato gli Alberi gli Arboscelli e gli Arbuti dall'Erbe; ma dovendo io fissarmi su di quei soli generi, che al mio Trattato appartengono, terminerò coi puntini tutte quelle sezioni in cui non se ne incontra veruno.

Nota. Per le prime tredici Classi bisogna, 1.º che i fiori sieno agevolmente visibili; 2.º che sieno Ermafroditi; 3.º che gli stami sieno tra di loro separati; 4.º che nella di loro lunghezza non vi sia una differenza costante.

PRIMA CLASSE.

MONANDRIA. I fiori con uno stame solo.

I. SEZIONE. *Monogynia*, un solo pistillo....

II. SEZIONE. *Digynia*, due pistilli....

SECONDA CLASSE.

DIANDRIA. I fiori con due stami.

I. SEZIONE. *Monogynia*, un Pistillo, *Jasminum*, il Gelsomino; *Ligustrum*, il Ligustro; *Phillyrea*, il Filaria o Filirea; *Olea*, l'Olivio; *Cbianthus*; *Syringa*, o il Lilas; *Rosmarinus*, il Rosmarino; *Salvia*, la Salvia.

II. SE-

II. SEZIONE. *Digynia*, due pistilli....

III. SEZIONE. *Trigynia*, tre pistilli....

TERZA CLASSE.

TRIANDRIA. I fiori con tre stami.

I. SEZIONE. *Monogynia*, un pistillo: il *Cucurum* o *Chamælea*.

II. SEZIONE. *Digynia*, due pistilli: *Arundo*, la Canna.

III. SEZIONE. *Trigynia*, tre pistilli....

QUARTA CLASSE.

TETRANDRIA. I fiori con quattro stami.

I. SEZIONE. *Monogynia*, un pistillo: *Cephalanthus*; *Globularia*; *Callicarpa* o *Burcardia*; *Cornus*, il Corniolo; *Ptelea* o *Eleagnus*.

II. SEZIONE. *Digynia*, due pistilli: *Hamamelis*.

III. SEZIONE. *Tetragynia*, quattro pistilli: *Ilex* o *Aquifolium*, l'Elce, o *Aquifolio*.

QUINTA CLASSE.

PENTANDRIA. I fiori con cinque stami.

I. SEZIONE. *Monogynia*, un pistillo: *Chamaerodendron-Azalea*; *Lonicera*, o *Diervilla*, o *Caprifolium*, il Caprifoglio, o *Periclymenum*, o *Chamaecrasus*, o *Xiostemon*, o *Symphoricarpos*; *Solanum* o *Dulcamara*; *Atropa* o *Belladonna*; *Cestrum*, o *Jasminoides-bediunda*; *Licium* o *Jasminoides*; *Sydenhizon*; *Rhamnus*; il Ramno, o *Frangula*; la Bordana, o *Alaternus*, l'Alaterno, o *Paliurus*, il Porta-cappello, o *Ziziphus*, il Giaggiolo; *Ceanothus*; *Celastrus*, o *Evonymoides*; *Itea*, *Ribes*, o *Grossularia*, l'Uva Spina; *Hedera*, l'Ellera; *Vitis*, la Vite; *Vincetoxicum*, o *Pervinca*; *Nerium* o *Nerion*; *Evonymus*, Fufaggine.

II. SEZIONE. *Digynia*, due pistilli: *Periploca*; *Ulmus*, l'Olmo; *Ctenopodium* o *Verniculus*; *Euphorbia*.

III. SEZIONE. *Trigynia*, tre pistilli: *Rhus*, il Sumacco, o *Toxicodendron*, o *Cotinus*; *Viburnum*, il Viburno, o *Tinus*, il Tino, o *Opulus*, l'Oppio; *Sambucus*, il Sambuco; *Zanthoxylon*, o *Fagara*; *Tamariscus*, il Tamarisco; *Staphylea*, o *Staphylocodendron*, il Pistacchio salvatico; *Cassia*.

IV. SEZIONE. *Tetragynia*, quattro pistilli....

V. SEZIONE. *Pentagynia*, cinque pistilli: *Aralia*.

VI. SEZIONE. *Polygynia*. Un numero indeterminato di pistilli....

SESTA CLASSE.

HEXANDRIA. I fiori da sei stami.

I. SEZIONE. *Monogynia*, un pistillo: *Asparagus*, lo Sparaglio; *Jucca*, *Berberis*, il Crespino.

II. SEZIONE. *Digynia*, due pistilli: *Atriplex* o *Polygonum*.

III.

DISSERTAZIONE.

LXIII

III. SEZIONE. *Trigynia*, tre pistilli *Menispermum*.IV. SEZIONE. *Tetragynia*, quattro pistilli....V. SEZIONE. *Polygynia*, un numero indeterminato di pistilli....

SETTIMA CLASSE.

HEPTANDRIA. I fiori da sette stami.

I. SEZIONE. *Monogynia*, un pistillo: *Esculus*, o *Pavia*; *Hippocastanum*, il Marrone d'India.

OTTAVA CLASSE.

OCTANDRIA. I fiori da otto stami.

I. SEZIONE. *Monogynia*, un pistillo: *Vaccinium*, o *Vitis-idea*; *Erica*; *Daphne*, o *Thymela*; *Dicca*, il Legno di piombo.II. SEZIONE. *Digynia*, due pistilli....III. SEZIONE. *Trigynia*, tre pistilli: *Polygonum*.IV. SEZIONE. *Tetragynia*, quattro pistilli....

NONA CLASSE.

ENNEANDRIA. I fiori con nove stami.

I. SEZIONE. *Monogynia*, un pistillo: *Laurus*, l'Alloro.II. SEZIONE. *Trigynia*, tre pistilli....III. SEZIONE. *Hexagynia*, sei pistilli....

DECIMA CLASSE.

DECANDRIA. I fiori con dieci stami.

I. SEZIONE. *Monogynia*, un pistillo: *Anagiris*, l'Anagride o Legno fetido; *Cercis* o *Siliquastrum*, l'Albero di Giuda; *Guislandina*; *Ruta*, la Ruta; *Sabinus* o *Molle*; *Kalmia*, o *Chamaerhododendrus*; *Ladum*; *Gualteria*; *Arbutus*, l'Arbuto, o *Uva-Ursi*. *Clebra*.II. SEZIONE. *Digynia*, due pistilli: *Hydrangea*.III. SEZIONE. *Trigynia*, tre pistilli....IV. SEZIONE. *Pentagynia*, cinque pistilli....V. SEZIONE. *Decagynia*, dieci pistilli....

UNDECIMA CLASSE.

DODECANDRIA. I fiori con dodici stami.

I. SEZIONE. *Monogynia*, un pistillo: *Syrax*.II. SEZIONE. *Digynia*, due pistilli....III. SEZIONE. *Trigynia*, tre pistilli: *Euphorbia*, o *Tithymalus*, il Titimalo.IV. SEZIONE. *Pentagynia*, cinque pistilli....V. SEZIONE. *Dodecagynia*, dodici pistilli....

DUO.

DUODECIMA CLASSE.

ICOSANDRIA. I fiori che hanno più di dodici stami, che si partono dall'interna parete del Calice.

- I. SEZIONE. *Monogynia*, un pistillo: *Philadelphus*, o *Syringa*; *Myrtus*, il Mirto; *Punica*, il Melogranato; *Amigdalus*, il Mandorlo; *Persea*, il Pesco; *Prunus*, il Prugno o Sufino; *Cerasus*, il Ciriegio, o *Lauro-Cerasus*, il Lauro-Ciriegio, o *Armentaca*, il Maliaco.
- II. SEZIONE. *Digynia*, due pistilli: *Crataegus*, l'Aliso; *Sorbus-ancuparia*.
- III. SEZIONE. *Trigynia*, tre pistilli: *Sorbus-Sativa*.
- IV. SEZIONE. *Pentagynia*, cinque pistilli: *Pyrus*, il Pero, o *Malus*, il Melo, o *Cydonia*, il Cotogno; *Mespilus*, alcune specie di Nespoli; *Spiraea*.
- V. SEZIONE. *Polygynia*, un numero indeterminato di pistilli: *Rosa*, il Rosaio; *Rubus*, il Rovo; *Potentilla* o *Pentaphylloides*.

DECIMATERZA CLASSE.

POLYANDRIA. I fiori che hanno più di dodici stami, che si partono dalla base del pistillo.

- I. SEZIONE. *Monogynia*, un pistillo: *Capparis*, il Capparo; *Tilia*, il Tiglio; *Cistus*, il Cesto; *Mimosa*, o l'*Acacia*.
- II. SEZIONE. *Digynia*, due pistilli....
- III. SEZIONE. *Trigynia*, tre pistilli....
- IV. SEZIONE. *Tetragynia*, quattro pistilli....
- V. SEZIONE. *Pentagynia*, cinque pistilli....
- VI. SEZIONE. *Hexagynia*, sei pistilli....
- VII. SEZIONE. *Polygynia*, un numero indeterminato di pistilli: *Liriodendron*, o *Tulipifera*, il Tulipifero; *Magnolia*; *Anona*; *Clematis*, o *Clematidis*.

Nota. Fin quì il Signor Linneo non ha fatto verun caso della lunghezza delli stami paragonati gl'uni cogl'altri; non farà già lo stesso nelle due Classi seguenti.

DECIMAQUARTA CLASSE.

DIDYNAMIA. I fiori con quattro stami, due più corti degl'altri.

- I. SEZIONE. *Gymnospermia*, quattro semi nudi nel calice: il *Tenacium*; *Hyssopus*, l'Isope; *Lavandula*, la Lavanda; *Phlomis*, *Thymus*, il Timo.
- II. SEZIONE. *Angiospermia*, molti semi rinchiusi in un particolare involuppo: *Bignonia*; *Vitex* o *Agnus-castus*.

DISSERTAZIONE.

LXV

DECIMAQUINTA CLASSE.

TETRADYNAMIA (*). I fiori, che quasi tutti contengono sei stami, ma osservansi in tutti quattro stami più alti degli altri.

I. SEZIONE. *Siliculosa*, il di cui frutto è un piccolo baccello....

II. SEZIONE. *Siliquosa*, il di cui frutto è un baccello....

Nota. I fiori delle seguenti Classi contengono dei stami che sono uniti, molti insieme, per qualcuna delle loro parti, o attaccati al pistillo.

DECIMASESTA CLASSE.

MONADELPHIA. I fiori che contengono degli stami, che uniti sono in un sol corpo.

I. SEZIONE. *Pentandria*, cinque stami....

II. SEZIONE. *Decandria*, dieci stami....

III. SEZIONE. *Polyandria*, un numero indeterminato di stami: *Hibiscus*, o *Ketmia*; *Stevantia*.

DECIMASETTIMA CLASSE.

DIADELPHIA (**). I fiori con molti stami uniti a guisa di guaina, ma divisi in due corpi.

I. SEZIONE. *Hexandria*, sei stami....

II. SEZIONE. *Otandria*, otto stami....

III. SEZIONE. *Decandria*, dieci stami, nove uniti ed uno separato: *Spartium*, o *Genista*, la Ginestra; *Amorpha*; *Ononis*, o *Anonis*, la Resta di Bue; *Antibelliz*, o *Barba-Jovis*, o *Cytisus-incanus*; *Robinia*, o *Pseudo-Acacia*; *Colutea*; *Cytisus*, il Citiso; *Ulex*, o *Genista Spartium*; *Coronilla*, o *Emerus*, *Medicago*.

DECIMAOTTAVA CLASSE.

POLYADELPHIA. I fiori da più stami riuniti nella base, in tre o in più fascetti.

I. SEZIONE. *Pentandria*, cinque stami....

II. SEZIONE. *Icosandria*, più di dodici stami attaccati al calice, e non alla placenta; *Citrus*, o *Aurantium*, l'Arancio.

PARTE I.

e

III.

(*) Questi sono i fiori in croce del Turnesforzio.

(**) Questi sono i leguminosi del Turnesforzio.

III. SEZIONE. *Polyandria*, molti stami, che prendono origine dal fondo del calice: *Hypericum*, o *Ascyrum*, o *Androsæmum*, l'Erba Siciliana.

DECIMANONA CLASSE.

SYNGENESIA (*) I fiori con molti stami, le cime dei quali sono riunite a forma di Cilindro.

Nota. Il Signor Linneo cava le seguenti Sezioni dai fioretti maschî, da fioretti femmine, e dagli ermafroditi.

I. SEZIONE. *Polygamia equalis*, tutti i fioretti o piccoli fiori sono ermafroditi, tanto quelli del disco, quanto quelli della circonferenza: *Santalina*.

II. SEZIONE. *Polygamia superflua*, i fioretti del disco sono ermafroditi, e quelli della circonferenza son femmine: *Artemisa*, o *Abrotanum*, l'Abrotano; o *Absynthium*, l'Abbinzio; *Baccaris*.

III. SEZIONE. *Polygamia frustranea*, i fioretti del disco sono ermafroditi, e quelli della circonferenza sono sterili....

IV. SEZIONE. *Polygamia necessaria*, i fioretti del disco sono maschî, e quelli della circonferenza son femmine: *Osbonna*.

V. SEZIONE. *Monogamia*, i fioretti non son formati da più fioretti, ponno essere considerati come anomali; ma le cime sono unite a forma di cilindro....

VENTESIMA CLASSE.

GYNANDRIA. I fiori cogli stami, che prendono origine dal pistillo.

I. SEZIONE. *Diandria*, due stami....

II. SEZIONE. *Triandria*, tre stami....

III. SEZIONE. *Tetrandria*, quattro stami....

IV. SEZIONE. *Pentandria*, cinque stami: *Passiflora*, o *Granadilla*, il fior della Passione.

V. SEZIONE. *Hexandria*, sei stami....

VI. SEZIONE. *Decandria*, dieci stami....

VII. SEZIONE. *Polyandria*, un numero indeterminato di stami, che si partono dalla base del pistillo: *Grevia*.

Nota. Nelle seguenti Classi son separati i fiori maschî dai fiori femmine.

VENTUNESIMA CLASSE.

MONÆCIA. I fiori maschî o a stami, ed i fiori femmine o a pistillo, sono separati sopra dell'istesso individuo.

I. SEZIONE. *Monandria*, uno stame....

II. SEZIONE. *Diandria*, due stami....

III.

(*) I fiori a fioretti, mezzi fioretti, e radiati del Turneforzio.

DISSERTAZIONE.

LXVII

- III. SEZIONE. *Triandria*, tre stami....
 IV. SEZIONE. *Tetrandria*, quattro stami; *Betula*, la Betula, o *Alnus*, l'Ontano; *Buxus*, il Bosso; *Morus*, il Moro.
 V. SEZIONE. *Pentandria*, cinque stami....
 VI. SEZIONE. *Hexandria*, sei stami....
 VII. SEZIONE. *Heptandria*, sette stami....
 VIII. SEZIONE. *Polyandria*, un numero indeterminato di stami: *Quercus*, la Quercia, o *Suber*, il Leccio, o *Ilex*, l'Elce; *Juglans*, o *Nux*, il Noce; *Fagus*, il Faggio, o *Castanea*, il Castagno; *Carpinus*, il Carpine; *Corylus*, il Nocciolo; *Platanus*, il Platano; *Liquidambar*.
 IX. SEZIONE. *Monadelphia*, gli stami riuniti in un sol corpo: *Pinus*, il Pino, o *Abies*, l'Abete, o *Larix*, il Larice; *Thuia*; *Cupressus*, il Cipresso.
 X. SEZIONE. *Syngenesia*, le di cui cime riunite formano un cilindro....
 XI. SEZIONE. *Gynandria*, li stami attaccati allo stilo il quale è infecundo....

VENTIDUESIMA CLASSE.

DIŒCIA. I fiori maschi ed i fiori femmine separati e prodotti da individui diversi.

- I. SEZIONE. *Monandria*, uno stame....
 II. SEZIONE. *Diandria*, due stami; *Salix*, il Salcio.
 III. SEZIONE. *Triandria*, tre stami: *Empetrum*, *Oxys* o *Cassia*.
 IV. SEZIONE. *Tetrandria*, quattro stami: *Viscum*, il Viscchio, *Hyppophæ*, o *Rhamnusoides*; *Myrica*, o *Gale*; *Pistacia*, o *Terebinthus*, il Terebinto, o *Lentiscus*, il Lentischio; *Cerastium*; o *Siliva*, la Caroba.
 V. SEZIONE. *Hexandria*, sei stami: *Smilax*.
 VI. SEZIONE. *Octandria*, otto stami: *Populus*, il Pioppo.
 VII. SEZIONE. *Enneandria*, nove stami....
 VIII. SEZIONE. *Decandria*, dieci stami, *Coriaria*.
 IX. SEZIONE. *Polyandria*, un numero indeterminato di stami....
 X. SEZIONE. *Monadelphia*, gli stami riuniti in un corpo solo: *Juniperus*, il Ginepro, o *Sabina*, la Sabina; *Cedrus*, il Cedro; *Taxus*, il Tasso; *Ephedra*.
 XI. SEZIONE. *Syngenesia*, li stami riuniti a guisa di cilindri: *Ruscus*, il Rusco o *Pungitopo*.
 XII. SEZIONE. *Gynandria*, gli stami attaccati allo stilo, che è infecundo.

VIGESIMATERZA CLASSE.

POLYGAMIA. Trovansi sul pedale medesimo dei fiori ermafroditi, congiunti o a fiori maschi o a fiori femmine, ovvero queste tre specie di fiori; ma importa che sopra qualcuno degl'individui si trovino dei fiori ermafroditi.

Nota. Vi sono in questa Classe dei fiori ermafroditi, in alcuno dei quali la parte maschia è difettosa, e chiamansi *Ermafroditi femmine*; ed in altri è difettosa la parte femmina, e perciò chiamansi *Ermafroditi maschi*.

- I. SEZIONE. *Monacia*, trovati sull'istesso pedale, 1. per *hermaphrodites*, dei fiori Ermafroditi maschi; e dei fiori Ermafroditi femmine....
2. Per *mares*, sempre sull'istesso pedale dei fiori Ermafroditi congiunti a dei fiori maschi: *Celtis*, il Loto.
3. Per *feminas*, dei fiori Ermafroditi con dei fiori femmine sull'istesso pedale: *Acer*, l'Acero.
- II. SEZIONE. *Diacia*, quando trovansi su diversi pedali, 1. per *hermaphrodites*, dei fiori ermafroditi maschi sopra degli uni, e sopra degli altri dei fiori ermafroditi femmine....
2. Per *mares*, quando sopra d'alcuni pedali trovansi dei fiori ermafroditi, e sopra degli altri dei fiori maschi: *Gleditsia*.
3. Per *feminas*, quando trovansi su dei pedali dei fiori ermafroditi, e su degli altri dei fiori femmine: *Fraxinus*, il Frassino.
- III. SEZIONE. *Triacia*, quando sopra diversi pedali trovansi dei fiori ermafroditi, e sopra degli altri dei fiori maschi, e su degli altri anche dei fiori femmine....
- IV. SEZIONE. 4. *Polyacia*, quando queste tre specie di fiori trovansi riunite sull'istesso albero: *Ficus*, il Fico, ove queste tre specie di fiori son riuniti nell'istesso frutto.

VIGESIMA QUARTA CLASSE.

CRYPTOCAMIA. Le piante in cui tutte le parti necessarie alla fruttificazione son poco conosciute, o difficilmente si distinguono.

- I. SEZIONE. *Filices*, delle Felci....
- II. SEZIONE. *Muschi*, dei Muschi o Moscoli....
- III. SEZIONE. *Alge*, dell'Alge....
- IV. SEZIONE. *Fungi*, dei Funghi....

Fine della Dissertazione.

T A V O L A

DEI LIBRI, CAPITOLI ED ARTICOLI

Che si contengono nella Prima Parte.

PREFAZIONE.

Dissertazione intorno all' utilità dei Metodi di Botanica.

pag. v

XXVII

LIBRO PRIMO.

Dell' Anatomia degli Alberi.

INDRODUZIONE.

pag. i

CAPITOLO I. Del Tronco.

3

CAPITOLO II. Della Scorza.

5

ART. I. Dell' Epidermide.

ivi

ART. II. D' una sostanza che trovasi sotto l' Epidermide, e da me chiamata inviluppo cellulare.

13

ART. III. Degli Strati corticali.

15

ART. IV. Della Tessitura cellulare.

22

ART. V. Dei Vasi proprj.

25

ART. VI. Ricapitolazione di questo Capitolo.

27

CAPITOLO III. Del Legno e della Midolla.

ivi

ART. I. Degli Strati legnosi.

28

ART. II. Delle Fibre legnose, o dei Vasi linsatici del Legno.

29

ART. III. Della Midolla, e della Tessitura cellulare.

31

ART. IV. Dei Vasi proprj del Legno.

37

ART. V. Delle Trachee, o dei vasi che in essi non rinferrano altro che aria.

38

ART. VI. Dell' Alburno o Albume.

40

ART. VII. Della causa dell' Eccentricità degli strati legnosi.

45

ART. VIII. Della proporzione che vi è tra la solidità della Scorza e quella del Corpo legnoso, tanto nel tronco degli Alberi quanto nei rami di diversa grossezza.

46

CA.

CAPITOLO IV. Discussione particolare intorno alle Fibre ed ai Vasi, e intorno ai varj liquori che si veggono tanto nella Scorza che nel Legno.	48
ART. I. <i>Delle Fibre o Vasi degli Alberi, e delle Piante.</i>	ivi
ART. II. <i>Dei varj liquori che sono nei detti vasi.</i>	55
ART. III. <i>Della Linfa.</i>	56
ART. IV. <i>Del sugo proprio.</i>	61
ART. V. <i>Dell'Aria rinchiusa nelle Piante.</i>	67
CAPITOLO V. Delle Radici e dei Rami.	70
ART. I. <i>Delle Radici.</i>	71
ART. II. <i>Dei Rami.</i>	83
ART. III. <i>Della proporzione che vi è tralla solidità del tronco degli Alberi, e quella dei Rami che ne sorgono.</i>	85

LIBRO SECONDO.

Dei Bottoni, dei Fiori, e dei Frutti.

CAPITOLO I. Dei Bottoni da legno.	89
CAPITOLO II. Delle Foglie in generale.	94
ART. I. <i>Della posizione delle foglie sui rami, e delle stipule.</i>	95
ART. II. <i>Della forma delle Foglie.</i>	96
ART. III. <i>Delle Foglie semplici.</i>	97
ART. IV. <i>Delle Foglie composte.</i>	100
ART. V. <i>Che la distribuzione dei vasi influisce sulla forma delle Foglie.</i>	103
ART. VI. <i>Anatomia delle Foglie.</i>	104
ART. VII. <i>Delle Foglie rinchiuse nel Bottonone.</i>	ivi
ART. VIII. <i>Del punto in cui le Foglie s'attaccano sui rami.</i>	110
ART. IX. <i>Delle code o gambi delle Foglie.</i>	ivi
ART. X. <i>Delle Foglie nello stato della loro perfezione.</i>	111
ART. XI. <i>Della caduta delle Foglie.</i>	113
ART. XII. <i>Dell'uso delle Foglie relativamente ai vegetabili.</i>	117
CAPITOLO III. Della Traspirazione della Piante.	120
ART. I. <i>Dell'insensibile traspirazione delle Piante.</i>	121

ART.

T A V O L A.

LXXI

ART. II. Della sensibile traspirazione delle Piante.	134
ART. III. Che le Foglie delle Piante s'inzuppano dell'umidità che le circonda.	137
ART. IV. Delle produzioni che fanno le Piante sbarbate.	149
ART. V. Se le Foglie facciano l'ufficio di polmoni.	151
ART. VI. Esperienze fatte per sopprimere la traspirazione e l'inzuppamento del sugo, e per impedire l'introduzione e lo svanimento dell'aria e dalle foglie.	158
CAPITOLO IV. Dei Peli, delle Spine, delle Mani o Viticci delle Piante.	162
ART. I. Dei Peli e dei Corpi glandulosi che sono sulla superficie delle Piante.	ivi
ART. II. Delle Spine.	167
ART. III. Delle mani o visicci particolari di alcune Piante.	172

L I B R O T E R Z O.

Delle Gemme o Bottoni da Fiori e da frusta, e degli Organi della fruttificazione, delle Frusta, dell'uso delle parti dei Fiori e delle Frusta.

CAPITOLO I. Dei Bottoni da fiori, e delle loro parti.	175
ART. I. Dei Bottoni da frutto.	176
ART. II. Dei Fiori completi.	180
ART. III. Del Calice.	181
ART. IV. Dei Petali.	184
ART. V. Degli stami.	191
§. I. Esame degli Stami dei Fiori del Pesco, del Ciriegio, del Pero, e del Melo, guardati colla lente e col microscopio.	192
§. II. Del numero degli stami.	193
§. III. Delle diverse figure dei Pediculi o filetti degli stami, e della forma delle loro cime; e della loro positura nei fiori.	194
§. IV. Della Polvere che vi è nella cima.	196
ART. VI. Dei Pistilli.	198
§. I.	

§. I. <i>Esame del Pistillo del Mandorlo e del Pero.</i>	198
§. II. <i>Dei Pistilli in generale.</i>	200
ART. VII. <i>Dei Fiori non completi.</i>	203
ART. VIII. <i>Di alcune parti soprannumerarie che sono al di dentro o al di fuori d'alcuni fiori.</i>	206
CAPITOLO II. <i>Dello Frutta.</i>	207
ART. I. <i>Ricapitolazione sommaria de' cambiamenti che succedono ai Fiori del Pero e del Mandorlo, da quando si cominciano a vedere nei bottoni, fino a che le frutta sieno allegate.</i>	212
ART. II. <i>Esame anatomico della Pera.</i>	214
ART. III. <i>Delle scanalature o incavature del Calice.</i>	222
ART. IV. <i>Della Tessitura fibrosa della Pelle.</i>	223
ART. V. <i>Dei Vasi.</i>	224
ART. VI. <i>Dei granelli e degl'organi inservienti alla formazione loro.</i>	229
ART. VII. <i>Dell'anatomia delle frutta col Nocciolo.</i>	232
ART. VIII. <i>Della formazione delle Mandorle.</i>	236
ART. IX. <i>Delle Frutta Capsulari.</i>	237
CAPITOLO III. <i>Dell'uso delle parti dei fiori e dei frutti.</i>	239
ART. I. <i>Osservazioni su di quelle Piante in cui per anche non sono ben conosciute le parti maschie e le femmine.</i>	254
ART. II. <i>Delle cause che producono delle nuove specie, o delle varietà che vedonsi nelle Piante dello stesso genere.</i>	259
ART. III. <i>Delle mostruosità delle parti delle Piante.</i>	266





LA FISICA DEGLI ALBERI.

BREVE RISTRETTO DELL' ANATOMIA DEGLI ALBERI.

INTRODUZIONE.

GLI Alberi son formati d'una parte principale chiamata *Fusto* o *Tronco* (*a*) (*Tav. I. Fig. I.*) Dividefi il Tronco abbasso in molte por- Tav. I. fig. 1.
zioni che si spandono in terra; e queste sono le radici o le barbe.

Le principali radici (*b*) si dividono e si suddividono (*c*) in tante
moltiplici biforcazioni fino al grado di diventar sottilissimi fili (*d*)
chiamati *Radici capellose*, o *capillari*.

Dividefi parimente il Tronco in alto (*e*) in molte porzioni chia-
mate *Rami* o *Rame*; le principali di queste si dividono e si suddivi-
dono, nell'istessa guisa delle radici, affottigliandosi sempre più (*f*).
I più piccoli chiamansi *Rami giovani* o *Ramoscelli* o *Fuscelli* (*g*), e
quelli che attualmente sviluppanfi, chiamansi *germogli*, *gemme* o *polloni*.


PARTE I.

A

I pol.

I polloni ed i rami si caricano di Bottoni (*i*), di Foglie, (*b*), di Fiori (*k*) e di Frutta (*l*); hanno talvolta delle spine (*m*). Le Piantе fermentose hanno i rami armati di mani (*n*) con cui si arrampicano ai corpi solidi che incontrano.

Tratterò nella presente Opera, ed esaminerò successivamente la struttura di queste diverse parti degli Alberi, e riporterò quanto si è scoperto intorno alla di loro formazione ed agli usi loro.





LIBRO PRIMO.

CAPITOLO PRIMO.

DEL TRONCO.

IL Tronco, o il Fusto degli Alberi più o meno s'inalza, e più o meno ei va diritto, secondo le specie, e secondo la natura o la situazione del terreno in cui egli cresce. Nei folti Boschi veggonsi le Querce, i Tigli, i Pini alzare i fusti senza ramo alcuno per l'altezza di 50, 60, 80 piedi. Il fusto degli alberi isolati suole produrre dei rami vicini alla terra; e se non si diramano, poco il loro fusto s'inalza: Alcuni alberi sebbene isolati, somministrano talvolta di bei fusti. L'Abete, certe specie di Pioppo e d'Olmì maschi, ponno servir in questo di esempio.

Vi sono alcuni alberi che non son destinati a venir tanto alti come quelli che ho ora accennati: i Carpini, gli Aceri sono di questo genere. Altri pure son destinati a restar più nani: per esempio, i Pomi, i Ciriegi, i Prugni o Sufini, ec.

Potrei dunque dare una scala di gradazione cominciando dal più alto Pino fino al Ciriegio, quantunque tutti portino il nome di *Alberi*, e che tra di loro non vengano distinti se non col dire, che alcuni sono alberi alti; altri, alberi di mezzana grandezza; altri finalmente alberi piccoli.

Quelli per altro che sono di statura inferiore ai Ciriegi e che comunemente piantansi nelle Vigne, si chiamano *Arboscelli*, e si dividono in tre Classi. Nella prima si comprendono gli arboscelli alti, come la Spin'-Alba, il Nespolo, il Cotogno, il Sambuco; quelli di statura mezzana stanno nella seconda Classe, come il *Lilac*, o Lilas, il Sommaco: Quelli della terza Classe sono i piccoli arboscelli, come il Crespino o la Spina agra, lo *Staphilodendron*, il *Coletea* dai fiori gialli.

Quelli finalmente di statura più bassa chiamansi *Arbusti*, i più grandi dei quali ponno essere paragonati al *Bupleurum*, al Citiso piccolo dalle foglie liscie; la *Spiraea* colle foglie d'Iperico può servir per esempio degli arbusti di mezzana statura; la Ruta, l'Assenzio, l'Abrotano, ec. fino al Timo, sono gli arbusti più piccoli.

Quelli che chiamansi *Arbusti*, alcuni Bottonici gli hanno chiamati *sotto-Arbusti*; ma ho creduto che le nove distinzioni ora da me stabilite, bastassero a dare un'idea esatta della grandezza degli Alberi di cui mi son proposto di ragionare nel trattato degli alberi e degli Arbusti, e non ho voluto adoperare tanta precisione intorno ad un oggetto suscettibile di tante varietà, secondo l'età degli alberi, la natura del terreno, ec.

Ciò nulla ostante io debbo avvertire che la maggior parte degli Arborcelli, e quasi tutti gli Arbusti, in vece di avere un'unico fusto, come gli alberi, ne producono, quasi appena dalla terra usciti, un gran numero, i quali formano tutti insieme ciò che chiamasi un *Cespuglio*.

I Fusti di quasi tutti gli alberi ed arbusti sono cilindrici, e per conseguenza il loro punto o taglio trasversale rappresenta la figura d'un cerchio. Lo stesso può dirsi dei grossi rami: ma non è già sempre così dei piccoli; poichè il taglio trasverso dei giovani polloni dà sì più delle volte delle figure da più lati, e uniformi, se non in tutte le specie d'un medesimo genere, in tutte le piante almeno d'un'istessa specie. Ho fatta questa osservazione sopra molti alberi ed arbusti. Il Signor Bonnet l'ha fatta su degli altri; e ci ha sembrato che la figura del piano di questi tagli ordinariamente dipenda da certe scanalature, o certi spigoletti che sporgono in fuori, e che sulle giovani messe si vedono, le quali sogliono prendere la loro origine dall'attaccagnolo delle foglie. Diamone qualche esempio.

L'Ontano, l'Arancio, alcune specie di Pioppi, mostrano dei tagli o piani triangolari: quelle del Buffo, della Fufaggine, e molte volte anche quelle del Pioppo di Verginia, del *Philomis*, presentano dei tagli quadrati; i tagli del Pefco e del Gelsomino giallo sono pentagoni: quelli del *Clematis*, di molte specie d'Apero, di Gelsomino comune, hanno la forma d'un esagono; i Prugni, i Salei, e molti altri alberi presentano il taglio circolare.

Gli Alberi tutti, ed una gran parte degli Arbusti vanno appoco
ap-

appoco perdendo le loro scanalature, e i fusti loro diventano circolari: ma molti Arboscelli ed Arbuti conservano per lungo tempo la prima forma; mi basterà lo addurre per esempio il Ronco e la Fuggine.

Si offervi ancora che molti alberi e molti arbuti, come l'Abete ed il Rosaio, inalzano il fusto perpendicolarmente, qualunque siasi la forma del terreno; altri poi, come alcune specie di Ronchi, immediatamente serpeggiano verso la terra; altri come l'Ellera, armati d'unghie, tenacemente le attaccano ai muri ed agli Alberi; altri provvisti di mani, fatte a guisa di Cava-stracci, strettamente s'avviticchiano agli alberi, ed alle pertiche vicine. La Vite è di questo genere; molti Arbuti non provveduti di mani, s'intralciano tra i rami delle fratte e de' cespugli, come li *Clematis*; Alcuni finalmente, come l'*Evonimoides*, sono senza mani, ma i fusti s'avvolgono attorno ai corpi che incontrano, o s'abbracciano e si avvincono tra di loro quando non trovano più forti appoggi. Tutte queste osservazioni sono molto importanti, e perciò meritano di essere particolarmente esaminate; e quindi dopo di aver fatte alcune generali riflessioni intorno alla esterna forma del Tronco degli alberi, passerò all'esame delle parti che lo compongono.

C A P I T O L O II.

DELLA SCORZA.

SI distingue nella Scorza, l'Epidermide, l'Inviluppo cellulare, e gli strati corticali. Ciascheduna di queste parti della Scorza è di tale importanza, che merita di essere esaminata in altrettanti particolari Articoli.

ARTICOLO I. *Dell' Epidermide.*

TUTTI gli Alberi sono ricoperti esternamente da un'inviluppo generale, quale altro non sembra essere che una membrana sottile, arida e secca. Il confronto fatto di questa membrana, con quella che ricuopre la pelle degli Animali, chiamata dal volgo col nome di pelle morta, ha fatto che molti Autori la chiamino, *Cuscula*, *Soprapelle* o *Epidermide*. Tutti questi termini sono Sinonimi; ma io mi

PARTE I.

A 3

ser-

servirò quasi sempre di quello d'Epidermide. Quando gli alberi mettono col più gran vigore, o (come dicono i Giardinieri) quando sono in pieno fugo, con molta facilità l'Epidermide si distacca da quelle parti che ella ricuopre. Egli è più difficile lo staccarla quando gli alberi non sono in fugo; ed è anche più saldamente attaccata alle secche rame; ma se queste marciscono, naturalmente ella vien via a pezzi grandi: Può anche staccarsi questa membrana dai rami verdi, che non sieno in fugo, col fargli bollire nell'acqua.

Se si esamina la detta membrana sopra d'un qualche albero, si vede che la direzione delle parti che la compongono è circolare rapporto al tronco. La quale osservazione chiarissimamente scorgesi sull'Epidermide dei Ciriegi, dei Sufini, delle Betule, ec. perchè queste tali Epidermidi più agevolmente strappansi per il verso che è perpendicolare all'asse dell'albero, che per il verso parallelo al medesimo; ma vi sono alcune Epidermidi in cui niente manifestasi una tal direzione.

Ho detto che questa membrana forma un generale involuppo, perchè ella trovasi sui giovani tronchi, sui rami, sulle radici, sulle foglie, sui frutti, e fin sui fiori; e se talvolta sui grossi tronchi trovasene qualche pezzo quà e là diviso, questo è l'effetto d'una causa particolare, di cui avrò campo di parlare in appresso.

Io credo che l'Epidermide, che queste diverse parti riveste, non sia d'una tessitura affatto simile: e credo che sia come dell'Epidermide che levasi dalla lingua degli animali, che niente somiglia a quella delle palme delle mani, ed a quella di sotto ai piedi.

I Bruchi, dal Reamur chiamati *Mineuses*, staccano perfettamente e con esattezza l'Epidermide dalle foglie di molti alberi; e questi frammenti d'Epidermide osservati colla lente sono come una sottilissima pergamena o cartapeccora, non perforata da verun poro. Ciò vedesi anche coll'esperienza di un pomo messo nel vuoto; la di cui pelle allora molto si gonfia e si distende, lo che non farebbe, se l'aria potesse attraversarla. Facendo il Signor Bonnet alcune esperienze su delle foglie giacenti sull'acqua, ha potuto molte volte veder l'Epidermide staccarsi dalle parti vicine. Non si può fare a meno, dice questo Autore, di non maravigliarsi della sottigliezza di questa membrana, che paragonar si può a quella pellicina, che formasi sull'acqua stagnante e corrotta; credo per altro, che quelle Epidermidi macerate potessero aver

aver patita una qualche alterazione. Poichè avendo io osservato col microscopio l'Epidermide delle foglie di Quercia disseccate dai Bruchi *Mineuses*, mi è comparsa (fig. 2.) come formata di molte fibre insieme unite, e che le bande o strisce (aa) fossero della medesima tessitura delle restanti parti, con questa differenza però, che la specie della tela è più fissa in quelle, che nell'altre parti. La figura 3 rappresenta l'Epidermide del difotto d'una foglia non affatto consumata dagli Infetti, e vi si scorgono (bb) alcuni fascetti di fibre, i quali sembra che non appartengano all'Epidermide; ma i punti neri che sono nella detta figura, col microscopio compariscono lucidissimi; e quindi essi sono tante aperture, o piuttosto alcuni luoghi ove l'Epidermide è molto più sottile che negli altri.

La Figura 4 rappresenta l'Epidermide d'una pesca pelosa, che era stata strofinata per levar da quella la molta sua lanugine. Questo pezzetto d'Epidermide osservato col microscopio, pareva inzuccherato da un numero infinito di puntini, alcuni più lucidi, altri meno; e scorreasi sugli orli una porzione di peluria o lanugine che eravi rimasta attaccata.

Pare che nella maggior parte degli alberi, l'Epidermide che riveste i rami giovani sia una sola membrana; ho veduto per altro sui rami di molte specie d'alberi, che dopo di aver tolta una laminetta d'Epidermide, di sotto un'altra ve n'era, molto nella sua tessitura somigliante alla prima, ma però più sottile, più verde e più succulenta dell'altra.

La molteplicità degli strati d'Epidermide che vedesi sulla Betula, presenta qualche cosa di singolare. Io ne ho cavati più di sei sottilissimi, e chiaramente gli uni dagli altri distinti, e credo anche che molti altri staccar se ne potessero. La Figura 5 rappresenta una buccia o foglietta esterna d'Epidermide della Betula guardata col microscopio. Ella apparisce formata di fibre sottilissime, poste parallelamente l'una sopra dell'altra, e legate da altre piccole fibre laterali che pajono tanti punti tra i quali vedesi la luce. Tutte queste parti sono talmente sottili e delicate, che si può a stento acquistarne una giusta idea anche coll'ajuto del microscopio.

Credono gli Autori, che sia l'Epidermide formata di secche vescichette. Dice il Malpighi, che nella tessitura vescicolare della scorza del Ciriegio e del Sufino scorgeasi una disposizione di parti, atta a

formar la cuticula di quest'alberi, e che questa disposizione nasce perchè la tessitura vescicolare tendente sempre a dilatarsi verso la circonferenza, trattenuta essendo dall'Epidermide, le vescichette si stacciano e prendono una forma membranosa. Sarebbero mai queste vescichette stacciate quella seconda Epidermide da me osservata sotto la vera Epidermide? Io non dico di sì; ma ecco una osservazione che favorisce l'opinione del Malpighi: ed è, che l'Epidermide è immediatamente posta sopra uno strato della tessitura cellulare, che forma una specie d'inviluppo generale: ne parlerò in appresso. Tutte le osservazioni per altro non si accordano esattamente coll'opinione di questo celebre Fifico; poichè avendo io voluto esaminare col microscopio qualche piccolo pezzo d'Epidermide, ho, per verità, visto alle volte che le striscie da me strappate, erano composte di piccoli corpi ovali di figura talmente regolare, che potevano esser presi per le secche vescichette del Malpighi e del Grewio, ma il più delle volte quelle striscie strappate mi comparivano d'una tessitura uniforme e fissa; di modo che nulla scorgeasi che alla forma di vescica s'avvicinasse.

Ho già detto che il microscopio faceva vedere un gran numero di punti lucidi da me creduti altrettanti piccoli fori: la Figura 6 rappresenta un pezzetto d'Epidermide tolta da un pezzo di Quercia secca: pareva che questa Epidermide, guardata col microscopio, sparso fosse di punti più o meno lucidi o più o meno grossi.

Io dunque giudico, che considerer si possano questi punti lucidi come tante aperture per cui scappa fuori la traspirazione; poichè in seguito di quest'Opera si proverà, che le foglie, i rami giovani e gl'istessi frutti traspirano. Ciò supposto, per quanto tenue siasi la traspirazione, d'uopo è che ella trovi qualche apertura per venir fuori. Oltre a queste piccole aperture, altre grandi anche ve n'ha, ora tonde ed ora ovali: quelle rappresentate sopra l'Epidermide della Betula Fig. 7. (Fig. 7.), sembrano altro non essere che tanti distaccamenti delle parti che costituiscono l'Epidermide, a cagion dei quali la tessitura cellulare da lei coperta, fa una piccola eminenza; le aperture tonde sembrano formate da una produzione di quella medesima tessitura che ha strappata l'Epidermide.

Alcuni Fisici hanno considerate queste produzioni della tessitura cellulare come tante glandule destinate ad operare delle secrezioni particolari. Mi guarderei bene dal contraddire ad una tale opinione; e mi

con-

contenterò d'avvertire, che avendo io posto dentro a dei tubi di cristallo (*Fig. 8.*) pieni d'acqua, dei giovani rami d'albero, ho vedute Tav. I. fig. 8. molte bolle d'aria attaccate a quelle protuberanze della tessitura cellulare. E' ella forse l'aria che esce dalla pianta, oppure sono le bolle che erano restate attaccate alla tessitura cellulare, e divenute sono più sensibili quando il calor del Sole le ha rarefatte? Questa è una questione che si esaminerà in appresso; ma io duro fatica a credere che queste eminenze formate sieno dai vasi esterni: poichè se ne scappa qualche liquore, bisogna ch'egli sia molto tenue, o molto analogo all'acqua; altrimenti egli farebbe manifestato per mezzo d'una nuvola ch'io non ho potuto distinguere.

Egli è per altro vero, che sopra di alcune scorze vedesi la materia di alcune secrezioni; questa è talvolta una sostanza melliflua, come sull'Acero; talvolta una sostanza gommosa, come sul Pioppo; o un sugo concreto, come sul Cipresso.

L'Epidermide è di diverso colore sugli alberi di diverse specie, e sulle diverse parti d'un istesso albero. Sul tronco della Betula ella è bianca e lucida, e sui rami ella è più scura; grigia e cenerina sul Sufino; inargentata e rossa sul Ciriegio; verde sui teneri rami del Mandorlo • del Pesco, cenerina sui grossi rami; bruna su molti alberi, fuorchè sui giovani rampolli, su cui è sempre verde. Non pretendo già d'asferire che questa membrana, la quale il più delle volte è trasparente, non partecipi alcun poco del colore dei corpi da lei ricoperti; dico solamente che ella contribuisce al colore della scorza esterna degli alberi, poichè togliendola, vi si scuopre sotto una sostanza di colore molto diverso.

Ciò che fino ad ora ho accennato è applicabile soltanto all'Epidermide che i novelli rami ricuopre, poichè, come ho già detto, su dei grossi tronchi trovasi questa a brani morti e seccati. E per ciò comprendere, basta il riflettere, che questa membrana secca, arida, e che par morta, sta distesa su di un Cilindro che continuamente s'ingrossa. Quindi ben si comprende, che venendo l'albero sempre più grosso, ella si deve rompere, ma ella è cosa anche più singolare il concepirla capace d'estensione in tutte le sue dimensioni: eppure ella lo è in quanto alla grossezza dei rami, poichè il fusto d'un'albero giovane il più delle volte arriva ad una considerabile grossezza, prima che l'Epidermide che lo riveste comparisca sensibilmente lacerato; ella

ella distendesi per il verso della sua lunghezza, mentre ella si adatta all'allungamento dei polloni novelli.

Si può anche osservare, che l'Epidermide di alcune specie di alberi è più suscettibile d'estensione di quella d'alcuni altri, mentre la superficie del Viscioło rimane per più lungo tempo liscia ed unita di quella degli Olmi. Un'altra circostanza che merita un'ugual riflesso, si è che l'Epidermide degli alberi vigorosi si lacera più tardi di quella degli alberi patiti e deboli, sebbene questi germoglino più lentamente degli altri. Questa prodigiosa estensione dell'Epidermide ella è anche sensibilissima sopra di alcuni frutti, che vengono molto grossi, senza che la membrana si rompa; ma ciò succede quando i detti frutti a poco a poco s'ingrossano; poichè se le copiose piogge producono un rapido aumento di volume nelle pera, per esempio, allora esse vanno soggette a crepare e squarciarsi.

D'uopo è il confessare che tali proprietà dell'Epidermide non si accordano in verun conto coll'idea delle vescichette secche, e che anzi necessariamente conducono a credere, che, quantunque l'Epidermide non comparisca organizzata, e che anzi sembri arsa e seccata, ciò nulla ostante ella cresca come le altre parti degli alberi; quando non si supponesse che a misura che le vescichette seccate vanno le une dall'altre discostandosi, altre vescichette vi sieno prontissime ed atte a riempire gl'intervalli.

Ed infatti sulla scorza degli alberi veggonfi delle piccole e sottilissime laminette, che continuamente si staccano dall'Epidermide; e perdite tali faranno probabilmente riparate senza ritardo da altre fogliette o lamine che sotto di quelle, che se ne vanno, si formino; e quindi l'Epidermide dei vegetabili si distrugge e ritorna continuamente presso a poco come quella dell'Uomo; e se su dei vecchi tronchi ella si rompe, ciò forse succede perchè la reticolare tessitura della scorza si diseca e si discosta, come vedremo in appresso. Terminerò il presente Articolo con alcune Osservazioni che ho fatte intorno all'Epidermide.

1.^o Ho levato da alcuni rami novelli dei pezzetti d'Epidermide, ed ho coperta la piaga con una tela impiastrata di cera e trementina: questa piaga si è in breve tempo di una nuova Epidermide ricoperta, senza che si sia veduto sfogliamento veruno.

2.^o Da altri rami non solo ho levato l'Epidermide, ma anche una
par-

parte della polpa della corteccia; ed ho la piaga come poc' anzi ricoperta. E' successo un leggerissimo sfogliamento, e la piaga della scorza fu trovata rimarginata, e di nuova Epidermide vestita.

3.^o Ho levato da una Betula tutti gli strati dell' Epidermide: ed avendo lasciata scoperta la piaga, è succeduto uno sfogliamento della grossezza d'una moneta di dodici soldi, ed a misura che si andava staccando qualche piastrina sfogliata, vedevasi per di sotto l' Epidermide bianca e naturale della Betula.

4.^o Un mio Corrispondente diletante e dotto, che non ha voluto farsi conoscere (*), levò tutta l' Epidermide dal tronco d' un Ciriegio; questo tronco, per dir così, scorticato, rimase esposto all'aria. La parte della scorza che stava sotto l' Epidermide, si seccò e si sfogliò; un' altro strato più interno si seccò parimente: insomma, dopo due o tre sfogliature, comparve sulla superficie del tronco una specie di sostanza farinacea, e da lì a qualche tempo videsi una nuova Epidermide che andavasi sopra del tronco rigenerando.

5.^o Ho levata tutta la scorza da un vigoroso Ciriegio, mentre che quest' albero era in pieno fugo; in guisa tale, che da per tutta la lunghezza del tronco vedevasi il legno. Difesi il detto tronco così scorticato, dai raggi del Sole e dall' ingiurie dell' aria, con certe avvertenze che dirò in appresso: si formò sul detto tronco una nuova scorza ed una nuova Epidermide, la quale non si riprodusse già col distendersi di quella che rimasta era sulle radici e su i rami, ma a laminette quà e là sparse sul tronco; con tutto che per altro sieno omai scorsi 15 anni da che fu fatta una tale esperienza, questa Epidermide seguita peranche ad essere diversa da quella naturale del Ciriegio.

6.^o Tutti fanno che l' Epidermide non si riproduce su quelle pera dalla grandine percolse, o danneggiate dai bruchi. Vedesi dalle suddette osservazioni, che in certi casi l' Epidermide facilmente si riproduce, ed in altri mai più non ritorna. Ma le mie esperienze danno un qualche lume intorno all' uso di questa membrana; poichè esse provano che l' Epidermide forma un' ostacolo alla troppa traspirazione, poichè ella impedisce, che le parti da lei vestite si secchino e si sfoglino;

(*) Io credo, che questi sia il Signor Ludot di Troies che ha ottenuto il premio dall' Accademia delle Scienze, e di cui vien fatta onorata menzione nelle Memorie di M. Tillot sulla Nebbia, in alcune Memorie del Sig. di Reamur, ec.

no ; non sempre per altro ella produce un tale desiderabile effetto , mentre nelle terre leggiere e esposte al Sud , il Sole secca talmente la corteccia degli alberi , che bisogna fasciar colla paglia il tronco di quelli che sono alti di fusto , e piantati a spalliera sulle colline a mezzogiorno rivolte .

E' stato anche attribuito all'Epidermide un'altro officio , e si è creduto che ella serva d'ostacolo all'ingrossamento degli alberi , e che trattenga le parti da lei coperte , dal troppo gonfiarsi . Sembra che alcune osservazioni appoggino questa opinione .

1.^o Vedesi che l'Epidermide è rotta là dove spuntano certi gobbi o bubboni formati sul tronco dell'Albero . Ma si può con ugual ragione anche supporre che queste prominente abbiano cagionata la rottura dell'Epidermide , come pure che questi gobbi si sieno formati , per essersi in quelle parti squarciata l'Epidermide .

2.^o Se colla punta del ronchetto s'atti un'incisione longitudinale sulla corteccia d'un'albero giovane , si vede più ingrossarsi l'albero , e discostarsi i labbri della piaga . Non ho veduto accader lo stesso effetto tagliando solamente l'Epidermide , senza toccarne gli strati corticali . Togliendo da un'albero un pezzo grande d'Epidermide , non vedesi già in quella parte che verun gobbo si formi ; lo che accader dovrebbe quando le parti che stanno sotto l'Epidermide fossero strettamente imprigionate da quella membrana , come alcuni Fisici hanno creduto .

3.^o Finalmente , rompendosi sui grossi tronchi in mille luoghi l'Epidermide , ella non può altrimenti servir di freno all'aumento di grossezza di quegli alberi , i quali per altro non s'ingrossano se non in proporzione colle altre parti . Egli è però certo che l'Epidermide è molto difesa sulla scorza degli alberi , la qual tensione potrà forse essere necessaria alle gemme nel momento dello spuntare ; poichè essendo le parti tutte di queste gemme allora molto tenere , e succulenti , hanno di bisogno di essere sostenute da una membrana che sia talvolta molto resistente e di fissa tessitura .

Senza ch'io pretenda di fissare una perfetta analogia trall'Epidermide dei vegetabili e quella degli animali , terminerò il presente Articolo col confronto di queste due membrane .

1.^o Se credesi che l'Epidermide degli alberi sia formata di vescichette o d'utricoli disseccati , perchè non si può anche credere che l'
Epi-

Epidermide degli animali sia formata dal disseccamento delle parti da lei ricoperte?

2.° Ambedue queste Epidermidi sono capaci d'estensione quando cresce il soggetto a cui appartengono, o quando egli molto si distende: nell'idropisia e nella grassezza a qual grado mai di dilatazione ella giunge! Quanto mai convien che si distenda l'Epidermide d'una pera buonacristiana!

3.° Tuttadue facilmente ritornano, non già coll'accoltarsi come fa la carne; ma ritorna su tutte quelle parti da cui fu tolta, come ho già detto nel dettaglio delle mie esperienze.

4.° L'Epidermide vegetabile e l'animale si disfa a piccole particelle, e si riproduce incessantemente ed invisibilmente.

5.° Non è stato fino ad ora nè veduto nè detto niente di convincente intorno alla formazione, alla rigenerazione, e nemmeno intorno alla tessitura dell'epidermide vegetabile ed animale.

6.° Sembra che l'uffizio d'ambidue sia quello di difendere le parti che esse ricuoprono.

7.° Il Grewio dice espressamente, che l'epidermide non è in verun conto prodotta dal contatto dell'aria, ma che trae la sua origine dall'istesso granello, e che altro non è che la cuticola che ricuopre al tempo del germogliamento la penna, la quale va distendendosi a misura che la pianta cresce: lo stesso è appunto dell'epidermide degli animali, la quale esiste anche nel grembo della loro madre.

8.° Il Rayo paragona l'epidermide delle piante alla spoglia delle serpi. Alcuni alberi, come la Betula, i Platani, i Gelfomini, l'Uva spina, la Vite, pare che si spoglino come le serpi; ma ve n'ha per altro molti, che per molto tempo la loro epidermide conservano.

Passo ora ad esaminar quelle parti, che si scuoprono dopo di aver levato questo primo inviluppo.

ARTICOLO II. *D'una sostanza che trovasi sotto
l'Epidermide, e da me chiamata
Inviluppo cellulare.*

LEVATA che sia l'Epidermide, trovasi immediatamente sotto di quella una sostanza il più delle volte d'un verde assai carico, e quasi sempre succulenta ed erbacea. Esaminando questa sostanza con una semplice

plice lente, mi è parsa paragonabile ad un pezzo di feltro o di pelle di Camozza; perchè vedesi ch'ella è formata d'un copioso numero di filamenti sottilissimi intrecciati in tutte le possibili direzioni. Dopo di averne esaminato con debolissimo microscopio un pezzetto ch'io aveva tenuto per molto tempo a macerarsi, questa sostanza mi è comparsa simile alla sostanza midollare. Con una lente più acuta vi ho distinti quà e là sparsi dei piccoli corpi ovali di figura molto regolare, i quali erano separati dalla massa. Ho esaminati uno di questi corpiccioli con una lente molto acuta; e m'ha parso simile a dei piccoli frammenti di midolla; intrecciato da molti tramezzi o da sottilissime fibre. Questo è quanto ho potuto discernere col microscopio intorno all'organizzazione di questa sostanza.

Facendo bollire nell'acqua un ramicello, si cuoce la detta sostanza, ed allora è simile ad una pasta. S'indurisce freddandosi, e fatta secca diventa friabile.

Non si trova sempre in tanta copia, nè con tanta facilità s'incontra in tutti gli alberi; ma in quelli ove, come per esempio nel Sambuco, essa facilmente si vede, può osservarsi che ella è più succulenta nel tempo del fugo, che nell'inverno: e quindi quando ella è piena di molto fugo, è meno attaccata all'epidermide di quello sia quando ella è meno umettata. Volendo dunque staccare qualche pezzetto d'epidermide, anche quando gli alberi non sono in fugo, d'uopo è di far bollire un ramo nell'acqua, e levar l'epidermide prima che il detto ramo sia freddo; perchè l'epidermide sta più attaccata dopo che il ramo è freddo di quello fosse avanti la cucinatura.

A norma di quanto si è detto di sopra, la sostanza di cui ora si parla, pare che sia formata da un'ammasso della tessitura cellulare o vescicolare di cui parleremo in appresso; ma avendola io veduta sui rami, sulle radici, e su di alcuni frutti, ho creduto che si potesse ravvifarla come un'inviluppo generale, e di poter prender l'arbitrio di chiamarla l'inviluppo cellulare.

Egli è vero, che la detta sostanza suol essere il più delle volte d'un color molto verde, e molto diverso dal restante della tessitura cellulare, la quale quasi sempre tende al bianco. Ma essendo abbastanza noto che il verde color delle foglie nasce dal contatto della luce, e che quelle che crescono all'uggia o all'ombra sono bianche; perchè non si può anche congetturare, che quella porzione della tessitu-

ra cellulare per essere la più esterna, abbia potuto prendere un colore di cui il rimanente ne è senza?

Ho levato qualche pezzetto d'Epidermide, ed ho lasciato esposto all'aria l'inviluppo cellulare; allora ei s'è sfogliato, e vedesi per di sotto una nuova Epidermide: ho fatta una tale osservazione sopra la Betula. Quando levava dagli Olmi giovani l'inviluppo cellulare insieme coll'Epidermide, aveva l'avvertenza di cuoprire la parte tagliata con della cera e della trementina, ed allora la piaga sollecitamente chiudevasi, senza che appena vi si scorgesse la cicatrice.

Io per altro non ho osservazioni sicure abbastanza intorno alla formazione di questo inviluppo; sospetto solamente, ch'egli sia prodotto da una estensione della tessitura cellulare che si staccia e comprimesi sotto dell'Epidermide. Questa opinione non si discosta molto da quella del Malpighi da me riferita nell'Articolo precedente. In quanto agli uffici di questo succulento inviluppo, si potrebbe congetturare ch'egli serva a prevenire il disseccamento delle parti da lui ricoperte. Può anche esser ravvisato come l'organo che separa la materia della traspirazione, e potrebbe anche contribuire al rifacimento dell'Epidermide, perchè molti Anatomici credono che l'Epidermide degli animali sia formata dalla estremità dei vasi esterni della pelle; e quindi l'analogia ci farebbe accostare all'opinione del Malpighi e del Grewio. Queste per altro sono pure congetture, il di cui principal vantaggio farebbe quello di impegnare gli studiosi, che si dilettono di fare delle ricerche intorno alla economia vegetabile, a rivolger le loro viste sopra questi varj punti, i quali meritano di essere esaminati e schiariti.

Sotto di questo inviluppo cellulare si veggono dei piani di fibre longitudinali che serviranno di materia per il seguente Articolo.

ARTICOLO III. *Degli Strati corticali.*

TUTTA la sostanza racchiusa trall'inviluppo cellulare ed il legno, pare che sia formata, 1.^o, da fibre longitudinale ch'io considero come tanti vasi linfatici, per la ragione ch'io dirò in appresso; 2.^o da una tessitura cellulare, vescicolare o parenchimatica (considero questi termini come Sinonimi); 3.^o da fibre da me dette *Vasi propri*, tanto se in essi rinferanno un liquore bianco come il latte, o gomma, o resina, ec.

Co-

Comincerò dall'esame delle fibre linfatiche; ed essendo queste disposte a strati che tra di loro si cuoprono, farò in primo luogo la descrizione d'uno di questi strati, di quello, per esempio, che è il primo a presentarsi subito che levata sia l'Epidermide e disfatto l'involuppo cellulare: sarà facile allora di acquistare un'idea di quegli altri che sono più interni. Giova l'osservare che tutti questi strati, separati che sieno l'uno dall'altro, rappresentando le carte d'un libro, li hanno gli Autori chiamati *Strati del Libro*; con questa differenza però che il Grevio comprende sotto questo nome tutti gli strati corticali, ed all'incontro il Malpighi ha attribuito questo nome solamente agli strati, o forse allo strato più interno.

Sotto l'involuppo cellulare, di cui ho già parlato nel precedente Articolo, vedesi un'intrecciatura reticolare, o una reticella di fibre longitudinali, le di cui maglie son grandi e facilmente visibili, anche ad occhio nudo, e specialmente allorchè sia disfatta la tessitura cellulare che ne riempie gl'interstizj. Per ottenere l'intento di disfare questa cellular tessitura, ho tenuto per anni intieri a macerar dei rami di Tiglio; e quindi ho potuto agevolmente tirar via l'Epidermide e l'involuppo cellulare. Colla punta d'uno stuzzicadenti o con qualche cosa di simile; ho levata una porzione della tessitura cellulare. Mi è tornato talvolta meglio il far bollire un pezzo di corteccia, per ammorbidire la tessitura cellulare, che in tal guisa più facilmente staccavasi, e poteva meglio distinguere la reticella delle fibre longitudinali, oltre di che, così facendo, gli strati corticali e reticolari con molta facilità si separavano.

Lo strato più interno esaminato ad occhio nudo, appariva formato di fibre uniche, che s'incastano, si attaccano, o si congiungono le une coll'altre. Ma esaminando col microscopio una porzione di questa rete, anche una debole lente basta a far vedere che ogni filo della detta rete che pareva semplice ed unico, egli è realmente un fascetto di filamenti separabili gli uni dagli altri in guisa che se si vede, che la scorza degli alberi più facilmente si strappa secondo la lunghezza dell'albero, che secondo la circonferenza del tronco, ciò nasce perchè in questo ultimo caso bisogna romper le fibre; nel primo caso all'incontro altro non si fa che separarle tra di loro.

Ho posta sopra una lastra una di queste fibre apparentemente unica e macerata nell'acqua; l'ho agevolmente separata in quattro o cinque

que fibre più sottili; una di queste cinque fu separata in altre quattro, e una di queste quattro in altre due o tre, ma talmente sottili che vi abbisognò per distinguerle una lente acutissima: (*Tavola II. Figura 1.*) Non mi lusingo per altro di essere arrivato alla totale ed ultima divisione delle dette fibre. Quando vedesi una fibra della reticella divisa in due o tre rametti, non bisogna dunque formarli l'idea d'un tubo che si separi in due o tre rami, nè immaginarsi la biforcazione dei vasi sanguigni: Sono queste fibre molto più simili ai nervi. E quindi considerer bisogna i filamenti d'un vaso corticale come tanti fascetti uniti insieme, che prendono prima una direzione tra di loro parallela; ma presto cangiasi quell'ordine regolare come ora vedremo.

Uno o più fili (*Tav. I. fig. 9.*) abbandonano il fascetto di cui Tav. I. fig. 9. erano parte; inclinano più o meno obliquamente verso d'un altro fascetto; talvolta s'uniscono a quello e ne seguivano l'andamento; talvolta ritornano ad attaccarsi al fascio abbandonato, ovvero uniscono ad altri fili che incontrano, ed allora formansi fascetti nuovi, i quali così deviando, o vengono più grossi appropriandosi nuove fibre, o si assottigliano se una porzione delle fibre loro gli abbandoni.

Troppo lungo ed inutile sarebbe lo esattamente descrivere tutte le varietà che osservare si possono nella divisione, separazione e riunione delle fibre che formano i fasci principali, e per ciò vedasi la citata figura, ove potraffi acquistarne un'idea sufficiente.

Vedesi in questa figura che i fili di cui si ragiona, sono disposti a fascetti, e che o in un punto o nell'altro, un numero maggiore o minore di questi fili si separa da quel fascio per andare ad unirsi ad un'altro, che i fili medesimi o altri ancora vengono poi a riunirsi al primo fascio, o dei nuovi se ne formano; e che da tutto ciò ne risulta una irregolarissima reticella. Questi fili adunque non si distendono dal basso all'alto dell'albero in linee rette, ma serpeggiando; lo che non impedisce, che riguardo alla loro direzione generale, io chiamar non gli possa, con molti Autori, le fibre longitudinali della scorza, o semplicemente, le fibre corticali; ed io chiamo *Plesso corticale*, la reticella formata da queste fibre.

Le fin quì riportate osservazioni intorno alle fibre corticali, non somministrano per anche l'idea dei vasi o dei tubi destinati alla distribuzione dei liquori; ciò null'ostante io mi trovo altrettanto dalle

molte ragioni che addurrò in appresso, a considerarle col Malpighi, col Grewio, e con il Leuwenhoeckio come veri vasi linfatici. Prima di por fine a ciò che spetta ai fili che formano i diversi plessi o intrecciature della corteccia, debbo avvertire di aver trovato alcuni vasi, che le acute lenti del mio microscopio non mi hanno permesso di farmeli veder composti d'un fascetto di fili simili a quelli poc' anzi descritti; e quindi non oserò decidere se questi vasi sieno d'una natura diversa dagli altri. La figura 10 (*Tav. I.*) dà, a un di presso, un'idea di quei vasi che io ho detto esser formati da fascetti di fili, e la figura 11 di quelli che sembrati mi sono diversi.

Tav. I. fig. 10.

e 11.

Fig. 9. Gli spazi che veggonsi tra le fibre longitudinali, (*b fig. 9. Tav. I.*) o piuttosto, le maglie del plesso o intrecciatura reticolare, sono ripiene d'una sostanza granosa, di cui parlerò dopo che avrò accennato qualche cosa degli strati corticali che trovansi sotto di quello poc' anzi descritto.

La grossezza della Scorza ella è tutta formata di fogliette o di strati sottili che si ricuoprono o s'involuppano l'uno coll'altro; ciascuno di questi strati è un'intrecciatura o plesso reticolare, simile a quello che vedesi nella figura citata, se non che i fascetti che lo formano, quanto più sono interni, tanto più sono sottili; le maglie della reticella divengono allora sempre più piccole, in guisa tale che i plessi o intrecciature diventano talmente sottili negli strati interni, che quasi credere si potrebbe che le maglie sono annichilate: Le fibre sembrano parallele, e le intrecciature reticolari sembrano non esser altro che sottilissime laminette. Lo stato diverso di questi strati vien rappresentato dalle figure 9, 12, 13, 14 e 15 (*Tav. I.*)

Fig. 12, 13,
14 e 15.

Dopo le mie esperienze io per altro inclino a credere, che le fibre longitudinali che formano gli strati interni, sieno disposte a reticella come negli strati esterni.

1.^o Perchè avendo tenuto per molto tempo a macerare le laminette interne della Scorza del Tiglio, per disfare la tessitura cellulare, ed avendole poi guardate col microscopio, le maglie mi sono diventate sensibili.

2.^o Pare che non si possa omai più porre in dubbio che le lame corticali non sieno attraversate dalla tessitura cellulare; e se questo è, bisogna che i fascetti lascino tra di loro uno spazio che dia luogo alla detta tessitura. Sarà forse la troppo intima coesione della tessitura

tura cellulare colle fibre corticali, quella che non lascia che distinguansi le maglie degli strati interni di alcune scorze, tanto più che è necessario il foccorfo delle inacerazioni e delle preparazioni per scuoprirle nelle interne lamine della scorza del Tiglio, quantunque quest' albero mi sia sembrato uno dei più adattati a tali esami.

Non voglio per altro asserire che le fibre longitudinali formino un plesso reticolare nella scorza di tutti gli alberi, quantunque sia questa l'opinione del Malpighi; poichè, oltre al trovarsi alcune laminette corticali in cui le maglie della reticella non sono in verun conto visibili, avrò forse l'opportunità di parlare in appresso di alcune scorze, o di alcuni fascetti di fibre, i quali sembrano prolungarsi in linea retta senza avere veruna comunicazione tra di loro se non per la tessitura cellulare.

Se si esamina un fascetto di fibre longitudinali preso dallo strato più interno della scorza, per confrontarlo con un fascetto simile preso da uno strato esterno, si vedrà che questo è più grosso, meno fisso dell'altro, e che egli è come incrostato; ma col foccorfo della macerazione e del microscopio si verrà in chiaro, che tanto l'uno che l'altro formati sono d'un ammasso di sottilissime fibre ed assai forti, quelle specialmente degli strati interni, che sono meno delle altre soggette a rompersi, quantunque più sottili e pieghevoli.

Non so se il numero degli strati corticali sia in proporzione coll'età degli alberi. Ho diligentemente separati tutti gli strati d'un pezzo di scorza staccata dal pedale d'un Tiglio giovane di 10 in 11 pollici di circonferenza; ho parimente separato tutti gli strati corticali d'un altro pezzo di scorza del Tiglio medesimo, staccato dalla cima del fusto, ivi grosso 5 in 6 pollici solamente; e non mi fu possibile di separare il pezzo preso dalla cima dell'albero in più di 7 laminette; e l'altro all'incontro del pedale si è facilmente separato in diciassette laminette. Essendo la scorza del pedale degli alberi più vecchia di quella della cima del fusto, concluderei dalla mia dissezione, che il numero degli strati corticali si moltiplica a misura che gli alberi invecchiano, s'io fossi ben sicuro di aver separati tutti gli strati, tanto della cima che del pedale del mio giovane Tiglio; e se potessi esser anche sicuro, che l'albero della mia esperienza veramente avesse allora anni 17, crederei di avere acquistata una prova che ognianno si formi un nuovo strato corticale.

Tav. I. fig. 9,
12, 13, 14, 15.

Per formarfi un'idea di ciò che compone la scorza, bisogna immaginarfi un corpo composto di molti strati di reticella simili a quelli delle figure 9, 12, 13, 14, e 15 della (*Tavola I.*), ove vedesi che le maglie d'alcuni sono grandi, e quelle degli altri sono sempre più piccole fino a segno di divenire appena percettibili. Il corpo dell'albero è ricoperto di tutti questi strati coll'ordine notato (*fig. 16.*) di modo che lo strato n.º 1 si è quello della reticella più fina della figura 15. Questo è coperto dall'altro n.º 2, corrispondente alla figura 14 le di cui maglie sono alcun poco meno strette, e così degli altri, n.º 3, 4, 5, 6, corrispondenti alle figure 13, 12, ec. di modo che la reticella dalle maglie più grandi, arriva a ricuoprire tutti gli altri.

Potrebbe esser domandato se le maglie di tutte le reticelle sieno corrispondenti, cioè, se gli spazj vuoti di tutte le intrecciature s'iano gli uni in faccia degli altri, ovvero, locchè viene ad esser lo stesso, se le fibre longitudinali della scorza sieno l'une su dell'altre ammucchiate, o se s'incrocicchino. Per pormi in istato di rispondere a tal domanda ho preso un pezzo di scorza di Tiglio lasciato a macerare per lungo tempo nell'acqua; portai affatto via molti di quelli strati interni in cui poco la reticella si scorge, come pure alcuni degli strati esterni, per essere la reticella troppo dilatata al mio caso, ed essendo tanto gli uni che gli altri niente favorevoli al mio disegno, gli posi da banda; poi diligentemente feci l'incisione di quella rimanente porzione della scorza, di modo che gli strati erano l'uno dall'altro staccati la metà solamente della larghezza del detto pezzo di scorza, e nella altra metà erano tutte restate unite insieme. (veg-

Fig. 17. gasi la *Fig. 17. Tav. I.*) Disfeci, per quanto mi fu possibile, la testitura cellulare, e rimisi, alla meglio, i cinque plessi o intrecciature nella loro natural situazione; lo che potei agevolmente eseguire, per aver, come ho detto, lasciati i plessi o intrecciature attaccate insieme per la metà della larghezza del pezzo di scorza, sopra di cui io studiava. Interponendo quindi le cinque fogliette o lamine rimesse al suo luogo tralla luce e l'occhio, altro non vidi che una reticella molto simile a quella della lamina interna, lo che mi dà a credere che le maglie di tutte le reticelle poste sieno in maniera che i campi o spazj loro formino, col di loro accozzamento, degli imbuti o alveoli, la di cui più larga apertura sia dalla parte dell'involuppo cellulare, e la più stretta dalla parte del legno.

Ed

Ed ecco un'osservazione che può alquanto corroborare una tale opinione. Esaminando col microscopio una sottilissima fetta di un ramo giovane di Tiglio, là dove fanno capo le linee rette, che dal centro del legno fino alla corteccia si estendono, si vedono certi spazj più verdi del rimanente, e sembrano formati da un numero di linee che descrivono una specie di cerchj; e tra questi spazj veridastri altri se ne veggono ripieni d'una sostanza bianchiccia, la quale sembra come sostanza midollare: molte di queste macchie bianchiccie sono più larghe dalla parte dell'epidermide che dalla parte del legno; lo che mi dà a credere essere queste macchie bianchiccie formate dalla tessitura cellulare che riempie quegli alveoli già nel precedente Articolo indicati. Si concepirà una chiara idea di questa microscopica osservazione col dare un'occhiata alla *figura 2. della Tavola II.* Dico per altro, che la riferita osservazione è troppo debole e delicata per poterla francamente appropriare a tutte le scorze. Ma se ciò fosse, abbisognerebbe, per formare la tessitura della scorza colle laminette reticolari, che le maglie delle reticelle si aumentassero uniformemente e proporzionatamente al di loro slontanarsi dal corpo legnoso; ed essendo questo allontanamento delle fibre longitudinali prodotto dall'aumento di grossezza del corpo legnoso, le fibre delle reticole esteriori devono slontanarsi più di quelle delle reticole interiori, proporzionatamente all'allontanarsi che esse fanno dall'asse del corpo legnoso. Credo d'aver detto abbastanza intorno a questi pretesi Alveoli; essi, o piuttosto le maglie delle reticole sono ripiene della tessitura cellulare di cui ragionerò nel vegnente Articolo. Terminerò questo col fare osservare, che gli strati reticolari di tutte le scorze non si rassomigliano in verun modo: per esempio, la reticola del legno fatto a trina o trinato (*Fig. 3. Tav. 2.*) è affatto diversa dalla reticola della scorza del Tiglio. Io ho una laminetta corticale della Palma (*Fig. 4.*) la quale è formata di due piani di grosse fibre, che obliquamente s'incrocicchiano. Ci vengono portate dall'America certe specie di berretti lavorati come una calza da ipocrasso o vin bianco; servono d'inviluppo ai grappoli o sostentacoli delle frutta d'una specie di Palma: la tessitura di tal sorta di berretti è composta di molti piani di fibre, simili a un dipresso a quelli della *figura 4.*, anche queste fibre s'incrocicchiano, ma sono molto più sottili.

Tav. II. fig. 2.

Fig. 3.

e 4.

ARTICOLO IV. *Della Tessitura cellulare.*

SECONDO l'idea che ho data dei plessi reticolari, i quali, per dir così, formano l'ossatura della corteccia, rimangono molti spazi vuoti, che debbono essere riempiti, poichè gli Alveoli che formano i plessi per la reciproca disposizione della loro reticola, sono in gran numero.

La sostanza che gli riempie è granosa. Il Grewio la chiama il Parenchimo; il Malpighi la tessitura vescicolare, o otricolare; io la chiamerò quasi sempre la tessitura cellulare, per le ragioni che in breve dirò.

Il Malpighi ed il Grewio ci rappresentano la detta tessitura come formata di piccole vescichette, borse o otricoli, i quali, immediatamente toccandosi, formano dei fili o delle continuazioni di vesciche, la di cui direzione è orizzontale, di modo che questi fili di vescica tagliano ad angoli retti le fibre longitudinali, lo che fa un intralciamento somigliante molto a quello delle frasche che compongono una graticcia. Per finir di dare, coll'ajuto di un tal paragone, un'idea alquanto chiara del parere del Malpighi e del Grewio, bisogna immaginarsi, che le fibre longitudinali disposte siano come le frasche o ramicelli componenti la graticcia; ed i fili, o continuazioni delle vescichette rappresentati sono dalle traverse della graticcia, che incrociano ed uniscono col di loro intrecciamento i ramicelli o frasche che poste sono per il lungo della graticcia.

Secondo il parere di questi due Autori tutti gli otricoli non sono della istessa grossezza, e neppure della medesima figura; perlochè il Grewio le paragona alla spuma, che fa il vin dolce quando fermenta; il qual paragone dà abbastanza l'idea d'una tessitura cellulare.

Sembra che la carne o polpa delle frutta sia per la maggior parte una massa di tessitura cellulare molto dilatata e piena di sugo.

Se così è, le vescichette compariscono molto visibili in certi frutti, come nell'arancie, (*Tav. II. fig. 5.*) ma in altri frutti elleno non sono così visibili, come nelle pera, nelle mela, in cui ho scoperto un numero infinito di vasetti, i quali vanno a far capo a certi corpi granosi che chiamansi pietre qualora abbiano acquistata una certa durezza (*Fig. 6.*). La carne dell'albicocche, delle pesche, delle susine, ec. sembra formata da un'intralciamento di moltissimi vasetti rivestiti di finif.

finissima lanugine: quando si accordi, che la carne dei frutti sia una tessitura cellulare molto dilatata ed inzuppata di sugo, dalle riferite osservazioni ne risulterebbe, che la detta tessitura è organizzata diversamente negli alberi di diverse specie, lo che pure sembra, che debba essere una conseguenza di alcune mie osservazioni sulla midolla.

Ho esaminata col microscopio la tessitura cellulare delle radici assorbenti, e non ho veduto se non piccoli fiocchi o gruppetti simili a dei piccoli pezzi di midolla d'albero, o alla schiuma di sapone, come il Grewio ce la descrive.

Ho parimente esaminato col microscopio dei piccoli pezzi della tessitura cellulare staccata, per via della macerazione, da alcuni rami di Tiglio (*Fig. 7.*): alle volte io ne staccava dei piccioli corpi ovali di figura regolare, e da me creduti le vescichette del Malpighi e del Grewio; ma il più delle volte non vi trovavo niente di regolare; e quando sottoponeva uno di questi piccoli corpi ovali a una lente acuta, vi scorgevo anche un piccolo frammento di midolla d'albero: e realmente confesso di non aver potuto distinguere negli alberi, con bastante chiarezza, le borse o gli otricoli del Malpighi e del Grewio. Non nego per altro, che queste non vi sieno; ma dico solamente, che le mie microscopiche osservazioni mi hanno data l'idea d'una tessitura cellulare, paragonabile, come anche il Grewio ha detto, alla spuma del vino che fermenta, o alla saliva, in cui parebbe che vi fossero dei granellini d'una sostanza più compatta, forse non molto dissimigliante dal resto della tessitura cellulare. Tav. II. fig. 7.

Avendo io osservato con un microscopio, che ingrandiva molto gli oggetti, alcuni pezzi di tessitura cellulare lasciata lungamente a macerare, ho visto, che essi erano attraversati da molte fibre di una tal sottigliezza, che non ho potuto nemmeno acquistarne una precisa idea; ma mi fanno per altro dubitare, che non si possa veramente ben conoscere la vera struttura della tessitura cellulare, la quale non è forse tanto semplice quanto si crede, nè, come ho già detto, uniforme in tutti gli alberi.

Chechè ne sia, questa sostanza vescicolare, o cellulare riempie le maglie della reticella, o gli Alveoli che quelle formano; di modo tale, che essa trapassa e penetra per tutti gli strati della corteccia, e dal corpo legnoso fino all'epidermide si dilata: negli Alveoli comparisce granosa; ed i fiocchetti o grani della tessitura cellulare sono

più larghi e più duri negli esterni strati corticali, che in quelli che stanno vicini al legno.

Il colore di questa sostanza non è assolutamente lo stesso in tutti gli alberi, e molto più facilmente si osserva la situazione, rispetto alle fibre longitudinali, quando il suo colore è diverso da quello di tali fibre. Una circostanza, che pure è molto favorevole alle osservazioni, si è allora quando la detta sostanza è più tenera e più succulenta delle fibre longitudinali; poichè siccome ella si contrae col disseccarsi, allora le fibre longitudinali diventano più distinte.

Pare che il Malpighi supponesse esservi una lastra o lamina di tessitura cellulare, interposta tra gli strati corticali formati dai plessi reticulari. Mi sembra difficile di rettificare una tale opinione per tutte le scorze; ma ciò che appoggiar potrebbe il sentimento di questo Autore, si è, che avendo staccate alcune fibre longitudinali da un pezzo di scorza di Tiglio, che era stato per molto tempo nell'acqua, pareva da ogni parte vestito della tessitura cellulare, come può vedersi nella *Figura 8.* in guisa che volendo formarli un'idea della situazione della tessitura cellulare sopra delle dette fibre, bisogna immaginarsi un fuscello di paglia intriso in una materia viscosa, e rivoltato nella semola; allora i gruppi o fiocchetti di semola che vi resteranno attaccati, faranno perfettamente vedere la disposizione della tessitura cellulare sopra le fibre longitudinali.

Scorronsi nelle grosse cortecce della Quercia, del Pioppo, ec. dei corpi duri il più delle volte di figura cubica. Crede il Malpighi, che questi sieno formati da un deposito tartaroso, che deve esser considerato come una depurazione del sugo nutritivo: vero si è, che queste concrezioni sogliono essere ordinariamente più dure del rimanente della tessitura cellulare; nulla ostante si dividono in grani, e potrebbe darli, che altro esse non fossero che un'ammasso della tessitura cellulare molto ferrato e fisso, o pure un'ammasso di quei piccoli granelli che si vedono nella tessitura cellulare; come le grosse pietruzze, che trovansi nelle pere, altro non sono che un'unione di infinite piccole pietruzze, le quali non si distinguono quando non vi si presti una speciale attenzione. Dico per altro, che non trovandosi questi corpi nella scorza di tutti gli alberi, e neppure nella scorza delle querce giovani, sembra non esser questi organi essenziali e necessari alla vegetazione; lo che m'elimina dal dikungarmi di vantaggio sopra tale materia.

A R-

ARTICOLO V. *Dei Vasi proprj.*

OLTRE i vasi linfatici e la tessitura cellulare, scuopransi nella dissezione delle piante anche dei vasi d'un'altra specie, ma che non compariscono in tanto numero come i vasi linfatici. Si distinguono, 1.^o dalla grossezza la quale suol'essere grande abbastanza, perchè, tagliandole, uscir possa il liquor che racchiudono; 2.^o dal di loro colore, che suol esser diverso da quello dei vasi linfatici, che in molti alberi è d'un verde molto carico; 3.^o finalmente, dal liquore che rinferano, il di cui colore o qualità varia secondo le diverse specie degli alberi e delle piante: per esempio, nel Fico egli è bianco, rosso nel Carciofo, giallo nella Celidonia, gommoso nel Ciriegio, resinoso nel Pino, ec.

Essendo verisimile, che ogni Pianta abbia il suo sugo particolare, e proprio, per ciò si sono chiamati *Vasi proprj* quelli che tali liquori rinferano. Parleremo in appresso più diffusamente di questi vasi e di questi liquori proprj, bastandomi per ora di darne quivi un'idea generale.

Il Signor Mariotte ha trattato di questi vasi e gli ha paragonati all'arterie degli Animali; ed ecco ciò ch'ei dice della loro organizzazione: „ Questi canali sono infilati da una bianca fibra legnosa, „ che può dividerli in più filamenti: attorno ai detti canaletti scor- „ gesi una membrana che gli separa dal resto del fusto, e ne forma „ come un piccolo tubo, e tra ciascheduna fibra della detta membra- „ na avvi una materia spugnosa attaccata alla membrana medesima, „ e ripiena di sugo colorito. Il rimanente del fusto è ripieno d'un' „ altra materia spugnosa piena d'un'umore acquoso insipido, senza „ colore, e d'una fluidissima consistenza; ed all'incontro, la mate- „ ria colorita è alquanto fissa, ed in molte piante, di sapore molto „ pungente.

„ Vedesi una simile struttura nelle foglie dell'Aloe tagliate per „ traverso; perchè osservasi che il mezzo, che ha circa un pollice di „ grossezza, è d'una sostanza spugnosa, composta di moltissime mem- „ brane confuse insieme, e ripiene d'un'umore acquoso, chiaro, e po- „ co o niente amaro.

„ Si osserva parimente, che la tessitura (da me chiamata cellu- „lare) è ricoperta d'una verde scorza, nella di cui grossezza vi so-

„ no

no molti canaletti nerici, disposti secondo la lunghezza delle foglie, e fornigianti a quelli delle Piante latticinose.

Scorre per questi canali un sugo viscido, gialliccio e molto amaro, e nel mese di Maggio copiosamente trasuda. Ma nella polpa (o tessitura cellulare) vi sono molti canaletti bianchicci, i quali probabilmente racchiudono un'altro sugo, e quà e là gettano dei piccoli ramicelli, qualcuno de' quali va ad unirsi ai tubi per cui va scorrendo il sugo giallo ed amaro.

Ho anche osservato, che molte grosse piante latticinose, come la Ferula, hanno certi canaletti disposti in distanze uguali, cominciando dal centro del fusto fino alla circonferenza; e che la maggior parte dell'altre piante, come la Scorzanera, il Titimalo, la Celidonia, ec. ne hanno solamente due o tre ordini o piani vicini alla circonferenza del fusto.

Questi canali, coi loro bianchi filetti e la loro materia spugnosa di colorito sugo ripiena, si prolungano dal fusto ai rami, e fino all'estremità delle foglie, ove formasi una tessitura a guisa di reticella, la quale contribuisce alla formazione di quelle costole o nervetti, che vedonsi nelle secche foglie, ed anche nelle verdi; e si prolungano anche fino all'estremità delle radici. L'Angelica lucida del Canada lo fa chiaramente vedere; perchè nel mezzo di qualche duno dei suoi rami, che ordinariamente son vuoti, vedesene uno o due che sono staccati dal resto, e che sono solamente raccomandati ai nodi ed agli angoli delle ramificazioni.

A ciò che ho riportato, soggiungerò, 1.° che in alcune scorze, come in quella dell'Abete, si vedono dei tronchi alquanto grossi di vasi propri, che vanno serpeggiando sotto l'involuppo cellulare: 2.° che molti ne ho veduti nell'Epicia (Ved. Tav. II. fig. 9) situati addosso del corpo legnoso; 3.° che nel Pino (Fig. 10.) ne ho veduti di quelli che stavano vicinissimi all'epidermide, altri vicini al legno, ed altri nella grossezza della scorza; 4.° che quando tagliansi in varie altezze dei rami giovani d'alberi, i di cui vasi propri sono d'un colore diverso da quello del resto della sostanza corticale, i vasi propri compariscono sempre situati presso a poco nell'ordine medesimo; lo che potrebbe far credere che questi si prolunghino in linea retta e secondo la lunghezza dei rami. Ciò non ostante non può dubitarsi, che il sugo proprio non si distribuisca in tutte le parti dell'albero,

bero, perchè la di lui esistenza manifestasi dal suo odore, e dal suo sapore.

ARTICOLO VI. *Ricapitolazione del Cap. II.*

DAL dettaglio, in cui sono entrato riguardo alle diverse parti che compongono il corpo della scorza, vedesi dunque esser questo involuppo composto d'una o più membrane sottili, che si stendono sopra tutta la esterna superficie degli alberi, e che *Epidermide* s'appella; che sotto questo involuppo generale trovasi l'altro da me chiamato *Cellulare*, e poi degli strati corticali formati da certe reticelle di vasi linfatici, e dai vasi proprj. Le maglie di queste reticelle formano colla loro reciproca disposizione delle cavità, o una specie d'Alveoli, che sono molto larghi dalla parte dell'*Epidermide*, e molto angusti dalla parte del legno.

Questa specie d'Alveoli è ripiena dalla tessitura cellulare, la quale cominciando dal legno e continuando fino all'*Epidermide*, congiunge ed unisce insieme tutti gli strati corticali, e dilatandosi tra i detti strati corticali e l'*Epidermide*, forma ciò che ho chiamato involuppo cellulare.

Ecco in generale l'idea che possiamo formarci della tessitura della corteccia. Mi riservo ad altro luogo di parlare del di lei uso ed ufficio, e della maniera con cui essa si riproduce; passo intanto all'esame della sostanza legnosa.

C A P I T O L O III.

DEL LEGNO e DELLA MIDOLLA.

TOLTA che sia tutta quanta la scorza, comparisce il legno: egli è un corpo solido che serve di sostegno e dà forza agli alberi, e per ciò alcuni Naturalisti hanno detto, che egli serve agli alberi come le ossa servono ai corpi degli animali.

Si suole distinguere il Cilindro legnoso, che forma la parte principale del tronco e dei rami, in legno formato, ed in alborno (*Fig. II.*). L'Alborno forma una Zona o fascia più o meno fissa di legno imperfetto, la quale trovasi sotto la scorza, e cuopre il legno propriamente detto. Parleremo in appresso della differenza che passa tra il legno

Tav. II. fig. II.

legno e l'alburno; ma siccome queste tali differenze non vertono sulla organica disposizione delle parti componenti queste due sostanze, per ora io non starò a fare distinzione veruna; e quindi quanto sono per dire, converrà ugualmente al legno ed all'alburno.

Prima di entrare a parlare intorno al legno, d'uopo è saperfi, che generalmente il corpo legnoso è formato dagli strati che s'involuppano e si ricuoprono tra di loro; che questi strati formati sono dalle fibre legnose o vasi linfatici, dalla tessitura cellulare o vescicolare, la quale è una produzione della midolla, dai vasi proprj che racchiudono un liquore particolare ad ogni albero, come sono quelli della scorza; finalmente dalle trachee o vasi, che altro non hanno in essi che aria, e che scorgere non si ponno nella scorza. L'esame continuato ch'io farò di ciascheduna di queste parti, separatamente prese, mi darà campo di esporre le osservazioni a quelle adattate, ma prima d'entrare in questo dettaglio, io qui dirò qualche cosa degli strati legnosi generalmente considerati.

ARTICOLO I. *Degli Strati legnosi.*

LA Figura II della Tavola II rappresenta un pezzo di legno senza scorza: Vedesi sul piano del taglio la midolla che riempie il centro, e fasciata dagli strati di perfetto legno, il qual legno è parimente ricoperto dall'alburno.

Esaminato il piano del taglio trasversale d'un tronco di Quercia, d'Olmo, d'Abete, ec. veggonsi dunque degli strati legnosi chiarissimamente tra di loro distinti, che s'involuppano e si ricuoprono a vicenda: Credesi comunemente che ciascuno di questi strati sia il prodotto dell'accrescimento del corpo legnoso nello spazio d'un'anno.

Tagliando obliquamente un pezzo di legno di Quercia, vedesi coll'ajuto d'una lente, che questi grossi strati facilmente visibili, composti sono di molti altri strati più sottili, e per questo appunto molto difficili a vedersi.

Col mettere alcuni pezzi di legno marcio nell'acqua, sono arrivati a separare i detti strati in molte laminette talmente sottili, che ne ho staccati dei pezzetti anche più sottili dell'istessa carta serpente (*) più fina. Quando parlerò della formazione degli strati legnosi,

ri-

(*) Carta sottilissima, così detta per aver la marca di un Serpente.

riporterò molte osservazioni con cui si proverà più chiaramente che il corpo legnoso è formato da un infinito numero di sottilissimi strati; che a vicenda ricuopronsi; i quali strati sono in gran parte formati da un'ammasso di fibre di cui ora ragionerò.

ARTICOLO II. *Delle Fibre legnose, ossia dei Vasi linfatici del Legno.*

OSSERVANDO con un microscopio non molto acuto una delle fogliette o lamine di cui nel precedente Articolo ho parlato, vedrassi ch'ell'è composta di fibre longitudinali. Alcuni legni marciti tenuti a macerare nell'acqua si dividono in sottilissime fibre longitudinali. Lo stesso osservasi distaccando con diligenza gli strati legnosi induriti da poco; e coll'esaminare attentamente alcuni legni fenduti per il verso della di loro lunghezza, si scuoprono le fibre longitudinali, che sono talvolta ugualmente visibili come negl'interni strati della corteccia. L'esistenza insomma di queste fibre longitudinali è bastantemente provata dalla facilità che hanno tutti i legni a spaccarsi o a separarsi secondo la direzione delle dette fibre, o come dicono gli artefici, secondo il filo del legno.

Aggiungerò a queste prove, che le fibre che sono nella coda o nel gambo delle pere, sono una continuazione delle fibre legnose dei rami; e dal dilatarsi che fanno le fibre dei gambi per tutta la sostanza delle pere, io ne argomento che le fibre delle dette pere, sieno le medesime fibre legnose che sono nei rami. Ma essendo le fibre delle pere diramate, e divise a traverso d'una molle sostanza, dalle pere ben mature ho potuto facilmente staccar dei frammenti per sottoporli al microscopio, con cui ho conosciuto che quelle fibre, che mi comparivano uniche, erano tanti fascetti di sottilissime fibre, ch'io potei separare, come vedesi nella Fig. I della Tav. II, allorchè col tirarli fuori dall'acqua li distesi sopra uno specchio, ove con due sottilissime punte andai cautamente separandoli.

Questa osservazione, che può anche farsi sulle fibre delle foglie, prova che gli strati legnosi formati sono da fibre insieme unite in fascetti, come lo sono quelle della corteccia. Così pure credono il Malpighi ed il Grewio; e se io m'immaginassi che qualcuno potesse mai dubitarne, potrei confermar ciò con molte osservazioni fatte immediatamente su delle fibre legnose prese dalli stessi rami. Esaminiamo adesi-

so quale sia la rispettiva disposizione di queste fibre per formare gli strati legnosi.

In certi alberi le fibre legnose ammucciate in fascetti compariscono situate parallele tra loro, e pare che sieno disposte come i fili delle mataffe; ma in certi altri alberi ed arbusi, per esempio, nei grossi rami dell' Uva Spina, sembra che formino una specie di reticella, e che s'inclinino, e trà di loro si discostino, come ho già detto parlando della corteccia. Questa reticolare disposizione esiste forse in tutti gli alberi; ma la sottigliezza delle dette reticelle, la durezza del legno, l'identità del color delle fibre e della tessitura cellulare, non permettono di assoggettarli ad una rigida osservazione, e per ciò la reticolare disposizione delle fibre riesce anche meno percettibile nel legno che negl' interni strati della corteccia; ciò nulla ostante se si stabilisce in appresso che la tessitura cellulare trapassi per gli strati legnosi come ella trapassa per gli strati corticali, verrà a provarsi che i fascetti legnosi non si toccano nè si combaciano trà di loro per tutta quanta la di loro estensione, e che formano o una reticella o qualche altra cosa d'equivalente.

Sebbene gli strati legnosi formati sieno da differenti specie di vasi, io per ora non intendo parlare che dei soli vasi linfatici che esistono tanto nel legno come nella scorza, quantunque realmente in istato diverso; poichè le fibre legnose sono sempre meno dure e meno flessibili delle corticali. Dice il Malpighi, che tralle fibre legnose e le corticali vi è questa differenza; che queste ultime tagliandole trasversalmente mandano fuori un sugo, e le fibre legnose non ne tramandano alcuno. Mi è sembrato, che i vasi linfatici della scorza non spandessero neppur essi il lor sugo, se non a forza di comprimerli: ed è forse questa una circostanza che il Malpighi non ha avuta l'attenzione di riportare; ovvero potrebbe anche darsi, che la differenza, che passa trall' osservazione del detto Autore e la mia, consista in ciò, ch' io tratto solamente degli alberi, e quel celebre Fisico stendeva le sue osservazioni sopra tutte le piante, avvegnachè non è supponibile ch'ei parlar volesse dei vasi proprj, poichè quelli che sono nel legno, spandono sovente il liquor che rinferano.

Il Grewio mette in dubbio se dentro queste fibre vi sia dell'aria, o qualche liquore; e soggiunge, che non si debba concludere che esse altro in sè non abbiano che dell'aria, perchè non spandono alcun su-

go, poichè certe piante quantunque liquore non tramandino, hanno per altro dei vasi che ne rinferano, come gli hanno le piante che ne tramandano. Non mi estenderò sopra di una tal questione, perchè mia intenzione si è di trattarla maturamente in un' Articolo a parte.

Sarebbe questo il luogo opportuno di parlare degli a'tri vasi; ma ho reputato necessario il dir prima alcune cose della tessitura cellulare e della midolla.

ARTICOLO III. *Della Midolla e della Tessitura Cellulare.*

SEMBRA che la sostanza della midolla sia essenzialmente la stessa della sostanza della tessitura cellulare: e perciò io tratto d' ambedue in un solo Articolo. Pare dunque, che la midolla altro non sia, che un' ammasso della tessitura cellulare; e la di lei massima parte trovasi radunata nell' asse del corpo legnoso ove sta rinchiusa come in un tubo.

Pare che le cellulette o vescichette della midolla sieno più grandi nel centro della midolla che verso la parte che tocca il legno; ma sono elleno generalmente più grandi di quelle della tessitura cellulare dell' altre parti, quantunque sembri che la detta tessitura scaturisca dalla midolla, per poi dividersi per tutta quanta la grossezza del corpo legnoso, ed anche per gli strati corticali, fin sotto l' epidermide; dal che nasce, che la midolla ristretta nell' asse d' un ramo comunica mediante le sue produzioni colla tessitura cellulare della corteccia. La qual comunicazione mi è sembrata molto chiara in un ramo di *Cotyledon*, sul taglio del quale M. di Jussieu il giovane mi ha fatto osservare una perfetta conformità tralla tessitura cellulare della scorza e la midolla della detta pianta. La sezione trasversale d' uno di questi rami quasi conferma la detta osservazione, perchè nel centro vi è molta midolla, e nella circonferenza molta tessitura cellulare.

Questa comunicazione della midolla colla tessitura cellulare della corteccia, la quale fanno mediante le produzioni midollari, o mediante le inserzioni (per parlar come il Grewio), è più distinta nelle piante tenere, o negli erbacei bottoni, che in quelli che sono più grossi e più legnosi; ma pure scorgonsi anche sul piano del taglio di un pezzo di legno, ove le produzioni midollari formano dei raggi, che

che il Grevio paragona alle linee orarie d'un quadrante. Molte di queste produzioni cominciano dalla midolla, e si distendono fino alla scorza; ma se ne veggono nei grossi tronchi di quelle, che non cominciano se non da una certa distanza dall'asse dell'albero, e tutte vanno a far capo alla corteccia, ove la cellular tessitura si dilata, formando una specie di cono, per riempire gli Alveoli formati dai

Tav. II. fig. 2. *pleffi reticolari della scorza. Veggasi la figura 2 della Tavola II.*

Nei giovanetti rami spuntati di fresco dai bottoni, e per anche erbacei, sembra che la sostanza midollare formi in gran parte quei novelli rampolli; quando si assodano le fibre, la midolla meno succulenta resta fasciata da un tubo legnoso, e non comunica altrimenti colla scorza se non per via delle sue produzioni, le quali sembrano compresse e strette dalle fibre legnose; di modo tale, che nel legno formato esse non compariscono sul taglio orizzontale se non come fortissime linee, e sembra allora che più non comunichi colla corteccia: ma pure se sul cominciar del sugo di Primavera si tolga la scorza a molti novelli rami di più forte d'alberi, si scorderà talvolta delle produzioni midollari, o di tessitura cellulare, che resteranno attaccate sul legno. Queste produzioni hanno diverse figure: ne ho vedute alcune che parevano similissime ad un granello di segale; altre bislunghe come un granello di vena; altre finalmente lunghissime

Tav. II. fig. 12. *simili a piccole aliette, come nella figura 12 della Tavola II. Ecco dunque delle produzioni della tessitura cellulare, che comunicano a traverso del legno dalla midolla fino alla scorza; ma ho per altro scorzati molti altri rami senza scorgervi queste medesime produzioni; e ciò io credo che possa esser nato dall'essere gli alberi troppo in sugo, e perciò essendo troppo intenerita la tessitura cellulare, venisse a staccarsi insieme colla scorza; e potrebbe anche esser ciò derivato dal non essere l'albero per anche abbastanza in sugo, e che per conseguenza essendo la scorza troppo attaccata al legno, non si fosse potuta staccare.*

Ho fatti bollire per molto tempo dei rami giovani d'Olmo grossi come un pollice; gli ho fatti scorzare ancor bollenti, e col pestarli con un martello sono arrivato a separare molti strati legnosi, ed avendo poi lasciati seccare alcuni di questi pezzi, ho chiaramente distinto, tralle fibre legnose, i passaggi delle produzioni della tessitura cellulare; può anche provarsi la detta comunicazione dal centro alla scor-

scorza dell'albero con una osservazione facilissima a farsi sopra di un Tiglio di 4 in 5 pollici di diametro; poichè se verso la metà del suo tronco apparisca, come nella *figura 13*, un bottone, cosa non rara a trovarsi, basta tagliare obliquamente e trasversalmente il tronco in quella parte, ed allora tastando nel legno con un coltello tagliente, vi si potrà vedere a poco a poco una specie di filo o linea midollare più bianca del restante legno, e vedrassi che ella s'estende cominciando dal bottone fino all'asse del tronco, come nella *figura 14*.

Tav. II. fig. 13.

Fig. 14.

Egli è probabile, che questa comunicazione della tessitura cellulare esistesse prima del bottone, e che siasi fatta più visibile a causa del bottone, il quale ha determinato il sugo a colare più copiosamente in quella parte.

Dice il Malpighi, che le vescichette della midolla sono notabilmente più grosse di quelle della tessitura vescicolare, e che molto varia la figura loro, che sono o ritonde, o quadre, o poligone, o di qualunque altra figura. Ho col microscopio esaminata una sottilissima fetta di midolla di Tiglio: e mi pareva traforata da molti buchi ben tondi, e nella sostanza, che gli separava, io vedeva altri punti mezzo trasparenti, che parevano esser buchi anch'essi dello stesso genere, coperti di una membrana sottile. Le mie osservazioni, come anche quelle del Malpighi, si ponno applicare ugualmente bene tanto ad una tessitura cellulare come ad una tessitura vescicolare: del resto poi, come ho già fatto riflettere, parlando della scorza, poco o nulla importa l'ammettere tanto l'una che l'altra di queste due tessiture: ma egli è probabile, che la midolla degli alberi di diversa specie non si rassomigli, perchè in certe piante, come nel Sambuco, la tessitura cellulare è molto fissa e serrata, e nel Cardo comune le cellule midollari son molto grandi; oltre a ciò, quando la midolla si secca, ora forma delle fogliette o laminette, ora de' diaframmi posti per traverso nel canal midollare; talvolta ella si rompe per traverso, e forma diverse figure, o aprendosi nel mezzo le chiusure o tramezzi, rappresentano degli anelli: talvolta finalmente succede, che la midolla resta tutta intiera; ed allora vedesi il canal midollare ripieno d'una sostanza leggiera, d'una fiacca tessitura e sfocia. Questi diversi stati della midolla, che sono quasi generalmente gli stessi in un medesimo genere di pianta, indicano che la midolla e la tessitura cellulare, sono in certi alberi più inzuppate che in alcun'altri, o che la dispo-

PARTE I.

C

fizio.

fissione delle sue parti solide è diversa: ne ho già riportate alcune prove dedotte dalla diversa organizzazione della carne di diverse frutta.

Efaminando una novella messa d'albero per anche tenero ed erbaceo, vedesi che la sua scorza è sottilissima: e che è anche pochissimo grossa la porzione che deve diventar legno; in guisa tale, che la sostanza midollare viene ad essere la maggior porzione di questo ramo novello; in tale stato la midolla è tenera, succulenta e di color verde (ho già fatte fare queste osservazioni); ma presto gli strati legnosi s'induriscono, ed allora formano una guaina in cui la midolla rinchiudefi. Qualche tempo dopo questo indurimento degli strati legnosi, la midolla è per anche succulenta, ma non lo è a quel segno come nei rami erbacei; cambia di colore, e diventa bianchiccia. Questo è forse quello strato che ha fatto dire al Grewio, che vi sono due sorte di tessitura cellulare, una più bianca con poco o niente di fugo, ma che se ne fa piena nel tempo del fugo. Io non sono del suo parere, perchè la midolla dei rami di due o tre anni mi è sempre comparsa sprovvista di fugo.

Nei rami di due anni la midolla è dunque ordinariamente affatto bianchiccia, e pare secca; indi poco a poco il canal midollare scema di diametro, e negli alberi grossi, anche in quelli che in gioventù hanno più di midolla, più non vedesi nè canale nè sostanza midollare. Il Grewio che aveva veduta la sostanza midollare quasi priva di fugo nei rami di due anni, non ha gran difficoltà di considerarli come destinati a rinchiuder dell'aria, ed a paragonarli alle vescichette polmonari degli animali.

Tutto ciò che ho qui accennato può facilmente confrontarsi in un *Tav. II. fig. 15.* giovane Marrone d'India, che fa la sua terza messa: si vede (*Tav. II. fig. 15.*) nella porzione della cima che è erbacea, e che attualmente germoglia, che la midolla ne forma la maggior parte, che ella è verde e pienissima di fugo; nella messa o rampollo del fugo precedente, la midolla è bianca e secca: vi è tra questo rampollo e quello che ha tre fughi, un ristringimento del canal midollare ove la midolla suol avere un colore di ruggine, di modo che pare, che non vi sia tralla midolla vecchia e la nuova veruna comunicazione.

Efaminandosi l'appiccatura d'un ramo ingordo, ovvero, come al *Fig. 16.* tri dicono, *Succhione* del Sambuco, ho parimente osservato (*Fig. 16.*) che

che non eravi comunicazione della midolla del ramo Succhione con quella del ramo che lo sosteneva, se non per una piccolissima apertura, che poi del tutto chiudesi nel secondo o terzo anno.

Oltre la tessitura cellulare scorgonsi nella midolla delle sottilissime fibre longitudinali, che seguitano la direzione del tronco, le quali fibre si ponno facilmente vedere nella midolla del Sambuco: quando i rami sono un poco vecchi, queste fibre acquistano un color rosso, che aiuta a distinguerle dalla midolla che è bianca; e mi ha parso che all'intorno delle dette fibre rosse anche la cellular tessitura partecipasse del colore medesimo: non potrebbe forse esser questo un principio dell'indurimento del legno? poichè, come ho già detto, il canal midollare viene a poco a poco a ferrarsi del tutto.

Io suppongo che vi sieno nella midolla dei vasi proprj, e dei vasi linfatici, perchè questi quì s'incontrano da per tutto; e vedesi venir fuori della trementina dalla midolla del Pino e dell' Abete.

Sebbene abbia detto, che la midolla suol'essere quasi sempre bianca, questa regola non è per altro generale; perchè vi sono certi alberi, il noce, per esempio, in cui ella è bruna, in altri ell'è rossiccia, ed in altri inclina al giallo; ma nella maggior parte ell'è bianca.

Ho fatto osservare, che la tessitura della midolla comparisce diversa negli alberi diversi, e ho detto adesso, che anche il suo colore molto varia; egli è dunque quasi inutile di aggiungere, che ella è più copiosa in certi alberi che in altri: si sa che il Sambuco, il Fico ed il Sumacco ne hanno molta; che il Noce e il Frassino ne hanno meno; è anche più scarfa nel Melo e nella Quercia: l'Olmo non ne ha quasi niente.

Vi è anche una gran differenza nella grandezza degli otricoli di diversi alberi; compariscono grandi nel Fico, meno grandi nel Frassino, nel Noce, nel Pino, ec. ed anche più piccoli nel Pero, nel Melo, nella Quercia e nel Nocciuolo. Osservisi che gli alberi, che hanno molta midolla, non sono sempre quelli che hanno le vescichette più grandi; il Sambuco, per esempio, ha molta midolla e le vescichette piccolissime.

Fendendo, lungo la direzione delle fibre, un pezzo di Quercia secca, vedesi nei pori una sostanza granellosa; i quali granelli sono tanti frammenti della tessitura cellulare. Questi anche veggonsi in quei

tubercoletti che sono nell'inserzione delle foglie sui rami, di che ragioneremo in appresso. E quindi esaminando con buona lente il piano del taglio trasversale d'alcuni legni, vedesi tralle fibre longitudinali la grossezza delle lamine della tessitura cellulare, le quali in linea retta si distendono dal centro alla circonferenza; e se fendasi il detto pezzo secondo il piano delle dette lamine, la tessitura cellulare comparisce allora sotto la forma d'una foglietta o lamina composta di fibre, la di cui direzione sarebbe dal centro alla circonferenza.

Dice il Magnolio, che essendo la midolla delle piante simile a quella degli animali, un'ammasso cioè d'innumerabili vescichette, pare che sia destinata apposta per preparare un sugo più perfetto, il quale forse non è solamente necessario per il nutrimento del legno, ma tale che anche sia conveniente alle frutta. Ei procura di provare la sua opinione col fare osservare, che le piante che hanno molta midolla, come il Rosajo, il Frassino, il Lilac, producono anche molti fiori e molti granelli; e che nelle piante ferulacee la midolla si stende cominciando dal fusto fino al seme: soggiunge ancora, che i lunghi semi del *Mirris Odorata*, non per anche maturi, altro visibilmente non sono che midolla.

Prende sbaglio questo Autore in quanto ai semi del *Mirris*; perchè certamente essi sono organizzati come tutti gli altri semi: ed il suo sbaglio nasce dall'aver preso l'inviluppo del seme per lo stesso seme, il quale è minutissimo. E nemmeno mi persuade la prima proposizione di questo celebre Botanico; perchè potrebbe facilmente riportare moltissime osservazioni, e citare molti alberi fecondi di fiori e di frutta, che hanno per altro pochissima midolla.

Sarà forse un'idea molto simile all'opinione del Magnolio, quella che ha indotto gli antichi Scrittori d'Agricoltura, a dir francamente che quando si vogliano avere dei frutti senza nocciolo, basta il distruggere la midolla degli alberi. Egli è dimostrato che questa violenta operazione ne deve far perir molti; locchè mi è costantemente accaduto ogni qual volta ho voluto cavare affatto la midolla da qualche albero.

Quando mi contentava di cavar solamente una porzione della midolla, allora non mi perivano gli alberi; ma i frutti che ne venivano avevano secondo il solito i loro noccioli legnosi: null'ostante mi restava qualche scrupolo intorno a quella porzione di midolla ch'io non aveva levata.

Con-

Confesso che la poca verisimiglianza che mi è sembrato di riconoscere in questa opinione degli antichi, mi ha distolto dal fare nuovi tentativi. Io credo che la midolla sia una tessitura cellulare dilatata, la quale forse si forma, come ora dirò.

Le fibre legnose dei bottoni che attualmente sviluppanfi sono allora, come ho detto poc'anzi, lieve cosa: queste messe novelle non sono quasi d'altro composte che della tessitura cellulare molto inzuppata di fugo e molto dilatata. A misura che gli strati legnosi vanno acquistando durezza, la cellulare tessitura diventa meno succulenta: e quindi allorchè è quasi vuota di liquori, ella formar deve una sostanza molto rada e leggiera, ch'è insomma la midolla. Non pretendo di spacciar questo se non come semplice congettura; ma pure ella acquista qualche forza dalle osservazioni da me riportate intorno alla midolla esaminata nei rami di età diversa.

Dopo di aver trattato di ciò che concerne la midolla e la tessitura cellulare, ritorno ai vasi del corpo legnoso, e m'accingo a parlar di quelli che contengono un fugo proprio.

ARTICOLO IV. *Dei Vasi proprj del Legno.*

Il corpo legnoso non è solamente formato dall'intralciamiento dei vasi linfatici colla tessitura cellulare, o colle produzioni midollari; scuopresi anche in questa sostanza un'altra specie di vasi, di cui ho già parlato allorchè ho discusso della scorza, e da me chiamati vasi proprj.

Non si può certamente mettere in dubbio l'esistenza di questi vasi nel legno, perchè essi si manifestano, come nella scorza, dalla effusione del fugo che rinferrano. Se si tagliano trasversalmente dei rami di Pino e di Picea, vedesi stillar la refina; dai rami del fico cola un color bianco, ec. e dalla situazione delle goccioline di refina sul piano dei tagliati rami, vedesi che i vasi proprj son situati presso a poco come i vasi linfatici, sono posti, cioè, circolarmente intorno all'asse del tronco, o del ramo che si è tagliato.

Non starò qui a ripetere tutto ciò che ho detto dei vasi proprj quando ho parlato della scorza, mi basta il fare osservare che essendo questi i medesimi vasi, ciò che si è detto degli uni si può anche applicare agli altri. Credo solamente di dovere avvertire, che i vasi proprj del legno sono molto più sottili di quelli della scorza: la qual

diminuzione di volume dipenderà forse dall'esser questi compressi, come lo sono le produzioni midollari, dai vasi linfatici induriti.

Se si esamina un pezzo di Pino del Nord, il quale, come si sa, è pienissimo di resina, vedesi che vi è alternativamente uno strato di legno bianchiccio ed asciutto, ed un'altro strato scuro e molto resinoso. Se a questa osservazione si aggiunga anche, che le gocciollette di resina che colano da un ramo di Pino tagliato di fresco, escono circolarmente tra quelli strati da cui uscir non vedesi liquore alcuno, dobbiamo concludere esservi alternativamente uno strato formato di vasi linfatici, ed un'altro di vasi proprj: io per altro non spaccio una tale disposizione di vasi, che come semplice congettura, la quale potrebbe anche convalidare coll'esempio d'alcune specie di alberi, ma che per altro non sarebbe applicabile a certe altre specie. Mi rimane a dire dei vasi pieni d'aria, che si chiamano *Trachee*.

ARTICOLO V. *Delle Trachee, o dei Vasi che in se non rinferano altro che aria.*

I VASI di cui ora parliamo non trovansi certamente nella scorza degli alberi, e neppure nel Libero; ma esistono certamente nel legno, nelle foglie e nei fiori, i petali dei quali sono quasi del tutto formati da questi vasi chiamati spirali. Dice il Grewio che non si ponno questi conoscere nella scorza, perchè sono troppo sottili. Bisogna, per distinguerli, prendere un ramo novello erbaceo, tagliar la scorza col ronchetto, e guardar bene di non toccare il corpo legnoso che è tenerissimo, indi adagio adagio rompere il corpo legnoso, e tirare in due versi opposti li due pezzi rotti; scorgonsi allora tra questi due pezzi dei sottilissimi filamenti a guisa di cavastracci (Fig. 17):

Tav. II. fig. 17.

i quali filamenti osservati col microscopio, compariscono come fascie lucide rivoltate in ellisse o cavastracci, acquistando in tal guisa una figura squamosa; la qual disposizione, come dice il Malpighi, fa sì che cedano al moto delle piante senza che si rompano. E per formarli una giusta idea di queste trachee, bisogna immaginarsi un nastriuo avvolto su d'un piccolo cilindro, come nella Tav. II. Fig. 18. Svolgendo il cilindro, il nastro che lo fasciava formar deve un tubo, il qual tubo è simile alle trachee: se poi si tira il detto nastro da un capo solo, si svolta, si distende, si prolunga considerabilmente, ed

Fig. 18.

Fig. 19. acquista la forma d'un cavastracci, come nella Figura 19. Ciò fa vedere

dere che questi vasi non sono veramente squamosi, come appariscono col microscopio. E mentre veggonsi questi vasi in quella erbacea porzione dei giovani rami che deve diventar legnosa, non può dubitarsi che esistano anche nel legno formato: il Lewenoechio assicura di averveli veduti, ma io mi dichiaro di non averli mai veduti se non nei teneri ramicelli erbacei.

Sono dunque poste le trachee nei giovani rami da quella parte che deve diventar legnosa, e dove veggonsi in copioso numero. E siccome le dette trachee altro non racchiudono in esse che aria, perciò vengono considerate come polmoni delle piante, e si paragonano alle trachee degl' insetti; il Grewio per altro dice asseverantemente, che non si prova in verun conto che questi vasi altro positivamente non rinchiudano che aria; e pare inclinato a credere che talvolta le dette trachee abbiano del liquore; ma s'accorda anche col Malpighi, che elleno fanno il più delle volte l'ufficio di polmoni; poichè dice di avere osservato nel loro interno, delle vescichette simili a quelle del polmone.

Assicura il Malpighi che esaminando le dette trachee in tempo d'inverno, talvolta vedesi che esse per lungo tempo conservano un moto vermicolare che *sorprende l'osservatore*. Se questo moto è necessario all'economia vegetabile, egli è probabile ch'ei non sussista se non nei rami erbacei; perchè la rigidità del legno non sembra niente suscettibile d'un tal movimento.

Sebbene questi vasi sembrati semprè a me sieno sottilissimi, il Malpighi non ostante ed il Grewio credono che il loro diametro sia più grande di quello di tutti gli altri del corpo legnoso: questa è un'opinione da cui potrebbesi concludere che i vasi senza liquore, la di cui estremità vedesi sul piano del taglio d'un pezzo d'Olmo, sieno tante trachee. Se fosse così, le trachee formerebbero una gran parte del corpo legnoso: dico anche, che forse esaminando più attentamente le dette trachee, si troverà che elleno col tempo diventano vere fibre legnose, e che queste fibre formano col di loro ammucchiamento i vasi grossi i di cui orifizj veggonsi sul piano del taglio d'un pezzo di legno. Che che ne sia, sbarbando in tempo d'autunno delle radici d'Olmo, ho veduto uscir molto liquore da quelle ferite: e quindi, o queste aperture non hanno niente che fare colle trachee, o se elleno sono la lor' estremità, il Grewio ha ragione di dire che talvolta esse racchiudono dei liquori.

Egli è certo che le piante in sè rinferrano molt'aria. Proverò altrove che una gran quantità n' esce per via della traspirazione; ma non ho per anche veduto mai una prova sicura che i vasi a Spirale di cui ora ho parlato, sieno veramente i polmoni delle piante, nè che le loro funzioni si restringano solamente nel non avere in esse altro che aria. Siccome molto insiste il Malpighi sulla rassomiglianza di queste trachee con quelle degl' insetti, questa analogia mi sembra la prova più forte che addur si possa per stabilire una tale opinione; ma senza ch' io pretenda d' oppormi e di distruggere l' opinione di questo celebre Bottanico, la quale mi sembra anche molto verisimile, non posso fare a meno di dire, che la sola analogia non costituisce una completa evidenza.

Dopo di aver riportate le osservazioni che hanno relazione coi vasi linfatici, colla tessitura cellulare, coi vasi proprj, e colle trachee; insomma dopo di aver trattato di tutte le diverse parti che scuopronsi nel legno, d' uopo è adesso ch' io dica qualche cosa di quel legno imperfecto, che chiamasi *Alburno* o *Albume*.

ARTICOLO VI. Dell' *Alburno*.

NEL seguito di quest' opera io proverò, che gli strati legnosi cominciano dall' esser teneri ed erbacei prima d' avere acquistata la durezza del legno, e che non passano immediatamente dallo stato di tenerezza, che hanno da principio, alla durezza del perfetto legno; farò vedere che essi non acquistano tutta quella durezza che aver devono, se non dopo molt'anni; proverò anche che in un albero giovane tutti gli strati legnosi, (intendo dire di quelli strati chiaramente visibili, che indicano la crescita di ogni anno) proverò, dico, che tutti questi strati sono disuguali di forza, di durezza e di densità; essendo quelli del centro più duri, e più teneri quelli della circonferenza.

L' indurimento adunque degli strati succede a gradi; e dallo strato più tenero al più duro, può osservarsi una differenza che finisce ad insensibili degradazioni. Vedesi solamente a prima vista un risalto che sorprende, ed è questo risalto appunto, questa differenza di densità facilmente visibile, ciò che distingue l' *alburno* dal legno.

Tav. II. fig. 11. Tagliando orizzontalmente una quercia, si vede come nella Fig. 11, sotto la più interna foglia della scorza, una zona o corona più o

me-

meno grossa d'un legno bianco tenero e leggiero; ed è questo l'alburno che ricuopre il legno perfetto, che ben si distingue dalla sua densità, dalla sua gravità e dal suo colore.

Siccome la natura non fa nulla se non con ordine progressivo, non deve recar meraviglia che il legno acquisti a poco a poco la sua durezza; ma ella è cosa molto singolare il vedere una parte di questo legno rimanere per un certo tempo in uno stato imperfetto, che lo rende, per dir così, medio tralla scorza ed il legno, e ad un tratto passare da questa imperfezione allo stato di perfetto legno: ed è questa un' osservazione che si può fare quasi sopra tutti gli alberi. La Quercia, l'Olmo, il Pino, l'Abete, l'Ebano, la Granatiglia, ec. anno un'alburno assai diverso dal legno. Ed è anche molto singolare, che l'alburno dell'Ebano verde sia bianco come quello del Tiglio, mentre che il di lui legno è d'un verde cupo e carico.

La differenza tra'l legno e l'alburno non è per altro sempre tanto considerabile: anzi talvolta ella è così minima, che quasi credere si potrebbe che certi legni, come il Pioppo, il Tiglio, il Tremulo, l'Ontano, la Betula, non abbiano punto d'alburno; potrebbe anche darsi che taluno di questi alberi conservino dal centro fino alla scorza la differenza d'indurimento che ho accennata, senza che siavi quel risalto che caratterizza l'alburno: lo che, per verità, non ho per anche abbastanza esaminato.

Checche ne sia, gli antichi Botanici sorpresi da questa differenza che osservavano passare tralla scorza e l'alburno, paragonavano questa sostanza al grasso degli animali. Io per altro convengo col Malpighi e col Grewio, e la considero come un vero legno, che non ha per anche acquistata l'intera sua perfezione.

Ed infatti l'Alburno è organizzato, come il legno; egli è formato di vasi linfatici, di tessitura cellulare, di vasi proprj e di trachee, disposte a strati come nel legno, da cui in niente essenzialmente differisce, poichè diventerà vero legno, quando col tempo acquistata egli avrà una maggior densità. Oltre di che non facendosi veruna produzione novella tra il legno e l'alburno, bisogna necessariamente concludere dal vedere che il legno perfetto cresce in grossezza, ch'egli acquistar non può un tale aumento se non per la conversione dell'alburno in legno.

Egli è verissimo che siccome gli strati legnosi tanto più son duri,
quan-

quanto più s'avvicinano al centro, anche l'alburno tanto più egli è solido quanto più al legno avvicinati: e quindi può considerarsi come una regola generale, che gli strati legnosi acquistano sempre di più in più di solidità, dal tempo della prima lor formazione, fino al momento in cui cominciano a decadere. Vi è certamente un termine in cui si fa un cambiamento tale nei detti strati, che può produrre la differenza che vedesi trall'alburno ed il legno.

Potrebbe venir domandato in quanti anni l'alburno convertesi in legno. Non è così facile il rispondere a tal domanda; poichè veggonsi certi alberi della medesima specie, i quali hanno solamente 7 in 8 strati d'alburno, mentre altri ne hanno 18, o 20. ed abbiamo osservato tanto io che il Signor di Buffon, che gli alberi vigorosi hanno l'alburno più fiso di quelli che sono stentati, quantunque abbiano questi una quantità di strati d'alburno maggiore degli altri. Questa osservazione che fatta fu sopra molti alberi, prova che l'alburno si converte più facilmente in legno negli alberi vigorosi, che negli stentati. Le seguenti osservazioni proveranno meglio una tal verità.

Abbiamo fatto segare orizzontalmente molti alberi, ed abbiamo osservato, 1.^o che vi erano più strati d'Alburno da una parte, che dall'altra; 2.^o che la grossezza totale dell'Alburno era più grande dalla parte in cui gli strati erano in minor numero; 3.^o per procurarci anche dell'altre prove, abbiamo fatto segare dei corpi d'albero in più tronconi, ed abbiamo osservato, che la grossezza degli strati dell'Alburno, come pure il lor numero non erano mai costantemente gl'istessi per tutta la lunghezza d'un medesimo albero. Erano talvolta gli strati in minor numero e più grossi dalla parte del Nord verso il piede dell'albero, e verso la cima erano essi in minor numero, e più sottili dalla parte del Sud. Riporterò alcune osservazioni fatte sopra molte Querce di diverse specie, attempate di 40 anni, per dare a un di presso l'idea delle diverse grossezze dell'Alburno.

Una di queste Querce aveva da una parte 14 strati d'Alburno, e dall'altra 20. Li 14 strati erano un quarto più grossi degli altri 20. Un'altra Quercia aveva da una parte 16 strati d'Alburno, e dall'altra 22. Un'altra Quercia aveva da una parte 20 strati d'Alburno, e dall'altra 24: li 20 strati erano quasi un quarto più grossi degli altri 24. Un'altra aveva 10 strati d'Alburno da una par-

parte, e dall'altra 15: gli 10 strati erano quasi grossi al doppio dei 21. Un'altra aveva da una parte 11 strati d'Alburno, e dall'altra 17; ma gli 11 erano più grossi al doppio dei 17. Egli è dunque abbastanza provato, che quasi sempre la grossezza dell'alburno è tanto più considerabile, quanto più piccolo è il numero dei medesimi. Per trovar la ragione d'un fatto, che sembra a prima vista tanto singolare, abbiamo fatto scalzare il piede dei detti alberi, ed abbiamo visto, che gli strati legnosi ivi erano più grossi, ed in minor numero, da quella parte che corrispondeva con una robusta e vegeta radice, o da quella parte donde forgeva un grosso ramo.

In conseguenza di questa osservazione, facilmente potremmo concludere, che gli strati legnosi erano più grossi da quella parte per cui più copioso scorreva il sugo, o fosse egli ivi chiamato dall'inferzione d'una vigorosa radice, o dall'eruzione d'un grosso ramo. Tutto ciò prova primieramente, che in un medesimo albero il sugo può esser determinato a passare più abbondantemente da una parte, che dall'altra; secondariamente, che gli strati sono più grossi, e che più presto si convertono in legno in quella parte ove più copioso trascorre il sugo.

Siccome le grosse radici, o i vigorosi rami, sollecitano la conversione in legno d'una porzione dell'alburno, nel tempo istesso, che essi rendono gli strati più grossi, convien dedurne, che l'alburno d'un'albero piantato in eccellente terreno, deve essere più grosso, quantunque composto di minor numero di strati, che l'Alburno d'un'albero che languisce in un cattivo terreno: molte osservazioni ci hanno convinti di questa verità.

Ma si andrebbe a pericolo d'ingannarsi se volessimo concludere da queste osservazioni, che gli alberi vigorosi hanno più alburno, in proporzione del loro legno, degli alberi languidi e stentati. Se gli alberi vigorosi hanno gli strati d'alburno più grossi degli altri, ne hanno anche minor quantità, perchè l'alburno di questi convertesi più presto in legno; e siccome detti alberi crescono molto più sollecitamente degli altri, ne viene anche, che la grossezza del loro legno è molto più grande: ora proverò questa proposizione con molte osservazioni che abbiamo fatte.

1.^o In un terreno magro in cui gli alberi cominciano a seccarsi in cima, o come altri dicono, *si coronano*, all'età di 40 anni, alcune

eune Querce di quella specie, che produce le ghiande di mediocre grossezza, dall'età di 46 anni, avevano 16 in 18 strati d'alburno, la di cui grossezza era a quella del legno, come uno è a due e mezzo.

2.° Abbiamo fatta la medesima osservazione su certe altre Querce dell'istessa età, che fanno le ghiande piccolissime: e vi abbiamo trovato 21 strati d'alburno: la proporzione dell'alburno al legno, era come $1 \text{ a } 1 + \frac{1}{16}$.

3.° Nelle Querce dell'istessa età che producevano le ghiande di mediocre grandezza, e piantate in buon terreno, la proporzione dell'alburno al legno era come 1 è a tre.

4.° Le Querce dalle ghiande piccole, dell'istessa età, piantate in buon terreno, si sono trovate avere 16 in 17 strati d'alburno; e la proporzione dell'alburno era a quella del legno, come $1 \text{ è a } 2 + \frac{1}{2}$.

Ben si comprende, che non si può riportar tutto ciò se non come per via d'approssimazione; perchè la proporzione del legno all'alburno, deve necessariamente variare secondo la diversa qualità del terreno, secondo la buona costituzione degli alberi, le diverse specie delle Querce, l'età loro, la loro esposizione, ec. io credo non ostante, che da queste osservazioni tirar se ne possano le seguenti conseguenze.

1.° In tutti quei casi in cui il fugo sale più copiosamente in un'albero, o in qualche parte d'un'albero, gli strati legnosi o gli strati dell'alburno devono ivi esser più grossi, secondo l'abbondanza del fugo, il qual deriva dal buon terreno, dalla buona costituzione dell'albero, dalla favorevole esposizione, dall'età, o dalla posizione dei rami o da quella delle radici.

2.° Che l'alburno si converte tanto più presto in legno, quanto più copioso ascende il fugo nel corpo dell'albero, o in qualche parte solamente del medesimo.

Terminerò il presente Articolo col riportare un faggio della proporzione, che comunemente suol passare tra l'alburno ed il legno negli alberi di differente grossezza. Spiegherò nell'Articolo VIII. il metodo da me tenuto, per fissare le dette proporzioni. Mi restringo adesso a dar solamente alcuni semplici risultati.

1. Diametro totale d'un tronco di Quercia 30 pollici; grossezza di due strati d'alburno 36 linee; il rapporto della solidità del legno è a quella dell'alburno, quasi come $4 \frac{1}{2}$ è a 1.

2. Dia-

2. Diametro 24 pollici; grossezza dell'alburno 20 lin. rapporto un poco più di $4 \frac{1}{2}$ a 1.
3. Diametro 22 pollici; grossezza 30 linee; rapporto $4 \frac{1}{4}$ a 1.
4. Diametro 18 pollici; grossezza 24 linee; rapporto $3 \frac{1}{2}$ a 1.
5. Diametro 12 pollici; grossezza 20 linee; rapporto $3 \frac{1}{4}$ a 1.
6. Diametro $7 \frac{1}{2}$ pollici; grossezza 14 linee; rapporto $2 \frac{1}{2}$ a 1.
7. Diametro 7 pollici; grossezza 24 linee; rapporto quasi uguale.

ARTICOLO VII. *Della causa dell' Eccentricità
degli Strati legnosi.*

LE osservazioni che ho adesso riportate, mi hanno posto in istato di spiegare un fatto, che ha ingannato quasi tutti quelli che hanno scritto sul proposito degli alberi.

Tagliando orizzontalmente un tronco, vedesi che i cerchi legnosi non sono sempre concentrici all'asse, ma che ordinariamente se ne discostano più da una parte che dall'altra: hanno creduto alcuni Autori, che ciò principalmente accadesse dalla parte del Nord; molti altri han preteso, che ciò fosse dalla parte del mezzogiorno: ma tanto gli uni che gli altri si sono accordati nel dire, che col mezzo di questa eccentricità degli strati legnosi, i viaggiatori smarriti acquistavano una bussola naturale che gli indirizzava, e gli metteva in grado di conoscere il sentiero. Si commendava altamente la sapienza della natura, che con tanto favore e tanto opportunamente porge soccorso a chi si pone a contemplarla: e fu tentato di addurre delle fisiche ragioni di questo tanto utile fenomeno. Quei che sostenevano che gli strati fossero ordinariamente più grossi dalla parte del Nord, adducevano per ragione, che avendo il Sole da quella parte un'azione più debole, essi vi si conservavano più umidi; lo che dovrebbe necessariamente produrre un'aumento di grossezza negli strati legnosi: quelli poi, che pretendevano di avere osservato esser gli strati più grossi dalla parte del mezzogiorno, dicevano che il Sole, come principal motore del fugo, lo determinava a passare più copiosamente da quella parte: e quindi aveva ognuno le sue fisiche ragioni con cui appoggiare la sua opinione; ma per mala sorte tanto degli uni che degli altri, un'efatta e migliore osservazione altera e rovescia tutti i loro sistemi.

Abbiamo infatti veduto, che gli strati sono il più delle volte, e quasi

quasi sempre più grossi da una parte che dall'altra; ma abbiamo anche osservato, che ciò ugualmente succede tanto dalla parte del Nord, che dalla parte di mezzogiorno, e così da quella di Levante, come di Ponente. Questa pretesa bussola è dunque soggetta a molte variazioni, che smarrir farebbero del tutto un viaggiatore, che a lei fidar si volesse; ma ell'è anche soggetta ad altri sbagli, mentre abbiamo osservato, che in un medesimo albero, la maggior grossezza degli strati varia alle volte per tutto il diametro dell'albero; di modo che, se vicino alle radici, la grossezza maggiore trovasi dalla parte del mezzogiorno, questa molte volte trovasi nei rami dalla parte del Nord, o verso qualunque altra parte della circonferenza dell'albero.

Dopo ciò che detto abbiamo dell'alburno, scorgeasi facilmente la ragion fisica di questa disuguaglianza di grossezza degli strati legnosi, mentre egli è chiaro che ella dipende dall'inserzione delle radici, e dall'eruzione dei rami. Se trovasi dalla parte del Nord una grossa radice, gli strati legnosi del piede dell'albero faranno più grossi da quella parte, perchè il fugo sarà ivi portato in maggior copia. Se poi verso la cima del detto albero spunta un grosso ramo dalla parte del mezzogiorno, gli strati legnosi, esaminati in quella parte, vi faranno anche più grossi, perchè il fugo vi farà in maggior copia concorso; di maniera tale, che le infinite varietà che veggonsi nella posizione delle radici, e dei rami, ne producono altrettante anche nella grossezza degli strati legnosi. Ed ecco come il più delle volte svanisce il mirabile, mercè d'un attento ed esatto esame della natura.

ARTICOLO VIII. *Della proporzione che vi è tra la durezza della scorza, e quella del corpo legnoso, tanto nel tronco degli alberi, che nei rami di diversa grossezza.*

SIA pur considerato, quanto adesso tratto nel presente Articolo, come un dettaglio di una semplice curiosità; ma essendomi io proposto di conoscere quale sia negli alberi di diversa grossezza il rapporto della durezza del legno colla durezza della scorza che lo ricuopre, ho giudicato opportuno di qui riportarne l'esame da me fatto, che forse da qualche lettore sarà reputato degno della sua attenzione.

Per far questo esame, ho preferito il Noce all'Olmo ed alla Quercia, perchè egli ha la scorza più unita, e perchè se ne può esaminar con precisione maggiore la grossezza.

I tron-

I tronconi più grossi ch'io abbia misurati, avevano solamente un diametro di 6 pollici e 1 linea; non ho voluto prenderti più grossi, per avere una scorza più unita, e più facile ad esser misurata; non ho voluto nemmeno prender dei rami niente più sottili di 5 in 6 linee, perchè la scorza degli altri è talmente fina, che non se ne può esattamente calcolar la grossezza.

Siccome egli è difficile che il taglio d'un tronco o d'un ramo sia perfettamente rotondo; per avere con più d'esattezza il piano del taglio, ho preso, appunto come ho fatto quando faceva le mie osservazioni sull'alburno, due dimensioni; una che rappresenta il diametro grande, e l'altra il più piccolo; e ne ho dedotta una dimensione media, su di cui ho operato come segue.

Il diametro grande del troncone più grosso essendo di 6 pollici e 5 linee, ed il piccolo diametro di 5 pollici e 9 linee, il diametro medio fu trovato di 6 pollici e 1 linea, o 73 linee, o 876 punti.

Da questo diametro medio, ho dedotta per analogia la circonferenza del troncone cilindrico, di 2753 punti, i quali moltiplicati poi per 219 punti, metà del raggio, il piano della base del cilindro fu trovato di 602907 punti, compresavi anche la grossezza della scorza.

Per riconoscere il piano del cilindro del legno spoglio di scorza, e per avere insieme il piano della corona corticale, sapendo per prova, che la scorza aveva 3 linee di grossezza, per avere il diametro del cilindro del legno spoglio di scorza, ho sottratti dagli 876 punti, diametro del cilindro vestito di scorza, 6 linee, o 72 punti, e sono rimasti per il diametro del cilindro spoglio di scorza, 804 punti; d'onde ho dedotta la circonferenza del detto cilindro di legno, di 2527 punti; i quali moltiplicati per 201 punto, metà del raggio, l'aria del detto cilindro senza scorza fu di 507927 punti, e il piano dell'anello corticale, di 94980 punti quadrati.

E quindi essendo i cilindri della medesima altezza, la durezza della scorza è a quella del legno, all'incirca, come 1 è a $5\frac{1}{3}$.

Avendo fatto la stessa operazione sopra diversi rami, il di cui diametro medio era di 5 pollici 9 linee 6 punti, o di 4 pollici 3 linee, o di 3 pollici 11 linee, o di 2 pollici 10 linee, o di 2 pollici 3 linee, o d'un pollice 9 linee; in tutti questi casi, la durezza della scorza fu trovata a quella del legno, all'incirca, come 1 è a 5.

Ma

Ma nei rami, il di cui diametro medio era di 10 linee, o di 9 linee, la proporzione della durezza della scorza fu trovata a quella del legno, come 1 è a 3.

La durezza finalmente della scorza ha quasi uguagliato quella del legno nei rami che avevano sole 5 linee di diametro.

Dall'addotto fin qui risulta, che nei rami sottili la solidità della scorza uguaglia quella del legno; ma che a misura che i rami diventano più grossi, la durezza del legno diventa molto maggiore di quella della scorza che lo ricuopre. Vero si è che questa conseguenza ha luogo solamente in quanto al Noce, e che potrebbe andar soggetta a molte eccezioni, se si esaminassero coll' istesso metodo diversi generi d'alberi, perchè ve ne sono di quelli che hanno la scorza molto sottile, ed altri molto più grossa. Ma io credo di aver detto quanto basta intorno ad una materia, che non è forse, come ho già detto, che di pura curiosità.

C A P I T O L O IV.

Discussione particolare intorno alle Fibre, o Vasi, ed intorno ai diversi liquori che si vedono, tanto nella scorza quanto nel legno.

SEBBENE abbia io parlato nei passati Articoli dei vasi linfatici, dei vasi proprj, delle trachee, e della tessitura cellulare che vedesi nel legno e nella scorza degli alberi; sebbene abbia detto, che si distinguono, tanto nel legno quanto nella scorza, diversi liquori, ciò nulla ostante ho reputato necessario di riunire in un Capitolo a parte alcune riflessioni, che non ho potuto inserire nei precedenti Capitoli: e perciò i due seguenti Articoli ponno essere considerati come un supplemento di ciò che abbiain detto di sopra intorno ai vasi che formano il corpo dei vegetabili, e intorno ai liquori che i medesimi racchiudono.

ARTICOLO I. *Delle Fibre o Vasi degli alberi, e delle piante.*

QUANDO si esamina, come già abbiain detto, gli strati corticali, scorgesi ad occhio nudo, e meglio ancora con una lente, che i detti

ti strati sono per la maggior parte formati da certi filamenti, che si distendono per la lunghezza del tronco, ed anche da molta tessitura cellulare: l'istesso può osservarsi sul corpo legnoso, quantunque per la sua durezza ei sia men'atto ad una tale disezione.

L'esistenza adunque delle dette sostanze è talmente chiara e visibile, che non può esser posta in dubbio; sono state viste dal Malpighi, dal Grewio, dal Lewenoechio, dal Mariotte, dal Perrault, dal La-Hire, dal Signor Halles, dal Signor Bonnet, e da tutti i Fifici che si sono applicati alla anatomia dei vegetabili.

Alcuni Autori per altro hanno paragonato le dette fibre a dei filamenti, che lasciano tra di loro dei pori. Altri poi, e questi sono li più, hanno creduto che queste fibre formassero dei vasi vuoti.

Tutti s'accordano nel dire, che la scorza ed il legno rinferrino dei liquori; e come potrebbero non accordarlo, mentre si vede che tanto l'uno che l'altro a misura che si disseccano, perdono una considerabile parte del loro peso? Non si può parimente non accordare che queste fibre servano a recare l'alimento o il sugo alle varie parti dell'albero; ma alcuni Fifici hanno creduto che il moto del sugo non avesse di bisogno ch'egli stesse rinchiuso dentro i vasi particolari. La costante osservazione, essi dicono, fa agevolmente vedere sul taglio trasverso d'un pezzo di Quercia, d'Olmo, ec. una quantità di fori, che sembrano le estremità d'altrettanti tubi; ma questi tubi son vuoti, e non tramandano col tagliarli liquore alcuno; questi pori adunque, oppure questi vasi, non sono destinati a racchiudere dei liquori, ma solamente dell'aria, la quale può essere utile, o fors'anche necessaria alla vegetabile economia.

Molte esperienze provano incontrastabilmente, che perfino i legni durissimi ponno essere trapassati dai liquori, secondo la direzione delle loro fibre.

1.° Lo spirito di vino subito svapora, mettendolo in una boccia di legno, per quanto sia ben sigillata.

2.° Il Signor Camus, dell'Accademia Reale delle Scienze, avendo, per fare un'esperienza che non ha niente che fare col nostro proposito, fatto incastrare un tubo lungo 300 piedi, pieno d'acqua, dentro d'un grosso ceppo d'Olmo scelto apposta di perfetta qualità e sanissimo, il peso di questa colonna d'acqua la fece trapassare per le fibre del legno, talmente che ne usciva poi fuori come da un'annaffiatojo.

P A R T E I.

D

3.° Met-

Tav. II. fig. 20.

3.^o Mettendo un vaso di legno, con entrovi del Mercurio, (Fig. 20.) sul recipiente della Macchina pneumatica, si vedrà subito quel fluido metallico cadere a guisa di pioggia entro del recipiente, dopo di aver ben trombata l'aria, acciocchè il peso dell' Atmosfera eserciti la sua pressione sopra il Mercurio.

4.^o Il Signor Halles ha fatta la seguente esperienza: tagliò nel mese d'Agosto un bastone di melo, lungo 3 piedi, e grosso 3 quarti di pollice; attaccò ad una estremità del detto bastone un tubo di vetro lungo 9 piedi, e d'un pollice di diametro, saldandolo perfettamente, come può vedersi nella figura 21. Poscia riempì il tubo d'acqua. Non stette molto a passar sollecitamente l'acqua; trapassò per il bastone, e viddesi cadere a gocce in una scodella di vetro messa apposta per raccogliarla; di modo che nel corso di trenta ore passarono per il bastone 6 oncie d'acqua. Ho ripetuta la medesima esperienza su dei bastoni di diverse sorte d'alberi, e sempre mi è riuscita.

Fig. 21.

Egli è dunque evidente, che i liquori trapassano la sostanza del legno, quando vi sieno determinati da una forte pressione; ma pure potrebbe anche dubitare che i detti liquori passassero per la strada medesima del sugo: e potrebbe anche con maggior fondamento credere, che in queste esperienze essi passino piuttosto per i pori grandi, le di cui estremità veggonfi sulla sezione d'un pezzo di legno, e che comunemente credesi non esser pieni d'altro che d'aria.

Ed infatti il Malpighi medesimo, che ammette i vasi nelle piante, sembra inclinato a credere, che le aperture ora mentovate altro non sieno che le estremità dei vasi da aria, o delle trachee, ch'egli considera come i polmoni delle piante: lo che abbiamo detto di sopra. Il Grewio è anch'egli dello stesso parere, con questa differenza però, ch'egli crede, che nella stagione in cui il sugo è più abbondante, allora egli riempia questi medesimi vasi: e quindi pare che quest'Autore creda che questi vasi ora facciano l'ufficio di vasi destinati a portare il sugo, ed ora l'ufficio dei vasi da aria.

Ciò che posso dir io su di ciò, si è, che avendo più volte esaminato attentamente questi vasi grossi, gli ho sempre trovati senza verun liquore; ma non avrò forse colto il momento della maggior pienezza di sugo: oltre di che avendo fatto sbarbare, in tempo d'autunno, come ho già detto, delle lunghe radici d'Olmo, d'un diametro di circa 1 pollice e mezzo, o due pollici, ho osservato che ponendole

dole verticalmente , usciva molto liquore dalle grandi aperture ; e quel che è singolare si è , che questo liquore usciva ugualmente dalle due estremità della detta radice , voltando di sotto in sù ora un capo , ora l'altro .

Questa circostanza non combina coll' opinione di Mariotte , il quale non solo ammette dei vasi nelle piante , ma pretende anche di avervi vedute delle valvule che si oppongono al ritorno dei liquori .

Ho visto anche , che facendo tagliare dei grossi rami d' olmo sul venir dell' inverno , scaturiva alle volte presso al cuore dei detti rami , uno scolo di liquore che durava molto tempo .

Del resto , quelli che non vogliono ammettere questi vasi , si fondano anche sul vedere , che da tutte le parti della sezione d' un pezzo di legno non scaturisce liquore alcuno , anche nella stagione del fugo ; lo che , dicono essi , accader dovrebbe , se la sostanza legnosa formata fosse da un' aggregato di vasi ; molto più , soggiungono , se si spremesse una rapa , una radice , una carota , ec. vedesi scaturire un poco di liquore ; ma questo liquore torna in dentro , e resta assorbito appena che si lascia di spremere , come appunto fa l' acqua spremuta dalla spugna , che subito vi rientra , lasciando la spugna in libertà .

Il Malpighi , ed il Grewio accordano questi fatti , ma ne attribuiscono la causa alla gran sottiliezza dei vasi . Ed infatti , posto che l' acqua sale sopra del suo livello nei tubi capillari che fanno gli smaltatori , e che ella vi resta dentro senza uscirne , quanto maggiore non dovrà essere l' adesione nella maggior parte dei vasi delle piante , che sono infinitamente più capillari di quelli che si fanno coll' arte ? Dico , nella maggior parte , parlando dei vasi delle piante , perchè eccettuo quei vasi , il di cui orifizio comparisce assai grande , come pure i vasi proprj , da cui veggonsi uscire in gran copia i liquori lattei , gommosi , e resinosi , in quelli racchiusi .

Leggesi nelle Memorie dell' Accademia delle scienze del 1692 , che il Signor Turnefort credeva , che quantunque le parti delle piante , le quali portano il fugo nutritivo , e lo distribuiscono , sieno ordinariamente chiamate vasi , per la ragione che esse servono agli usi medesimi a cui servono i vasi degli animali , la loro struttura per altro , ed alcuni dei loro ufficj dimostrano altro elleno non essere che semplici fibre , piuttosto paragonabili a delle mataffe di cotone , che a veri vasi .

Uno degli argomenti più forti che addur si possa contro dei vasi linfatici, si è che i migliori microscopj non sono stati bastanti a far conoscere la loro cavità in una fibra staccata da un pezzo di legno. Pare che il Malpighi ed il Grewio non sieno rimasti troppo contenti su di ciò; ed io posso assicurare che inutili mi riuscirono tutte l'esperienze fatte a tal proposito; poichè, come ho già detto, avendo io voluto esaminare col microscopio una di quelle fibre principali che nelle pere diramansi, altro non mi è comparsa che un fascetto di sottilissime fibre; ed avendo staccato una di queste fibre per esaminarla col soccorso d'una lente più forte, ella mi è sembrata formata di moltissime fibre anche più sottili. Veggo anch'io che queste tanto difficili e delicate dissezioni ci potrebbero far travedere; poichè si potrebbe anche prendere una parte d'un vaso per un vaso intero. E per render più chiaro il mio sospetto, io suppongo che si mettano a macerare per molto tempo dei rami sottilissimi di vene o d'arterie, oppure un pezzo di fegato, o della milza d'un qualche animale, e che se ne distacchino delle piccole particelle, per sottoporle ad una acuta lente, altro certamente non vedrassi che un mucchio di fibre. Siamo intanto assicurati dappoichè si tiene il metodo delle iniezioni, che le viscere sono quasi del tutto formate da un copioso ammasso di vasi; e quindi potrebbe anche essere che i filamenti della pera che ho segnati nella *Tav. I. fig. 15.* altro non fossero che rimasugli dei vasi. E quindi anche il Malpighi ed il Grewio considerano le fibre legnose e corticali, come veri vasi; non eccettuando essi neppure quelle delicate e sottili fibre, quantunque non ne abbiano potuto scorgere le cavità.

Conclude il Levenoechio dalle sue microscopiche osservazioni, che il legno sia formato da un'infinito ammasso di vasi: ed anzi ne distingue degli orizzontali, e dei verticali; tanto degli uni che degli altri ne ammette più specie, relativamente alla di loro grossezza; assicura anche, che questi vasi sono internamente foderati d'una specie di peluggine; e dice perfino, che tutti i piccioli fori che si veggono, tanto sul taglio orizzontale, che sul taglio verticale d'un pezzo di legno, sono essi tante sezioni d'un'infinito numero di vasi; talmente che, se il detto Autore non facesse di tanto in tanto qualche restrizione della sua opinione, ciò che si suol prendere per tessitura cellulare, altro, secondo lui, non farebbe che la sezione d'un
in-

Infinito numero di vasi di una somma finezza. Hooke assicura di aver numerato, coll'ajuto del suo microscopio, sulla superficie d'un carbone di un pollice di diametro, 7 milioni 880 mila pori.

Mia intenzione non è già di confutare, nè di approvare il parere di questi assidui Osservatori; mi ristringo a dire, che mi è facilmente riuscito d'introdurre col semplice succiare, dei liquori coloriti nei vasi d'alcune piante arundinacee; e che dopo di avere esaminati col microscopio questi vasi in tal guisa iniettati, mi è sembrato che fossero, come può vederfi nella Fig. 22. Tav. II. internamente rivestiti di sottilissimo peluggine, ed infilati da una fibra legnosa, che supera i tubi dalla parte *a*; e col mezzo del colore introdottovi, vedeva i detti vasi prolungarsi diritti da un nodo all'altro, dall'*a* fino al *b*, senza produrre alcuna ramificazione (*). Questi vasi erano folamente circondati da per tutto d'una sostanza midollare, o da una tessitura cellulare, la quale mi è sembrata partecipare un poco del colore dell'iniezione, accolto ai vasi grossi. Non starò a decidere, se i vasi ora descritti sieno proprj o linfatici; farò folamente osservare che molto si affomigliano a quelli di Mariotte, come di sopra ho accennato.

Tav. II. fig. 12.

Credo che riferir si possano a questi vasi quelli di cui parla Pittonio di Turnefort nelle memorie dell'Accademia Reale delle Scienze dell'anno 1692, ove dice, che in alcune piante immerse nell'acqua, come sono la *Nimphaea*, il *Potamogeton*, ec. i fusti e i picciuoli delle foglie sono tante specie di Cilindri bucati per quanto son lunghi, e che prolungandosi da un capo all'altro, formano tanti piccoli tubi, le di cui cavità sono sparse di peli fistolosi, orizzontalmente piantati, e che sembrano destinati a trasmettere il sugo nutritivo alle parti laterali.

Si può supporre un'organizzazione presso a poco simile nei Giunchi ai fusti che ci vengon dall'Indie, e di cui fannofi delle canne o bastoni. Ed infatti ognun sa che l'olio le penetra da una parte all'altra, per renderle in tal guisa più arrendevoli e più pieghevoli.

Per cumular quì finalmente tutte le ragioni, che confermar ponno l'opinione di quelli che credono, che le fibre delle piante sieno fistolose, farò osservare:

1.° Che i sughi nutritivi devono esser con forza portati verso cer-

PARTE I.

D 3

te

(*) Potrà vederfi quanto sono per dite intorno all'iniezioni.

te parti, e secondo certe direzioni; e che per conseguenza sono più atti a certe funzioni i vasi, che un semplice parenchimo, o una sostanza cotonacea.

2.^o Proverò, quando parlerò delle frutta, che le fibre principali che in quelle diramanfi, sono della natura medesima di quelle del legno; e farò allora osservare, che le dette fibre vanno a far capo in quelle parti che richiedono più particolarmente un certo nutrimento. Quando non vogliansi accordar questi fatti, come una prova, che queste fibre realmente sieno tanti vasi; io credo che non si potrà fare a meno di non accordare almeno, che ce ne somministrano una forte congettura.

3.^o L'ho già detto, e lo proverò anche in appresso, che vi son nel corpo legnoso, nella scorza, nei fiori e nelle frutta, dei liquori molto diversi tra di loro: che questi liquori non devonfi nè mescolarsi, nè confondersi: mi sembra molto ragionevole di concluderne, che non vi possa essere altro che i vasi atti ad operare una tale separazione.

4.^o La carne della Cotogna, o d'una pera fragile o rompibile non getta l'acqua: tagliando queste frutta, la loro carne comparisce anzi asciutta; eppure ella rende molto liquore, o stritolandola o pestandola; e ciò nasce perchè allora si rompono e si lacerano i vasi che rinferanno l'umido.

5.^o Tutti potranno avere osservato, che un pezzo di legno verde non sponde da per sè liquore alcuno, e che mettendolo al fuoco, molto ne manda fuori dalle sue estremità.

Da quanto ora abbiain detto tiriamone la conseguenza, che nelle piante o vi sono dei varj vasi, o degli organi inservienti a questa funzione: e quindi senza pretendere d'aver decisa una questione, che fino ad ora ha tenuto discordi i Fisici, io credo che mi sia lecito di servirmi, colla maggior parte dei Botanici, del nome di *Vasi*, per indicare gli organi che portano il nutrimento alle diverse parti delle piante.

Quanto sono per dire dei liquori che si vedono nelle piante, potrà anche render più verisimile l'esistenza dei detti vasi.

ARTICOLO II. *Dei diversi liquori che si racchiudono nei Vasi delle Pianta.*

I VASI LINFATICI, i vasi proprj, e le trachee si distendono dunque per tutta quanta la lunghezza del tronco. La midolla radunata al centro spande delle produzioni, che vanno in qualche maniera a terminarsi nella corteccia: e quindi l'intralciamiento dei vasi longitudinali colle produzioni midollari, forma la sostanza del legno e della scorza.

Ma pure tutto ciò altro non sarebbe, che un semplice scheletro, se privi fossero questi vasi di quei liquori, che lor danno, per così dire, la vita. I nomi che ho dati ai diversi vasi, indicano già quali sieno i liquori che essi rinferano.

Devo soltanto avvertire, che sebbene abbiassi distinta la tessitura cellulare dei vasi, pur non ostante questa tessitura si è quella, che ne fa le funzioni, ed anch'ella racchiude dei liquori. Crede il Malpighi, che i sughi rinchiusi nella tessitura cellulare essendo più indigesti di quelli dei vasi, viene in qualche maniera la detta tessitura cellulare ad essere una viscera, che serve a dare ai liquori una preparazione essenziale.

Pretende il Grewio, che la tessitura cellulare ora sia piena di liquori, e che tra poco abbia null'altro in sè che dell'aria; in questo ultimo stato egli la paragona alle vescichette polmonari; e crede che l'aria venga in lei introdotta dalle trachee. Avrò luogo in appresso di parlare di queste trachee.

Checchè siasi di queste due opinioni, esaminando i vasi di cui si tratta, vedesi esservi negli alberi, 1.º dei vasi linfatici, pieni d'un liquore o d'una linfa trasparente ed acquosa: 2.º dei vasi proprj, che rinferano dei liquori particolari a ciaschedun albero: 3.º dei vasi spirali, o delle trachee, che sono essenzialmente, e principalmente destinate a non racchiudere altro che aria.

Sarò per altro ben lungi dal pretendere, che tutti i liquori d'un albero ridotti sieno a quei soli che ho nominati; anzi potrebbesi facilmente mostrare, che in essi molti altri ve n'hanno, e molto dai primi diversi, poichè in una sola frutta, in un'Arancia, per esempio, l'odore, e il sapore ne fanno sentire tre o quattro, di cui non sentesene neppur principio nell'altre parti dell'Arancio.

Dopo di aver confessata l'insufficienza nostra di poter seguitare la Natura nei suoi dettagli, ci contenteremo di parlare adesso dei soli liquori da me nominati, per esser questi i principali; e mi basterà parimente di quì riferire soltanto alcune poche osservazioni, che hanno con questi un più immediato rapporto, e che servir possono a dare di questi una idea alquanto giusta.

ARTICOLO III. *Della Linfa.*

LA LINFA, che estrar si può da molte specie d'alberi, e specialmente dalla Vite, dall'Acerò, dalla Betula, e dal Noce, qualora sieno questi in sugo, sembra poco diversa dall'acqua purissima. Sembra ad alcuni di sentirla alcun poco acidetta: eppure l'uso che s'assi delle lagrime della vite, per astergere gli occhi infermi, prova abbastanza, che quantunque in copia s'adopere, ella non vi produce alcun bruciore.

Oltre a ciò, ho per via di svaporazione ristretto la quantità d'una pentola di lacrima di vite, e non ne ho cavato niente, che molto differisse dal puro flemma; ho solamente qualche volta veduto cagliare al fondo dei vasi, ove detto liquore teneasi, una specie di seccia, o un coagulo bianco, il quale non è forse inutile alla vegetazione.

Il liquore che scola dall'Acerò nel Canada, appena ch'egli esce dall'albero non ha quasi sapore alcuno; ma per via della concentrazione, da 200 libbre di detto liquore se ne cavano 10 libbre di Zucchero concreto; ma chi sa mai, che nell'effusione della linfa non vi si mescoli anche un poco di Zucchero proprio? Comunque siasi, gli alberi di vario genere tramandano la loro linfa, con alcune circostanze che loro sono particolari; e vi sono alcuni alberi, che non ne tramandano niente, o quasi niente.

In quanto alla vite, se nell'Inverno, allorchè è nuda di foglie, o nell'Estate, quand'è di foglie vestita, tagliasi l'estremità d'un fermento, non scola verun liquore; come pure non scola alla metà di Primavera, quando il sugo è nella sua maggiore azione; e se allora, spremendo con forza un fermento, ne stilla un poco di liquore, appena si lascia di spremere, egli entra subito nei vasi. Ma verso il cominciar di Primavera, quando non son per anche aperte le gemme, vedesi uscir molta linfa da tutti i tralci poc'anzi tagliati; lo che vien chiamato dai Vignaroli, il piangere della vite. Introducen-

cendo allora un tralcio alquanto grosso in un vaso, presto riempiesi di quel liquore. In capo a qualche giorno i vasi della vite in qualche modo corromponsi, e più non cola la linfa; ma rinfrescando la piaga, tornan le lagrime, e scolano fino a che si sviluppan le foglie; e cessa allora del tutto lo scolamento.

Per riconoscere se i ceppi della vite erano troppo stanccheggianti dal forzato scolamento della linfa, ho scelti a tale oggetto in una vigna molti ceppi affatto uguali: ho cavato tutta quella linfa che ho potuto dalla metà dei detti ceppi, ed ho lasciati gli altri in libertà di spanderne quanta son soliti i ceppi di tramandarne. Nel corso dell'Estate, e dell'Autunno, non ho conosciuta in loro differenza alcuna, nè quanto alla produzione del legno, nè quanto a quella dell'uva; e quindi non pare, che la maggiore o minore effusione della linfa produca nelle piante un sensibile effetto.

Non tutti gli alberi ugualmente forniscono del liquore linfatico; ma molti ve n'hanno, come l'Abero, la Betula, il Noce, il Carpino, che tanto quasi ne danno quanto la vite. Potrei su di ciò rimandare alle osservazioni, che dovrò riportare in appresso; ma ho reputato conveniente, per non separare ciò che all'oggetto medesimo appartiene, di qui riferir quelle, che hanno relazione collo scolamento del detto umore: farò solamente il possibile per esporle con ogni rigida brevità.

1.° Intaccando solamente la scorza, senza arrivare al legno, non si otterrà niente o quasi niente di questo umore.

2.° Intaccando il legno verso il finir d'Autunno, scorrerà la linfa quando vi sieno tutte le circostanze a tale scolamento opportune; e perciò individuerò tutte queste circostanze.

3.° Pare che il freddo sia una condizione necessaria; ma il fugo non cola finchè egli dura.

4.° Appena che il caldo del Sole, e l'aria dolce scioglie i legni dal diaccio, allora cola la linfa; e così, continuando il gelo, se batte il Sole sopra un tronco d'albero, scola la linfa dalle tacche a quello rivolte, e nulla scorre dall'altre rivolte al Nord.

5.° Non scorre mai la linfa in tanta abbondanza, quanto allorchè dopo un forte gelo succede il disciamento del gelo medesimo.

6.° Nel tempo che il fugo scola copioso, la scorza stà attaccata al legno, e le gemme non fanno veruna produzione. Quando comincia-

ciano le gemme ad aprirsi, allora men copiosa scorre la linfa, ed acquista un' ingrato sapore d'erba. Finalmente all'apparir delle foglie, cessa affatto lo scolorimento. Questo sapor d'erba, che contrae la linfa, nasc' egli forse perchè questo liquore cambia natura, o perchè si mescola con lei qualche altro sugo particolare? Questa è una cosa ch' io non ardirò mai di decidere: dirò solamente che egli è stato osservato, che allora il sugo facilmente s'infissisce, e che forma sulle piaghe una specie di gelatina.

7.^o Osservasi che la linfa poco o niente trasuda dai vasi della scorza, e non tra'l legno e la scorza, ma bensì dal corpo medesimo del legno; talmente che ella cola più copiosamente quanto più addentro la sostanza del legno penetra l'intaccatura. Del resto quanto ora io dico non può applicarsi che agli alberi, che crescono nel nostro clima, o in altri Paesi più freddi; poichè si sa, che nella Zona torrida le Palme scolorano il sugo per tutto il corso dell'anno; il qual'umore non è già una pura linfa, poichè ella diventa prima vinosa, e poi acidissima.

8.^o Pretende il Grewio, che questo umore scaturisca dai vasi spirali o dalle trachee del Malpighi: poichè già si sa, che secondo l'opinione del Grewio, i vasi spirali, come pure la tessitura cellulare, fanno, secondo certe circostanze, ora il ministero di vasi linfatici, ed ora quello di vasi da aria; e che la linfa entra al cominciare di Primavera nei vasi spirali; perchè, dice questo celebre Botanico, i vasi linfatici della scorza, per i quali ascende la linfa per le produzioni dell'albero, non potendo esercitar tali funzioni se non quando l'albero niente germoglia, la linfa è allora forzata a rifluire nelle trachee; ma, soggiugne egli, quando l'albero ha fatte le sue produzioni, i nuovi vasi linfatici possono ricevere la linfa, che somministrano i vasi della scorza, i liquori rientrano nei vasi loro particolari; e per allora la linfa abbandona le trachee.

Questa è un'opinione un poco sistematica: non si vede ciò che potrebbe determinar la linfa ad abbandonar le trachee, per rientrare nei vasi linfatici; oltre di che, come abbiain detto, tutti gli alberi non somministrano a Primavera l'umore di cui ora si tratta. Non voglio fermarmi di più su di questi fisici ragionamenti, e riprendo l'enumerazione dei fatti.

9.^o Tra gli alberi dell'istessa specie, alcuni ve n'ha che a Primavera tramandano quest'umore molto più presto degli altri.

10.^o Ge-

10.° Generalmente gli alberi grossi e vigorosi, e che sono ancora in crescere, tramandano maggior quantità di linfa, di quelli che sono troppo giovani, o che sono full' invecchiare.

11.° Un' albero piantato in grasso terreno, tramanda più linfa d' un' altro piantato in terra magra ed asciutta.

12.° Il Signor Gautier Medico del Re al Quebec, e poco fa con dolore di tutti perduto, ha osservato che la linfa scola principalmente dalla parte superiore dell' intaccatura; e che facendo ad un' albero due tacche, l' una due piedi sopra le radici, l' altra in cima al fusto, sotto ai rami, l' intaccatura bassa manda più linfa dell' alta.

13.° Se per altro si scava dalla terra una radice, e si taglia, allora le due parti tagliate, cioè quella corrispondente all' albero, e l' altra che barbica per terra, ambedue tramandano la linfa. Da ciò potrebbe concludere, che il detto umore può ugualmente venire tanto dall' alto quanto dal basso dell' albero.

14.° Sebbene nel nostro clima non sieno le circostanze tanto favorevoli all' effusione della linfa dell' Acero, quanto lo sono al Canada, ho voluto non ostante fare alcune esperienze, per vedere se il detto umore forga dalle radici, o discenda dai rami. E per ottener questo, ho fatte le seguenti esperienze; le quali farebbe desiderabile che fossero fatte anche nel Canada.

Li 6 Febbraro 1754, il termometro di Reamur essendo 5 gradi al di sotto di 0, feci fare dalla parte di mezzogiorno, a un Sicomoro, di 4 pollici di diametro, una tacca alta 6 pollici, e profonda 2 pollici.

Li 12, e li 13, il termometro essendo al di sotto di 0, la piaga era asciutissima.

Li 16, essendo il termometro molti gradi sopra zero, la parte superiore della piaga era umida, e vedesi trasudar la linfa tragli strati corticali e gli strati legnosi; ma gli strati legnosi erano asciutti, e la parte inferiore della piaga era tutta bagnata, senza che si potesse ben conoscere precisamente se la detta linfa trasudasse tragli strati legnosi, come nella parte superiore della piaga, come neppure se ella fosse colata dalla detta parte superiore. Le osservazioni del giorno 18 furono le medesime del giorno 16.

Li 20 cadde nella mattina un poca di brina, poscia il Sole comparve bellissimo; sulle ore 15 vedeanfi nella parte superiore della
pia-

piaga delle gocce che trasudavano dagli strati legnosi; le quali goccioline colavano sulla parte inferiore della piaga, talmente che erano tutta bagnata; scorgevansi anche alcune goccioline scappar dagli strati legnosi; finalmente sulla parte inferiore vi erano alcune piazzette asciutte.

Li 21 cadde della brina: le osservazioni di quel giorno furono le medesime della vigilia; con questa differenza però, che esaminando la parte superiore della piaga, mi parve che la linfa uscisse principalmente tra 'l legno e la scorza, e tra gli strati legnosi più alla scorza vicini. Le osservazioni del dì 23 furono le medesime del dì 21.

Li 24 essendo vento di Tramontana, e freddissimo, quantunque il termometro fosse a 4 ore dopo mezzo-giorno 4 gradi sopra 0, a piaga era affatto asciutta. Le osservazioni del dì 26, e quelle del dì 28 furono le medesime di quelle del dì 24.

Il 1 e il 2 di Maggio, spirando il vento dalla parte d' Ostro, ed all' ora di mezzo-giorno essendo il termometro 10 gradi sopra 0, viddeasi la parte superiore della piaga coperta d'acqua, e la parte inferiore asciutta. Le osservazioni del dì 4 e del dì 5 furono le medesime del giorno primo.

Nell' istesso tempo ch'io cominciai questa esperienza, cioè il dì 6 febbrajo, aveva fatto tagliare alto 6 pollici da terra un giovine Sicomoro, il di cui tronco era di 21 linee di diametro; feci sospendere verticalmente la parte superiore del tronco, e la feci stare nella medesima situazione, in cui ell'era quando l'albero era in piedi. E siccome io volea conoscere, se la linfa scorresse dalla parte del tronco corrispondente alle radici, o dall'altra che confina coi rami, per distinguere questi due tagli, dirò che l'uno si è quello corrispondente alle radici, e l'altro corrispondente ai rami.

Li 12 e li 13 febbrajo le piaghe erano asciutte; li 16 le piaghe erano bagnate, quantunque avessi fatta cuoprir quella delle radici con una campana di vetro, per difenderla dalle piogge e dalle rugiade.

Li 18 le piaghe erano meno bagnate, e solo un poco umide.

Li 20 il taglio dei rami sgocciolava un poco d'acqua, e quello delle radici era semplicemente bagnato. Li 21 l'acqua colava dai due tagli, ma più copiosa dal taglio dei rami che da quello delle radici.

Il 1 e il 2 di Marzo il taglio delle radici era più umido di quello dei rami.

Li

- Li 4 le due piaghe erano asciutte.
Li 5 le due piaghe erano bagnate, e vedeasi che l'acqua trasudava dagli frati interni, e non da quelli della circonferenza, e neppure tra il legno e la scorza.

Queste esperienze ci fanno conoscere che cola molta linfa dalla parte superiore degli alberi. Se si facessero anche queste esperienze al Canada, ove gli Aceri tramandano molta linfa, sarebbe bene l'esaminare se il liquore che sale dalle radici è diverso da quello che discende dai rami, e se questi due umori escono dai medesimi vasi. Verrebbe in tal guisa ad acquistare delle cognizioni utili all'anatomia dei vegetabili. Sarebbe bene ancora l'esaminare, se il sugo che ascende dalle radici, trasudi tra i cerchi legnosi, giacchè quello che discende dai rami trasuda, come ho detto, tra i cerchi legnosi: questi sono fatti, che non mi fu possibile di mettere in chiaro.

Terminerò quanto ora mi resta a dire sulla linfa, col far'osservare che l'umore che scappa dalle piante per via della traspirazione, sembra non esser altro che un'umore linfatico: avrò l'incontro di parlarne più a lungo in appresso; mi riservo pure di dare altrove l'idea della forza con cui il fugo s'alza nelle piante, come pure di molte altre circostanze che hanno rapporto col suo moto.

ARTICOLO IV. *Del Sugo proprio,*

OLTRE alla linfa, di cui ho parlato nel precedente Articolo, la quale in questo paese è copiosissima in quasi tutte le piante, e specialmente comparisce a primavera, prima che gli alberi mettan le foglie, scorgeasi anche nel legno, e principalmente nella scorza, un'umore affatto diverso, che potrebbe in qualche maniera paragonare al sangue degli animali. Questo umore è bianco e latteo nel Fico e nei Titimali; gommoso nel Ciriegio, nel Prugno, nel Mandorlo, nell'Albicocco, nel Pesco, ec. resinoso nel Terebinto, nel Pino, nell'Abete, nel Larice, nel Ginepro, nel Cedro, ec. rosso in alcune, giallo in altre piante: talvolta di sapor dolce; talvolta caustico; molte volte assai odoroso, e saporito, e moltr'altre insipido. Quindi questo liquore varia infinitamente negli alberi di diversa specie; ed in molti facilmente distinguesi dalla linfa.

Queste osservazioni hanno indotto il Malpighi a credere che ciascuna pianta avesse un liquore suo particolare.

Chi

Chi sà che in questo sugo proprio di qualunque pianta, non risiede principalmente il sapore, e le proprietà particolari di qualunque genere, o almeno di qualunque specie. Anche il Grewio crede così; e molti fatti avvalorano il parere di questo autore. Poichè altro non è che quell'umor bianco che cola dal Papavero, che sia narcotico: quelli del Titimalo e del Fico sono corrosivi, così pure il liquor giallo della Chelidonia; la virtù diuretica e balsamica dell'abete consiste nella sua trementina; la proprietà purgativa della Jalapa risiede unicamente nella sua resina: Oltre di chè, si riconosce poca virtù nelle piante ove la linfa abbonda, o in quelle ove il sugo proprio poco è dalla linfa diverso. Se si cava del sale essenziale dal sugo che si spreme dalle canne del zucchero, e dall'umore che cola dall'acero, ciò probabilmente accade perchè trovasi una porzione di sugo proprio mescolato con molta linfa, la qual linfa si consuma e si disperde colla cuocitura.

Finalmente, se in generale trovasi più virtù nelle scorze che nei legni, ciò segue perchè i vasi proprj della scorza sono più grossi che quelli del legno.

Ma per non dare all'opinione del Grewio più di valore di quello meriti, devo fare avvertire che il Pesco, tutte le di cui parti hanno un sapore amaro ed aromatico, e i di cui fiori sono purgativi, spande una gomma insipida, e che altro non è che semplicemente dolcificante e incrassante.

Comunque siasi, non si può fare a meno di non confessare che la maggior parte delle osservazioni concorrono a far conoscere, che la virtù delle piante principalmente risiede nel loro proprio sugo: dico principalmente, perchè non m'azzardo ad asserire, che le altre parti delle piante sieno del tutto prive di qualunque proprietà.

Offervisi anche, che quando il sugo proprio ha dell'odore, la di lui presenza si manifesta in quasi tutte le parti delle piante: per esempio, non v'è parte alcuna dell'abete che non sappia di trementina.

Bisogna dunque, o che il sugo proprio si mescoli in certa proporzione colla linfa, o che i vasi proprj, i di cui tronchi principali negli strati della scorza si manifestano, si dividano in un numero infinito di rami, talmente sottili che ci fuggano dalla vista.

Il Malpighi considera l'umor proprio delle piante come un vero sugo nutritivo. Se non ostante si pretendesse di paragonar questo li-
quo-

quore al sangue degli animali, come pare, che l' Analogia il persuada, non potrebbero allora confiderar questo fugo come un liquore immediatamente nutritivo, imperciocchè resta abbastanza provato, che non è già il sangue, ma le secrezioni del sangue quelle che somministrano la nutrizione alle parti inaffiate dal sangue. Del resto poi in quanto ai vegetabili, la cosa può anch'essere affatto diversa, ed il loro liquor proprio può essere rispetto a quelli più immediatamente nutritivo, di quello sia il sangue negli animali. Il meccanismo della nutrizione delle parti animali, egli è un mistero che fino ad ora non si è lasciato svelare dalle ricerche degli Anatomici più celebri; ed io son ben lungi dal presumere di credermi capace di sciogliere un tal problema riguardo ai vegetabili; scelgo piuttosto il silenzio, che la vanità di fabbricare un sistema, che al più al più potrebbe essere verisimile. E quindi terminerò ciò che a dir mi rimane intorno al fugo proprio, con alcune osservazioni, che bastar potranno a farlo meglio conoscere.

1.^o Quando i liquori proprj delle piante si travasano, non producono nè corteccia, nè legno, ma confermano un deposito contro natura, un'ammassamento di gomma o di resina, o d'altri fughj fiffi: egli è quasi lo stesso di ciò che accade negli animali, qualora il sangue esce da quei vasi in cui stava rinchiuso; poichè allora non forma nè carne, nè ossa, ma bensì dei depositi e dei tumori.

Egli è vero per altro, che tal sorta di depositi resinosi o gommosi, che nelle piante accadono, non sogliono esser loro molto pregiudiciali; anzi talvolta possono esser loro utili in qualche guisa, come osservasi negli alberi resinosi, i quali hanno alle volte di bisogno, che si procuri loro una evacuazione del fugo proprio: la quale evacuazione ridonda in nostro vantaggio, mentre ella procuraci dei balsami di varie specie, come pure la materia delle nostre vernici.

2.^o L' Analogia dei vegetabili cogli animali m'obbliga a far osservare, che l'eruzione del fugo proprio nei vasi linfatici, o nella tessitura cellulare, arreca alle piante certe malattie, che si ponno paragonare alle infiammazioni, che accadono agli animali. Egli è noto, che le infiammazioni negli animali altro non sono, che una eruzione di sangue nei vasi linfatici. I Peschi, i Prugni, gli Albicocchi, ci offrono frequenti esempj d'infiammazioni vegetabili; poichè quando il fugo proprio, che negli alberi è gommoso, troppo copio-

fa.

famente si è sparso nei vasi linfatici o nella tessitura cellulare, il ramo a cui un tale accidente toccò, muore sicuramente, quando col pennato non si tronchi la parte ove accadde l'effusione; e se poi questa piaga produce una esterna effusione del sugo proprio, questa perdita non arrecherà coll'albero tanto male, quanto ne arreca la interna eruzione dei liquori proprj nei vasi linfatici: questo è ciò, che conferma la giornaliera esperienza, quando s'intaccano gli alberi, per estrarne i sughi proprj.

3.^o Il sugo proprio, che s'estrae dagli alberi resinosi, scaturisce secondo certe circostanze, che sono straniere all'effusione della linfa; perchè 1.^o per procurare questo scolamento, s'intacca la scorza ed il legno; 2.^o si osserva, che il sugo trasuda da tutta l'estensione della piaga, ma principalmente tralla scorza ed il legno, quantunque non sia questo il luogo ove si vedano i vasi proprj più grossi. 3.^o Si osserva anche, che il sugo proprio trasuda in maggior copia nel tempo del gran caldo, che quando l'aria è fresca, e che questo sugo più non cola quando il tempo è freddo. 4.^o Osservasi costantemente, che esce maggior quantità di sugo proprio dalla parte superiore della piaga, che dalla parte inferiore; talmente che pare, che il sugo proprio scenda piuttosto dai rami, anzi che salga in alto dalle radici.

4.^o Levai, nel tempo del sugo, tutta all'intorno la scorza da un Ciriegio, di 5 in 6 pollici di diametro, per l'estensione circa d'un piede e mezzo; ricoperli il Cilindro del legno scorzato con uno strato di pittura a tempera, per impedir ch'ei facesse nel tempo dell'esperienza qualche produzione: finalmente fasciai la piaga con una fissa coperta di paglia, per prevenire il disseccamento. Viddi trasudare dalla parte superiore della detta piaga, e principalmente tralla scorza ed il legno, una grandissima quantità di gomma; ed indi l'albero morì, senza che seguita fosse effusione veruna del detto sugo nella parte inferiore della piaga. Anche questa esperienza adunque prova, che il sugo proprio scende dai rami verso le radici.

5.^o Nella sezione d'un ramo giovine vedesi il sugo proprio uscir dai suoi vasi, con questa circostanza particolare, che pare che egli trasudi in maggior copia dal taglio corrispondente ai rami, che dall'altro corrispondente al tronco.

La Figura che qui inferisco, renderà questa prova anche più chiara. Se nel tempo del sugo si taglia trasversalmente un ramo *a d* (vedasi

dasi *la Tav. II. Fig. 23.*) d'un Pino, d'un Abete, o d'un Fico, o Tav. II. fig. 23.
 sia che la estremità *a* resti in alto, o sia ella inclinata verso il basso, il sugo uscirà più abbondantemente dal taglio *c*, che dal taglio *b*.

Ben si vede che la precauzione da me presa di accomodare i rami destinati all'esperienza, in diverse situazioni, era per assicurarmi se il peso dell'umore potesse contribuire alla effusione più da una parte che dall'altra. L'effetto costante di questa esperienza stabilisce, 1.^o che il sugo proprio è costretto ad uscire da una contrazione dei vasi che lo rinchiudono; 2.^o che il detto sugo sembra più disposto a colare dall'estremità dei rami verso le radici, che a concorrere verso le estremità: lo che è già stato fissato dalle esperienze quì sopra addotte. Non ostante tutto questo, mi è venuto un dubbio, che ho creduto bene di porre in chiaro; ed è, ch'io credeva che il sugo proprio potesse uscir più copiosamente dal taglio *c*, che corrispondeva all'estremità del ramo, che dal taglio *b* corrispondente al tronco per le ragioni, che le fronde somministrano forse più sugo proprio, che l'altra estremità di questo istesso ramo. In conseguenza di questa riflessione, staccai una bacchetta da un'albero *e f* (*Tav. II. Fig. 24.*) Tav. II. fig. 24.
 che era senza alcuna fronda; la posi orizzontalmente, acciocchè il peso dell'umore non avesse parte alcuna nella mia esperienza; indi la tagliai nel mezzo secondo la linea *g b*; ed allora mi parve, che il sugo proprio colasse più dal taglio corrispondente alla parte più sottile *e*, che dall'altro corrispondente alla più grossa *f*. Mi è sembrato anche vedere, che il sugo proprio che ne colava, partivasi molto da lungi in quel ramo; perchè avendolo tagliato nei luoghi segnati *i* & *l*, cioè a un mezzo pollice di *g b*, allora ne trasudò meno sugo proprio, che nel tempo della prima sezione.

Volendo replicare queste piccole esperienze, abbisognerà scegliere delle piante, che abbiano il sugo proprio colorito; come il Titimalo, il Papavero, la Lattuga, la Celidonia, il Carciofo, o quelle, che hanno un sugo viscoso, come il Pino, l'Abete ec. perchè il sugo proprio in molte piante è così poco dissimile dalla linfa, che potrebbesi quasi dubitare della di lui esistenza, quando non si avessero altre tronde delle valide ragioni per credere, che tutte le piante lo abbiano.

Le osservazioni fatte su tal proposito dal Mariotte, cadono quì troppo in acconcio, per non doverle omettere. Tanto più, che questo Autore dice, che vi sono nella esterna parte delle radici, certi

PARTE I.

E

pori

pori impercettibili per cui passa l'acqua piovana; e tanto più, che il detto Autore crede anche, che nell'esterna parte dei vasi proprj, da lui paragonati all'arterie, vi sieno dei pori simili per cui passa il fugo, preparato ch'ei sia dal calor del Sole, e dalle filtrazioni, che si fanno nella materia spugnosa dell'interno della pianta. Il ritorno del detto fugo è trattenuto dalle valvule, e questo ostacolo lo obbliga a somministrare di che far crescere e slungarsi ai rami, alle foglie, alle radici, ec. Dal ragionamento di questo Fisico, vedesi che egli paragona i vasi proprj delle piante alle arterie del corpo degli animali, ed il fugo al sangue che scorre per le loro vene. Corrobora questa opinione con delle esperienze quasi simili a quelle, che ho qui di sopra portate. Se si taglia trasversalmente, egli dice, una pianta lattiginosa, o una di quelle col fugo giallo, vedesi sempre venire o altrettanto o anche più di questo fugo colorito dalla parte superiore, a cui sono attaccate le foglie, che dalla parte inferiore, d'onde partono le radici, quand'anche si tenesse la detta pianta a rovescio, cioè le radici in alto prima di tagliarla. Se si taglia l'estremità delle radici da una di queste piante, ne scorre il fugo colorito come dall'estremità delle foglie, e dai piccoli rami, lo che prova, che il detto fugo è molto premuto nei vasi che lo rinferano; e che il detto scolamento non accaderebbe quando i pori non fossero disposti in maniera da impedire il ritorno del detto umore. Se di poi tagliasi dal rimanente del detto fusto, al di sotto d'un pollice all'incirca della prima sezione, vedrassi ancora salire del fugo colorato, che viene dalle radici, ma non se ne vedrà niente o quasi niente nella parte superiore.

Ho attribuito questo fatto all'avere i vasi proprj spremuto fino ad una certa distanza il loro fugo proprio; ma il Mariotte lo riguarda come una prova, che questo fugo non possa ritornare altrimenti verso le radici; perchè, dice egli, se si taglia un'altra volta, ad una certa distanza dalla prima sezione, una porzione della detta parte corrispondente alle foglie, deve vederli salir pochissimo fugo dalla parte tagliata, ed all'incontro deve discendere dalla parte corrispondente alle foglie.

6.° Terminerò quanto dire io doveva sul fugo proprio delle piante, col fare osservare, che i vasi principali che lo rinferano sono diversamente collocati negli alberi di diversa specie; perchè, 1.° la
tre-

trementina dell' Abete si raguna sotto l'epidermide nelle vescichette.
 2.^o La Sandracca si ammucchia anch'essa tralla scorza ed il legno.
 3.^o La pece del Picea trasuda principalmente tralla scorza ed il legno.
 4.^o La trementina del Larice si accumula nel corpo medesimo del legno.
 5.^o La resina del Pino trasuda dalla scorza, tralla scorza ed il legno, od anche dal corpo legnoso.

Può consultarsi a tal proposito quanto ho detto nel Trattato degli Alberi già pubblicato in quegli Articoli ove ho parlato di questi diversi Alberi. Queste osservazioni devono impegnare i Botanici a farne dell'altre: coll'accozzar questi lumi si giungerà forse meglio a conoscere la distribuzione dei vasi proprj nel corpo degli alberi.

ARTICOLO V. *Dell'aria rinchiusa nelle piante.*

L'ARIA è un fluido necessario ugualmente alla vita dei vegetabili, quanto a quella degli animali; questa è una verità che tutti accordano.

1.^o Quando parlerò della salita del sugo nelle piante, non solamente farò osservare, che i liquori che esse tramandano in tanta copia nella stagione delle lagrime (*), sono mescolati d'una quantità d'aria, ma proverò anche, che l'aria rinchiusa nelle piante esce copiosa per la traspirazione.

2.^o Introducendo il tronco d'un'albero novello, o solamente un ramo dentro un tubo di vetro, come si è già veduto nella *Tav. I. fig. 8.* e che poi s'empia d'acqua il detto tubo, il di cui fondo si farà bene unito con del mastice al fusto, allora vedrassi una quantità di bolle d'aria restare attaccate a quei tumoretti della scorza, ove abbiamo detto esser rotta l'epidermide. Se ne vedranno anche dell'altre attaccate alle foglie immerse nell'acqua; si potrà anche osservare che queste bolle sono più grosse, ed in maggior copia, quando l'aria è calda e disposta al mal tempo, che quando l'aria è fredda. Potrebbero queste osservazioni determinarci a credere, che quest'aria scappa dalle piante istesse; ma farò vedere, quando parlerò delle foglie (**), che un giudizio simile farebbe troppo precipitato.

3.^o Mettendo sotto il recipiente della Macchina pneumatica un pez-

E 2

ZO

(*) Vedi Lib. IV. Cap. V. (**) Vedi Lib. II.

zo di legno verde tuffato nell'acqua purgata dall'aria, veggonsi uscire molte bolle d'aria, a misura che si tromba quella del recipiente.

4.^o Non v'ha chi non sappia, che molta è l'aria che esce fuori dalle frutta tenute nel vuoto; e che una mela vizza molto, e grinzoza affai gonfiassi per l'azione dell'aria interna, ed elastica che essa rinchiude.

5.^o Potrei riportare molte altre esperienze, che provano esservi molt'aria nell'interno delle piante, e quanto necessario siasi questo fluido alla vegetazione; ma mi contenterò di esporre solamente molte belle esperienze fatte dal Signor Hales, per istabilire, che molta è l'aria che entra nei vegetabili.

Avendo questo dotto Fisico aggiustato un grosso tubo di vetro *b* Tav. II. fig. 25. all'estremità d'un ramo di Ciriegio o di Pomo *a*, attaccò all'altra estremità *c* del medesimo tubo un'altro tubo più sottile *d* ben sigillato, e la inferiore estremità del quale immergeasi nell'acqua raccolta nella Catinella *e*, posta disotto; l'acqua allora alzossi nel tubo *d* fino verso *f*. Ciò mostra chiaro, che vi è nei rami una forza di succiamento che determina l'aria ad ascendere nell'albero, precisamente come il sugo.

6.^o Ma per dove mai quest'aria, utile tanto alle piante, entra ella nei vasi, che sono principalmente destinati a riceverla? Il Malpighi, confessando prima, che tutte le ricerche da lui fatte per sciogliere una tal questione furono inutili, congettura, che l'aria entri nelle piante per le radici insieme col sugo; aggiunge, che la separazione dell'aria dai liquori si fa nell'istesso interno delle piante.

Egli è bene di osservare, che la qui riportata esperienza di Hales giova molto all'opinione del Malpighi; poichè se in vece del detto ramo *a*, si adopera un'albero giovine, e si rinchiudano le sue radici nel tubo *b*, allora il succiamento divien maggiore. Se il sugo entrasse nelle piante in forma di vapore, potrebbe allora l'aria svanire colla traspirazione, ed intanto le parti più sisse potrebbero restar nelle piante per nutrirlle; ma non è per anche questo il tempo di toccare una così importante questione.

7.^o Crede il Grewio, che l'aria entri nelle piante, non solamente per le radici, ma anche a traverso delle foglie e della scorza. Siccome proverò in appresso, che le piante hanno la proprietà d'inzupparsi dell'umore delle rugiade, sembra naturale di concludere, che l'aria

l'aria possa per le medesime strade introdursi nelle piante. Egli è per altro molto probabile, che molta ne entri anche per le radici, non solamente perchè vi si scorgono molte trachee, ma ancora perchè l'aria, per causa della sua leggerezza, deve essere più disposta ad alzarfi nelle piante, che a discendere: può anch'essere che la detta aria contribuisca alla salita del sugo. Ora riporterò un'altra esperienza di Hales, la quale prova che l'aria può introdursi nelle piante a traverso della scorza.

8.^o Il Signor Halles sigillò col mastice verso la cima d'un recipiente tubulato *a a*, *Tav. II. fig. 26*, un ramo d'albero che si estendeva dal *b* fino al *c*; l'estremità *b* immergevasi per l'altezza di 6 pollici nell'acqua raccolta in un vaso posto sotto del recipiente, e che stava sul piatto d'una macchina pneumatica: dopo di aver dunque sigillato l'estremità *c* del ramo, come anche le cicatrici *a d e f*, per impedir che l'aria entrar potesse nel ramo da quelle parti, coperse con una vescica l'apertura del recipiente, ed ebbe anche l'avvertenza di ricuoprirla all'intorno di mastice.

Tav. II. fig. 26.

Quando trombava l'aria, vedeanfi uscir molte bolle dalla estremità *b*; ma ne uscivano molte meno di quello ne uscissero quando la parte *c* non era foderata di mastice.

Si può in primo luogo concludere da questa esperienza, che l'aria trapassa facilmente i vasi legnosi; ed è questa infatti la strada ch'ella fa, quando si lascia aperta la parte *c*. Di più, poichè vedevansi anche delle bolle d'aria quando la detta parte *c*, e le cicatrici *a d e f* erano chiuse dal mastice, se ne può dunque concludere che l'aria si può introdurre a traverso della scorza, quantunque veramente, con maggior difficoltà, che seguitando la strada delle fibre legnose o corticali. Io dico espressamente delle fibre legnose e corticali, perchè il medesimo Hales, esaminando attentamente l'estremità *b*, vedeva uscir delle bolle, non solamente dalla scorza, ma anche dal legno. Seguitando questa esperienza, il Signor Hales unì col mastice in *gg* un tubo di vetro *g e f c*, che poi riempì d'acqua; l'estremità *c* come anche le cicatrici *a d e f* correivano, come abbiám detto, ben coperte di mastice; in questo stato non vidde comparire veruna bolla d'aria in *b*. Queste esperienze riuscivano ugualmente bene quando mettevansi i rami d'albero a rovescio: ma quando il Signor Hales sostituiva al ramo *b c* delle fronde guarnite di foglie, o sia che le

PARTE I.

E 3

det-

dette foglie fossero esposte all'aria, o sia che fossero immerse, non compariva altro, che uno scarso numero di bolle in *b*.

Siccome questo dotto Fisico assicura di aver veduto uscir le bolle d'aria tanto dalla scorza come dal legno, può colla di lui testimonianza concludersi, che nella esperienza come egli l'ha fatta, l'aria attraversi non solamente le trachee, ma anche i vasi proprj o i linfatici, poichè nella scorza non vi si ponno scorger trachee.

L'opinione del Signor Hales è, che entri nelle piante non solo un'aria elastica, ma anche dell'aria che vi acquista una tale proprietà. Per comprender ciò, bisogna ricordarsi che svapora molta aria nel miscuglio che si fa degli acidi cogli alcali, dalle dissoluzioni metalliche, dai liquori che fermentano, ec. Secondo l'opinione del nostro autore, quest'aria non esisteva già sotto la forma d'aria elastica nelle sostanze che ora abbiain detto; ma vi acquista questa elasticità, ed allora prende la natura medesima dell'aria dell'Atmosfera. Chi bramasse maggiori lumi sopra di ciò, consulti le belle esperienze di questo ingegnoso Fisico sull'analisi dell'aria.

Quantunque io creda che le osservazioni fin qui addotte sulla linfa, su i fughi proprj, e sull'aria rinchiusa nelle piante, possano dare una sufficiente idea dei diversi liquori che penetrano i vegetabili, io sono non ostante persuaso, che un più assiduo esame, ed esperienze moltiplicate, potranno far conoscere molti altri liquori oltre a quelli di cui ho parlato. S'incontreranno per altro nel corpo di quest'opera delle occasioni che ci potranno far conoscere molti altri liquori che molto differiscono trà di loro; e quindi averò campo di ritornare anche in appresso a parlare su di questa materia.

C A P I T O L O V.

DELLE RADICI, e DEI RAMI.

Dopo di aver alquanto diffusamente parlato del tronco degli alberi, dei vasi, dei liquori, ec. contenuti da quelli, d'uopo è di esaminare adesso le divisioni del medesimo tronco, o sia in radici, o sia in rami. Questo sarà il soggetto delli due seguenti Articoli.

ARTICOLO I. *Delle Radici.*

IL Tronco degli alberi si divide da basso in molte porzioni che formano le radici grosse; queste dividonsi in altre molte radici, le quali pure si suddividono; e queste suddivisioni sono talmente moltiplicate, a segno che si riducono a piccole radici sottili quanto un capello, per il chè *Radici capillari* si chiamano. Tutte queste ramificazioni formano un' infinito sviluppo di radici, le quali si distribuiscono per entro la terra, ed alle volte si dilungano molto dall' albero da cui si partono.

Questa estesa distribuzione di radici era necessaria acciò si potessero esse insinuare dentro alle moltissime molecole terrestri, e da quelle raccogliere quella immensa quantità d' alimento necessario alla sussistenza ed all' accrescimento d' un' albero.

Tralascierei certamente molte importantissime cose, se restringere io mi volessi semplicemente a quanto immediatamente riguarda le radici degli alberi. Entrerò dunque in alcuni dettagli sulla diversa forma delle radici delle piante: ma trattandosi nella presente Opera dei soli alberi ed arbusti, scorrerò di passaggio tuttocchè che può essere a questi straniero...

Molte piante hanno dentro terra una massa carnosà conosciuta sotto il nome di Cipolla. Questa massa, in quelle piante chiamate più particolarmente bulbosè, è formata di strati, o robbi che s' involuppano trà di loro: di questo genere sono i Porri, le Cipolle che si adoperano nelle cucine, i Giacinti, i Narcisi: le figure delle quali si possono vedere nella *Tav. III. fig. 1 e 2*. Altre, come molte specie di Gigli (*Fig. 3.*) hanno il bulbo fatto a squame. Tav. III. fig. 1. 2.

Egli è bene di osservare che la sostanza *aa bb cc* (*Fig. 1 2 e 3.*) che forma il corpo del bulbo, non deve essere considerata come una vera radice; ella si rassomiglia più ad un bottone il quale in piccolo rinchiude le produzioni che sviluppar si devono a primavera. La vera radice ell' è una specie di baccello carnosò *dd ee ff* che sostiene la Cipolla: ella è quella parte che da l' origine alle radici Capillose *g b i*. e 3.

I Giardinieri molto impropriamente chiamano, ora Cipolle, ora Tuberculi, certe produzioni simili, in quanto alla forma, alle vere Cipolle; ma che differiscono, in quanto alla sostanza interna, la quale

è uniforme, come si è la carne d'una mela, e dal non essere ella formata, nè a squame, nè a strati, come le vere Cipolle; servirà per esempio il *Crocus* Fig. 4 e 5.

Tav. III. fig. 4.
e 5.

Queste specie di Cipolle hanno i bottoni sulla superficie, a guisa delle piante che non sono vivaci se non per le loro radici, e siccome le foglie di queste Cipolle prendono origine dal cannello o baccello che sta per di sotto, io sono inclinato a credere, col M. B. di Jussieu, che esse sieno come fusti; o all'incirca della medesima natura delle radici carnose di cui ora diremo.

Fig. 6. L'*Orchis* (Fig. 6.) presenta qualche cosa di singolare, a causa delle due specie di tubercoli o masse carnose, che internamente non contengono nè le foglie, nè i fiori che spuntar devono, ma che portano di sopra un bottone, e delle radici capillose *iii*. Molte specie di

Fig. 7. questo genere (Fig. 7.) hanno la di loro massa carnosa terminata da una specie di digitazioni, che poi diventano abbastanza sottili per servir di radici.

Tav. IV. fig. 8. La radica carnosa del Pan porcino (Tav. IV. Fig. 8.), che con maggior ragione porrebbe chiamarsi *Tubercolo*, paragonandolo al Tartofo (*Tubera*), ell'è una massa che porta alcuni bottoni, e d'onde partono da tutte le bande delle radici ramose. La massa carnosa di

Fig. 9. questa rapa piatta, chiamata dagl' Inglese *Turnip* (Fig. 9.), non ritrae il suo nutrimento che dalla piccola radica che sta abbasso; perchè avendo tagliato apposta questa piccola radice in terra, la rapa è quasi sempre perita.

Fig. 10. L'altre radici carnose, come quelle della Panacea, delle Carote, delle Rape (Fig. 10.), dei Ramolacci (Fig. 11.), sono più o meno allungate; e sono provviste nella loro lunghezza d'alcune radici capillose, ordinariamente sottilissime.

Fig. 12. Le radici degli Anemoni, dai Giardinieri chiamate *Zampette*, (Fig. 12.) sono nella forma loro molto singolari; sembrano essere un aggregato di molte radici ovali, un poco appianate; e ciascuno di questi corpi o lobi, riuniti da uno dei loro capi, può, qualora sieno provvisti di bottoni e di radici capillose, vegetare separatamente dagli altri, e formar nuovi piedi.

Alcune radici carnose, che chiamansi *Radici in stivali* sono formate d'un numero di radici quasi cilindriche, le quali a guisa delle dita, partonsi da un centro comune, e formano delle radici capillose,

Quel-

Quelle, che, come molte specie di Ranuncoli (*Fig. 13.*), hanno la loro digitazione molto corta, si chiamano branche; altre così in stivali dette dai Botanici radici in *Asfodilo*, hanno le digitazioni più lunghe: il Giglio *Asfodilo*, lo Sparagio, sono d'un tal genere (*Vedi la Tav. V. fig. 1.*) La maggior parte di queste piante spuntano il fusto in *b*, e producono delle nuove radici in *c*, che rimpiazzano le vecchie. Alcune radici son provviste di granelli carnosì, come quelli dei nidi degli uccelli (*Fig. 2.*), la Canna e l'Iride (*Fig. 3.*) hanno le radici nodose, o come articolate. Quelle della Dentaria (*Fig. 4.*) sono in qualche maniera squamose nella superficie.

Molte piante non hanno che radici capillose sottilissime, come nella *Fig. 5.* o se elleno sono un poco più grosse (*Tav. VI. Fig. 1.*), allora si chiamano radici fibrose o filamentose. Finalmente, non dovendomi troppo dilungare su di ciò, la *Fig. 2.* di questa istessa Tavola rappresenta delle radici ramosi; e siccome la maggior parte degli alberi e degli arbusti hanno le radici di questo genere, non posso fare a meno di non estendermi di più su di ciò che spetta a quelle: ma prima di parlare della distribuzione loro nella terra, dirò una parola della loro organizzazione.

Le radici, come anche il tronco degli alberi, sono formate del corpo legnoso, degli strati corticali, che ivi sono ordinariamente più grossi del tronco. L'Epidermide delle radici è comunemente più grossa di quella dei rami: il suo colore partecipa alcun poco del color della terra che le ricuopre: il colore d'una radice d'Olmo che si estende nel letame mescolato con terra, è un poco più scuro di quella che si tira fuori dal terren scuffo e semplice.

Per altro il color naturale delle radici si fa sempre vedere; poichè da qualunque terreno si sbarbi una radice d'Olmo, ella sarà sempre rossiccia; una radice di Moro, giallastra; ed una radice di Citiso alpino, sarà tendente al bianco. Anche il color del legno è il più delle volte più vivo nelle radici che nel tronco.

Gli strati corticali delle radici sono, come quelli del tronco, formati di fibre linfatiche di vasi proprj, e della tessitura cellulare, che sembra essere più abbondante nelle radici che nell'altre parti dell'albero. Il corpo legnoso delle radici, come pure quello del tronco, è formato di fibre linfatiche, di vasi proprj, di tessitura cellulare, e di vasi a spirale o trachee. Quest'ultima specie di vasi trovasi in gran

Tav. IV. fig. 12.

Fig. 2. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.
Tav. VI. fig. 1.

Fig. 2.

quantità nelle radici; e le aperture, che comunemente credonfi gli orifizj loro, sono più grandi che nel tronco. Ho già detto, che esaminando delle radici d'Olmo sull'entrar dell'inverno, ne ho visto scaturir da quelle trachee molto umore.

Io ben so che M. Bonnet è arrivato a far passare nei vasi delle piante dei sughi colorati, e ch'ei ne conclude, che l'organizzazione delle radici è diversa da quella del fusto; ma siccome queste esperienze non sono state fatte che sopra piante erbacee, io credo che non si possano adattare agli alberi, che formano il principale oggetto dell'Opera.

E quindi, mentre l'organica disposizione delle radici tanto si rassomiglia a quelle del tronco, inutile sarebbe di fermarmi di più a descrivere ciò che ad esse si aspetta; mi contenterò adunque di riportare alcune osservazioni sopra di ciò (*).

La prima produzione dei semi ell'è una radice che perpendicolarmente s'affonda nella terra. Avrò occasione nell'andar di questa Opera (**) di estendermi sopra molti fatti singolarissimi, che riguardano la produzione di questa prima radice; ma per adesso, mi contenterò di fare osservare, che da principio ella si estende perpendicolarmente in terra, che vi si affonda molto, e che se non s'intoppa in qualche sasso, o qualche letto durissimo, che al di loro slungamento si opponga, si distende come una rapa, e forma ciò che dicesi *Radice maestra* o *Fittone*. (Vedi la Tav. VI. Fig. 3.)

Tav. VI. fig. 3.

Ho sbarbate alcune Querce seminate in sabbia grassa che molto andava in fondo; i loro fusti erano alti 6 pollici, e la loro radice in Fittone era lunga circa quattro piedi.

Tutti gli alberi venuti dal seme hanno una radice maestra, la quale è più lunga, quanto più la terra penetrabile dalle radici, va in fondo. Ma se ad una breve distanza dalla superficie del terreno, s'incontri un masso di pietra o di tufo, che si opponga all'allungamento del fittone, quella radice allora rimane cortissima; e si divide in molte altre radici, o branche laterali (Fig. 4.)

Fig. 4.

In qualunque terreno si può impedire il prolungamento del fittone; perchè tagliata che sia una volta una radice, allora ella più non si slunga, ma produce delle branche o radici laterali. Mi sono affi-

cu-

(*) Ved. Lib. V. Art. delle Iniezioni. (**) Ved. Lib. IV.

turato di questo fatto, allevando delle piante nell'acqua pura: ed ecco come ho fatto.

Faceva germogliar dei noccioli, delle mandorle, delle ghiande, dei granelli entro l'umide spugne: quando la radice novella, che chiamasi la radicola o *barbatella*, o impropriamente il germoglio, e che formar doveva il fittone, erasi allungato d'un pollice e mezzo o di due pollici, poneva la semenza ridotta in quello stato sul collo d'una Caraffa di cristallo, in maniera che questa sola radice toccasse l'acqua; continuava allora questa ad allungarsi, e giungeva presto al fondo della caraffa; ma s'io tagliava la sola lunghezza di 3, o 4 linee dell'estremità della radice maestra, in vece di slungarsi, produceva delle branche laterali. Queste novelle radici, se venivano anch'esse tagliate, cessavano pure di distendersi, e ne producevano dell'altre.

Ho alle volte scalzata la radice d'un'albero giovane, l'ho tagliata, ed ho avuta l'avvertenza di segnarne con pietra di lavagna l'estremità recisa: da lì a qualche anno, ho voluto riscontrare in quale stato ella fosse, ed ho visto, che la posta lavagna corrispondeva alla piaga della tagliata radice, la quale erasi cicatrizzata, come si cicatrizzano i rami tagliati; che la detta radice non erasi molto estesa; ma che era cresciuta in grossezza, e prodotto aveva dell'altre radici laterali.

Da queste osservazioni si raccoglie, che ogni qualvolta tagliasi la radice maestra d'un'albero, questa più non si slunga, ma produce molte branche laterali. Quando parlerò dei semenzaj, vedrassi quanto importante sia una tale osservazione.

Gli esami da me fatti sulle piante, che vegetano nell'acqua, m'hanno fatta scuoprire un'altra singolarità; ed è, che le radici non si slungano se non nella loro estremità. Ho passati in una radice tenera dei sottilissimi fili d'argento; ho segnato al di fuori d'una caraffa di cristallo dei puntini con vernice colorita, ciascuno dei quali corrispondeva a ciaschedun filo d'argento: tutti i fili, fuorchè quelli, che erano distanti 2, o 3 linee dall'estremità, corrispondevano sempre ai punti di vernice segnati sulla caraffa, quantunque la radice si fosse molto allungata; dunque le radici non si distendono se non nella estremità. Questa esperienza replicata in più maniere, servirà per far conoscere, per qual cagione le radici tanto legnose, quanto erbacee, più non si slungano subito che venga loro tagliata la sola estremità per la lunghezza di 3 in 4 linee.

Mi

Mi si potrebbe rispondere, che i fili d'argento da me introdotti nelle radici, servivano d'ostacolo al moto del sugo, e venivano in tal guisa ad impedire lo slungamento; ma è accaduto lo stesso quando in vece dei fili d'argento, ho fatti sulle stesse radici dei piccioli segni con vernice di colore, ovvero quando spartivo la radice con dei piccoli nodi di lana: io credo, che tali precauzioni possano difendermi da qualunque obbietto. Ma per tornare a quanto io diceva della radice maestra, bisogna osservare, che quantunque ella sia stata tagliata, o che ella incontri un durissimo masso, che al di lei slungamento s'opponga, o che finalmente ella abbia continuato a molto distendersi; in tutti questi casi ella produce delle radici laterali; tutta la differenza consiste in ciò, che nell'ultimo caso le produzioni laterali sono meno considerabili, e molto più tardive; ma per altro vi si veggono sempre delle produzioni laterali; e queste laterali radici sono tanto più vigorose e forti, quanto più son vicine alla superficie della terra: di modo tale, che se in un terreno uniforme si conservano, piantando un'albero, molti piani di radici, quello che si troverà vicino alla superficie, farà quasi sempre più vigoroso di quello che stà più in fondo. *Vedi la Tav. VI. fig. 3.*

Tav. VI. fig. 3.

Le radici laterali si slungano coll'ordine medesimo, con cui si slunga la radice maestra: esse al pari di questa producono dei rami, che si distendono a dritta ed a sinistra, con questa differenza, che le branche o rami, che partono dalle radici verticali, sono tanto più vigorose, quanto più vicine sono al sufo, ed all'incontro nelle radici orizzontali, muojono molte di quelle, che stanno vicine al tronco, e ciò nasce a misura, che se ne sviluppano delle vigorose verso la estremità.

Osserverò di passaggio, che essendo le radici laterali destinate a raccogliere il sugo, elleno sono con questo slungamento portate ogni anno entro a nuova terra, capace di somministrar loro il sugo nutritivo, che condur poi devono a tutte le parti dell'albero: ne parlerò più diffusamente in appresso.

Le altre suddivisioni delle radici, che si estendono quasi all'infinito, seguirebbero presso a poco un'ordine regolare, il quale forse è proprio di qualunque albero d'un'istesso genere, o d'una stessa specie; ma questa uniformità vien molte volte interrotta e sconcertata da alcune circostanze che ora dirò.

Se

Se un'insetto, o qualche altro accidente distrugge una radice, ella più non si diftende, e produce altre branche, che prendono una diversa direzione, e che suppliscono abbondantemente a quella distrutta; perchè molte radici certamente raccolgono più fugo, che una sola: e quindi, se lavorando la terra vien tagliata l'estremità d'alcune piccole radici, l'albero non s'indebolisce già; anzi spunta più bello. Le pietre o le motte di terra durissime, fanno molte volte cambiar la direzione alle radici. E talvolta, secondo che son posti questi corpi duri, succede, che le radici non ponno slungarsi; ed allora mettono delle branche laterali, come se fossero state tagliate. Ho talvolta osservato, che in queste incommode positure formavasi una specie di *Nodus* in cima alle radici, che non avevano la libertà di dilatarsi. Succede l'opposto quando una radice fa capo in uno smosso terreno; poichè allora quel ramo, che altrimenti sarebbe poco dilatato, molto si slunga. Le seguenti osservazioni proveranno questo fatto.

Se in poca distanza da un'albero giovane si faccia una buca fonda tre piedi, e che subito riempiasi della medesima terra, le radici dell'albero giovane seguiranno la direzione della detta buca, dove faranno un grandissimo profitto, senza formare appena delle branche laterali. Se una metà della fossa, quella per esempio dalla parte di Ponente, si riempia della terra scavata, e l'altra rivolta a Levante riempiasi di terra molto migliore, allora si troveranno ordinariamente più radici, che faranno penetrate più in questa, che nell'altra parte della buca. Lo stesso sarebbe, se in vece di terra fertile, si riempiesse la detta buca di concio; ma allora le penetrate radici sarebbero molto sottili: poichè si vede, che le radici sono tanto più lunghe e sottili, quanto più morbido e leggiero si è il terreno per cui devono trapassare: e questa si è appunto la ragione per cui esse sono nei vasi molto lunghe e sottili, ed anche più nell'acqua. Eccone delle prove.

Ho fatti sbarbare degli alberi piantati sull'orlo d'un fosso pien d'acqua: le radici seguitavano la direzione del fosso; erano lunghissime, sottili, ed appena avevano delle branche laterali. Egli è noto che quando un ramicello di radice penetra in un condotto d'acqua, egli vi getta molti finissimi filamenti, i quali si moltiplicano a tal segno, che queste filamentose produzioni, cognite col nome di *Code di Volpe*, chiudono affatto il passaggio dell'acqua. Sono arrivato a fare di queste code di volpe, coll'introdurre delle radici d'albero in

un tubo di vetro d'un pollice di diametro, e lungo tre piedi, ch'io teneva sempre pieno d'acqua. Per mezzo della trasparenza del vetro, io vedeva che andavanfi formando sulle radici dei tuberculi flosci, che le danneggiavano; ma pure il tubo riempievasi di lunghi filamenti, e giunsi ad avere una coda di volpe, simile a quelle che turano i canali delle fontane.

Sebbene avessi io l'avvertenza di tener sempre ripieni i tubi d'acqua chiara e purissima, non ostante ragunavasi intorno alle radici una materia gelatinosa, la quale non farebbesi certamente formata nell'acqua ch'io metteva senza l'aiuto delle radici. Dice il Signor Bonnet d'aver veduto nell'estremità delle radici, che si formano nell'acqua, delle leggiere concrezioni terrose; io poi, indipendentemente dalla muccillaggine che ho detto, ho veduto ivi solamente una specie di frangetta, di cui non capisco l'uso. Era questa gelatina prodotta forse da una secrezione del fugo, che facevasi dalle radici? oppure era forse quella sostanza un sedimento formato da una quantità di filamenti, che marcivanfi nell'acqua? Questo è ciò ch'io non avrei coraggio di decidere. Checchè ne sia, devesi concludere dalle esperienze quì addotte, che le radici sono sempre gracili e minute nelle terre molto leggiere, e che maggior corpo esse acquistano nelle terre più forti; ma che per altro se la terra fosse troppo dura, non potrebbero le radici dilatarsi per andare a cercare il nutrimento necessario all'albero: vero si è per altro che certe radici hanno una forza grande per insinuarsi dentro le terrose molecole. Ho vedute delle radici di Vite e di Noce che si erano molto inoltrate nel tufo bianco; ed all'incontro nessuna radice di molti Olmi grossi piantati in quell'istesso luogo, non aveva potuto penetrare in quella secca di terra. Si stenta anche molto a comprendere, come l'estremità d'una radice, che è tenerissima, possa aprirsi il passaggio tra dei letti di tufo o dei muri, per arrivare a un mucchio di buona terra: eppure esse vi giungono, vi penetrano, e fanno sforzi tali per venir grossa, che squarciano perfino delle durissime muraglie. Vero si è, che questi progressi sforzati son molto lenti, e che gli alberi soffrono a proporzione di quanto soffrono le radici per superare gli ostacoli. Si vede una prova, che la permeabilità della terra ha i suoi vantaggi, riandando l'esempio del fosso poc'anzi addotto, e mostra anche l'esperienza, che le radici più vigorose si veggono sempre nelle terre smosse dalle coltivazioni.

Ora

Ora riporterò su tal proposito una osservazione che ho fatta su degli Olmi grossissimi ribaltati dal vento. Secondo l'uso della nostra Provincia, questi Olmi erano incalmati, ma erano stati piantati troppo a fondo; talmente che venendo sotterrato l'incalmo, avevano quegli alberi cominciata la radice dal collare; cioè, avevano spuntate le radici in quel cerchietto che forma l'incalmo. Queste radici *a* (Fig. 5) che stavano più vicine dell'altre alla superficie della terra, eranfi molto ingrossate, e formavano una scarpa considerabile; ed all'incontro le radici *b* di sotto all'incalmo, erano rimaste nella medesima grossezza all'incirca, in cui erano quando erano stati piantati gli Olmi. Ho fatta la medesima osservazione su dei meli, e quindi può tenersi come un fatto costante, che ogni qual volta un'albero ha due piani di radici, il piano superiore è sempre il più vigoroso.

Tav. VI. fig. 5.

Le radici sono provviste, per quanto son lunghe, di una quantità di germi atti a produrre degli altri, mentre la sezione d'una radice produce lo sviluppo di molte altre novelle radici. Anche gli rami sono ugualmente provvisti di germi di radici, mentre esse ne producono quando si fanno dei talli. Siccome questa operazione di Giardinaggio ell'è molto importante, per doverla trattare in un articolo a parte, mi contenterò di dire adesso, di passaggio, che sono arrivato a far produrre a dei rami, dei germi ed in qualche maniera dei bottoni di radici, i quali sono molto diversi da quelli che devono produrre i rami medesimi. Farò vedere che questi quì sono molto più organizzati degli altri, che altro non sono che una piccola papilla legnosa che costringe la scorza a dilatarsi: non ostante seguitando questa papilla o capezzolo nell'interno della radice, vedesi ch'egli trae la sua origine dal centro dell'albero; e la scorza da lui forzata a distendersi, invece di rompersi continua a ricuoprire la produzione legnosa della radice. Non mi dilungherò di più su di questi bottoni della radice; ma riservo un tal dettaglio all'articolo dei talli o marze (*), ove farò anche vedere che le radici provviste sono di germi atti a produrre dei rami, e che si è questa proprietà appunto quella che fa, che le radici orizzontali o striscianti, producono, in molte specie d'alberi, dei polloni o germogli. (Vedi a Fig. 2.) Vi sono per verità alcuni alberi più disposti degli altri a produrre dei germogli;

Fig. 2.

(*) Ved. Lib. IV. Art. delle Marze o dei Talli.

gli; e generalmente gli alberi allevati dai talli, dalle Marze, e dai germogli allignati, ne producono più di quelli che son venuti dai semi.

Le biforcazioni delle radici si distendono a un tal punto, che le divisioni estreme diventano talmente delicate, che bisogna star molto attenti per distinguerle nelle molecole terrose, ove esse s'insinuano. Io credo che queste piccole radici sieno tanti fuciatoi destinati a trombare il necessario alimento alle piante; e che le grosse radici facciano principalmente l'offizio dei tubi che lo trasmettono al tronco. Volendo conoscere il Signor Bonnet se le radici attraggano il nutrimento principalmente dalle estremità, ha messo nell'acqua la radice dei giovani marroni d'India: alcuni non avevano che la cima delle radici tuffata nell'acqua; in altri stava nell'acqua la media porzione di quelle: e non ha con tutto ciò potuto scorgere che queste circostanze influir potessero sul vigor delle piante. Io desidero, come lo desidera anche M. Bonnet, che questa esperienza sia tentata con altre precauzioni, e su delle radici meglio formate di quelle del marrone d'India. Poichè ho osservato, che gli Olmi piantati a viali lungo le terre da semina, spassano la terra, principalmente là dove terminano le radici; di modo che il grano non nasce mai vicino agli alberi giovani, e trovasi più bello al piede degli alberi grandi, di quello trovisi alla distanza di 4 in 5 pertiche.

Facendo sbarbare degli alberi dopo un rigido inverno, ho alle volte osservato che quasi tutte le piccole radici chiamate *capillose*, erano morte: ciò mi fa sospettare che gli alberi perdano in terra le loro radici capillari, presto a poco come essi perdono le foglie. Per verificare una tal congettura ho fatti sbarbare degli alberi in tutti i mesi dell'inverno; ed ho visto in fatti che dopo dei diacci alquanto forti, molte radici erano morte: e che quando l'aria era dolce, se ne sviluppavano delle nuove, che rimpiazzavano in gran copia le altre. Del resto non è ciò più sorprendente, che il vedere i tubercoli di molte piante, particolarmente del *Crocus*, perire con tutte le loro radici a misura che il tubercolo somministra il nutrimento ai nuovi che non hanno radici, e che ritraggono tutta la sostanza dal tubercolo che si estenua col somministrarla agli altri.

Gli animali che non son fermati in un luogo, possono andar da pertutto a cercar l'alimento. L'acqua arreca il nutrimento a molte conchiglie che stanno attaccate agli scogli ricoperti dal mare: ma siccome

come le piante non son dotate d'un moto progressivo, hanno ricevuto dalla natura qualche cosa d'equivalente, poichè le piante annuali quà e là spandendo i loro semi, si trasportano in quei luoghi ove la terra non è spoffata dei fughi a loro proprj. Alcune piante, come il Cocomero falvatico e la Belzamina, spandono in molta distanza la lor semenza, mediante la forza elastica delle loro frutta: altre piante, la di cui semenza è guarnita d'ali o di pennacchi, son trasportate dal vento per molta distanza; le Cipolle e le altre piante propaganti si rinnovano con delle produzioni, poste ora al di sotto, ora al di sopra, e talvolta accosto alla pianta che le produce: queste novelle produzioni si trovano in tal guisa situate in un nuovo terreno per esse. Finalmente gli alberi per via del rinnovellamento, e dello slungamento delle loro piccole radici, insensibilmente vanno a trovare un terreno non per anche spoffato.

Ho detto di sopra ch'io considerava le piccole radici come succiattoj, che attraggono dalla terra dei fughi nutritivi, i quali sono stati forse ivi preparati da una sorta di digestione; e quindi queste piccole radici vengono in una certa guisa a far l'offizio delle vene lattee, le quali negli animali stanno sparse sulla superficie degl'intestini, per raccogliervi il Chilo somministrato dai digeriti alimenti.

Le radici grosse non forse inutili per raccogliere anch'esse un poco di sugo nutritivo, servono certamente a trasmettere alle piante i fughi raccolti dalle piccole radici; e servono anche a mantenere il tronco in una positura perpendicolare al terreno, e difendono gli alberi acciò l'urto dei venti non gli rovesci.

Avverto che quando io dico che le radici sono provviste di succiattoj, non faccio altro che addurre un fatto. S'aspetta forse da me ch'io ne dia què delle prove; ma reputo meglio il non dir niente fu d'un punto ch'io non vedo chiaro abbastanza, anzi che far pompa di bei sistemi, atti a sedurre coloro solamente, che non si sono applicati a studiare con fondamento una tale questione. Oltre di chè, si vedranno anche delle prove della forza d'assorbimento che hanno le radici, qualora parleremo della forza che fa salire il sugo nelle piante.

Un'esperienza fatta dal Signor Hales servirà a provare che i vasi delle radici destinate a trasmettere il sugo a tutto l'albero, sono molto dilatati. Questo abile ed ingegnoso Fisico ha sostituito una cima

Tav. II. fig. 26. delle radici al ramo *b c* della Fig. 26 Tav. II, di modo che le divisioni delle radici erano nel tubo *g e f* pieno d'acqua; ed il tronco corrispondeva colla sua estremità al vaso *b* che era vuoto. Quando è stata trombata l'aria del recipiente, l'acqua, trapassando tutta la radice, è caduta con abbondanza nel vaso.

Quando si farà veduto in seguito, che tutti i rami d'un'istessa specie d'albero, e spesso d'un istesso genere, osservano un'ordine regolare ed uniforme nelle loro divisioni, si bramerà certamente di sapere se si potesse fare la medesima osservazione anche sulle radici degli alberi. Supposto, per esempio, che un'Acero sia piantato in una terra di densità uniforme, senza pietre, e che le sue radici non vengano mai danneggiate da veruno insetto, si domanda se in tal caso faranno le radici opposte due a due nel terreno, come lo sono i rami all'aria libera. Per rispondere a ciò, riporterò semplicemente le osservazioni che ho fatte sulle radici degli alberi.

1.^o Vi sono alcune specie d'alberi che nel medesimo terreno producono assai più radici capillose degli altri.

2.^o Ho più volte trovato sulle radici del Citiso Alpino certe specie di nodi, talvolta di una grossezza molto considerabile. Tal sorta di callosità vedesi sulle radici di quasi tutte le piante che fanno dei fiori leguminosi. Non è possibile ch'io possa dire, nè d'onde procedano, nè a qual funzione sieno destinati; mi ha parso solamente di conoscere che gli alberi non ne risentissero alcun discapito.

3.^o Vi sono certi alberi, l'Olmo, per esempio, che spandono assai lontano le loro radici; altri, come il Tiglio, si rinchiudono in brevissima terra. Le radici d'alcuni alberi hanno la disposizione di profundarsi in terra, ed altre serpeggiano.

4.^o Io credeva in principio che le ramificazioni delle radici mostrassero qualche cosa di regolare; ma non ho potuto confermarmi in tale credenza con delle continuate osservazioni. Le radici degli Aceri e dei Frassini non sono opposte come lo sono i rami loro.

Le osservazioni fatte dal Signor Bonnet sulle radici dei Mandorli, mi hanno tolto affatto il pregiudizio che aveva intorno a ciò; ma dirò, che quand'anche provato fosse che le radici degli alberi nel loro sviluppo non seguitino verun'ordine regolare, pare non ostante, che non accada lo stesso in tutte le piante. Ed infatti ha osservato il Bonnet, che dei fusti di fagioli tuffati per quattro giorni nell'

nell'acqua, vi avevano prodotte delle radici novelle d'un bellissimo color rosso, e simili a piccole spine; erano poste sopra 4 linee perfettamente parallele, ugualmente distanti tra loro; e conservavano la medesima positura, anche quando formavano delle spirali intorno ai fusti, come talvolta accadeva. (*Ved. la Fig. 6 della Tav. VI.*) Gl' intervalli compresi tralle radici d'una medesima fila, erano quasi sempre inuguali. Vedevasi quà e là, nella direzione delle radici, delle piccole fisure che indicavano il luogo d'onde spuntar dovevano delle nuove radici: ed infatti, le radici guardate colla lente parevano uscire da simili fisure. Essendo state ripetute le medesime esperienze sulle foglie di fagiuolo, si sono vedute delle radici spuntar dai gambi di quelle foglie, e svilupparfi coll'ordine medesimo.

Tav. VI. fig. 6.

ARTICOLO II. *Dei Rami.*

IL Tronco degli alberi si divide in alto in molte porzioni chiamati rami o fronde, le quali pure si dividono e si suddividono, come le radici, in molte altre. Sono le fronde composte, come il tronco, d'un' Epidermide, d'un involuppo cellulare, di strati corticali e di strati legnosi. I vasi dei rami sono come quelli del tronco, o linfatici, o proprj, o trachee, oppure una tessitura cellulare, che trovasi disposta nella medesima forma: insomma sarebbero i rami grossi veri tronchi, se abbasso guarniti fossero anch'essi di radici. Siccome non si potrebbe dir niente intorno alla di loro organizzazione, che non fosse una ripetizione di ciò che detto abbiamo del tronco, mi restringerò a far solamente osservare alcune particolarità relative alla di loro impiantazione, o positura, gli uni sopra degli altri.

Per formarfi un' idea dell' inserzione dei rami grossi sul tronco, non bisogna già credere che dei fascetti di fibre legnose quà e là si separino per formare due o tre rami, come se si separassero in due o tre parti i filamenti d'una mataffa di filo: questa sarebbe un'idea poco giusta, perchè i rami hanno un centro d'onde n'escono le produzioni midollari, e degli strati legnosi, i quali ricuoprendosi a vicenda, formano il corpo legnoso, che la scorza fascia precisamente, come ella ricuopre il tronco: insomma, non sono in verun conto i rami una parziale divisione del tronco, poichè ogni ramo è, in proporzione di grossezza, simile affatto al tronco medesimo che gli sostiene. Se si taglia un' albero diviso in due rami un piede più in su

Tav. VII. fig. 1. della biforcazione (Tav. VII. fig. 1.), il piano del taglio altro non rappresenta che il piano di due tronchi tagliati orizzontalmente: se poi si tagliano questi medesimi rami nella forca, accolto al tronco,

Fig. 2. si scorge un numero di strati legnosi (Tav. VII. Fig. 2.) concentrici all'asse dei detti rami, come si vedono nel primo taglio; ma gli strati legnosi di questi rami sono fasciati da altri strati, i quali circondandoli tutti due, formano un' involuppo comune agli strati legnosi che appartengono a ciascuno dei detti rami. Se si taglia anche dall'estremità del detto tronco dell'albero una fetta di 3 in 4 pollici di

Fig. 3. grossezza, vedesi come nella Fig. 3, che gli strati appartenenti a ciascun ramo sono allora in minor numero, ed all'incontro gli strati generali o comuni alli due rami, sono più numerosi; e quindi a misura che si ritaglia del legno dall'estremità del detto tronco d'albero, il numero dei detti strati particolari a ciascun ramo diminuisce, e quello delli strati comuni si aumenta, fintanto che gli strati propri a ciaschedun ramo sieno spariti; ed allora altro non vedesi che gli strati che formano il corpo del tronco, e di cui ho già parlato di sopra.

Da tutto ciò si comprende, che gli strati legnosi, propri ai rami
Tav. VI. fig. 4. (Tav. VI. fig. 4.) formano nel tronco un cono rovesciato (Fig. 5)
Fig. 5. la di cui punta è nell'interno dell'albero, e la base al livello della forca. La causa di questa disposizione comparirà chiarissima, allorchè discorrerò in appresso dell'accrescimento degli alberi, e dell'eruzione dei rami (*).

Siccome il tronco d'un'albero divide in molte grosse fronde, queste prime fronde dividonsi esse pure in altri rami più sottili; ed anche questi si dividono e si suddividono fino ai più minuti rami prodotti nell'ultimo anno. Tutti questi rami fanno gli uni riguardo agli altri, degli angoli più o meno aperti: ciò dipende o dalla specie dell'albero, o da molte cause, di cui avrò incontro di parlare.

La positura dei rami gli uni sopra degli altri merita uno special
Fig. 6. riflesso. Molti alberi, come i Peri, i Meli, ec. (Fig. 6.) hanno le fronde alternativamente poste le une sopra le altre; altri al contrario, come quelle dell'Oppio, del Frassino, ec. (Fig. 7.) le hanno opposte due a due; altri le hanno disposte a spirale; altre sono verti-

(*) Vedi al Lib. IV.

ticali. Siccome queste diverse posture dei rami sono simili a quelle dei bottoni, rimetto questo dettaglio all' Articolo in cui tratterò dei bottoni: basta di avere accennato, che queste diverse posture sono quasi sempre simili in un medesimo genere d'albero, e che elle ponno servire, se non a caratterizzarlo, almeno a farlo riconoscere.

I rami giovani son carichi di bottoni, d'onde spuntan le foglie, i fiori, e le frutta: meritano queste parti d'essere esaminate ciascuna separatamente: ma prima di terminar questo Articolo, credo di dover qui riportare i tentativi, che ho fatti per arrivare a conoscere la proporzione, che vi è tralla solidità del tronco e quella dei rami. Siccome il tronco d'un'albero si divide talvolta in 2, 3, 4, ed anche in 6 parti, mi sono proposto di conoscere se la somma della solidità di tutti questi rami sia uguale, superiore, o minore della solidità del tronco, che dà loro la nascita. All' Articolo dell'accrescimento degli Alberi (*), parlerò dello sviluppo dei rami paragonati tra loro. Questa si è una materia, che somministra delle cose molto degne di essere osservate: ed allora riporterò le osservazioni che ho fatte sopra di ciò.

**ARTICOLO III. *Della proporzione che vi è tralla
groschezza del Tronco degli Alberi e quella
dei Rami che ne derivano.***

EGGI è noto, che i cerchj sono tra di loro come il quadrato del loro diametro o della loro circonferenza. Partendomi da questo principio, ecco come ho operato: N.º 1. Ho misurata la circonferenza del tronco d'un Moro, ed ho trovato il suo quadrato di 462 linee quadrate. Partivano da questo tronco due soli rami, ed i quadrati delle loro circonferenze gli trovai, presi insieme, di 556 linee quadrate. E quindi la groschezza o il piano del tronco era alla somma di quella delli due rami, come 5 è a 6.

N.º 2. Ho misurata anche la circonferenza del tronco d'un Ciriegio: e la trovai di 246 linee, il quadrato delle quali è 60516. Partivano da questo tronco tre rami, delli quali pure ho misurata la circonferenza.

PARTE I.

F 3

II

(*) Vedi Lib. IV.

Il primo ramo lo trovai di 156.

Ed il quadrato di 24336.

Il secondo ramo come il primo di 156.

Per conseguenza il quadrato di 24336.

Il terzo ramo di 160.

Ed il quadrato di 25600.

E quindi la somma dei quadrati di tre

rami si è trovata di 74272.

Dunque il rapporto della grossezza del tronco era minore della somma delle grossezze delli tre rami, di quasi un quarto.

N.º 3. Ho misurata la circonferenza del tronco d'un Cotogno, Tav. VI. fig. 9. (Tav. VI. fig. 9.) che aveva sei rami, di cui pure ho misurate le circonferenze, come segue:

Tronco 29 pollici; il quadrato 121104 linee.

Primo Ramo 16 pollici 9 lin.	il quadrato 40401	} linee.
2. Ramo 14 pollici 6 lin.	il quadrato 30276	
3. Ramo 12 pollici;	il quadrato 20736	
4. Ramo 10 pollici;	il quadrato 14400	
5. Ramo 13 pollici;	il quadrato 24336	
6. Ramo 12 pollici;	il quadrato 20736	

Il totale dei quadrati delle circonferenze delli 6 rami essendo di 150885 linee quadrate, il rapporto della grossezza del tronco è alle grossezze dei rami, presso a poco, come 4 è a 5.

In tutti gli esempj che ho ora riportati, vedesi che la somma dei rami che si partono da un tronco, supera quella del tronco che gli porta, presso a poco nel rapporto di 5 a 4.

N.º 4. Per estendere anche più le mie cognizioni, ho voluto esaminare il rapporto dei rami del secondo ordine con quelli del primo ordine, e col tronco. Vedesi chiaramente, ch'io chiamo rami del primo ordine, quelli che partono immediatamente dal tronco; e rami del secondo ordine, quelli che partono dai di lui primi rami.

Ciò ben'inteso, il Moro, di cui ho parlato, n.º 1. aveva due rami del prim'ordine; e questi due rami ne avevano cinque del secondo ordine. I quadrati delle circonferenze di questi cinque rami essendo stati uguali a 549, il rapporto di questi 5 rami col tronco era come 100 è a 119; ed il rapporto di questi stessi cinque rami del secondo ordine con li due del primo ordine, come 100 è a 101.

Quin-

Quindi i rami del primo ordine guadagnano e sul tronco, e sui rami del secondo ordine. Vediamo se ciò regge in un'altro esempio.

N.° 5. Ho scelto un'albero, il di cui bassissimo fusto dividevasi in 6 rami, presso a poco come nella Fig. 9. ciascuno dei quali dividevasi in due rami, fuorchè uno, che dividevasi in tre. Quindi il tronco unico produceva 6 rami del prim'ordine, che davano nascita a 13 rami del secondo ordine. Tav. VI. fig. 9.

Il quadrato della circonferenza del tronco fu trovato di 125316 linee quadrate.

La somma dei quadrati delle circonferenze dei 6 rami del primo ordine, di 147694.

E quindi il rapporto del tronco con li 6 rami del primo ordine era come 50 è a 59, ed all'incirca come negli esempi precedenti. Ma la somma dei quadrati delle circonferenze dei 13 rami del secondo ordine non avendolo trovato che di 122481, ne viene che il rapporto del tronco con li 13 rami era presso a poco come 51 è a 50; ed il rapporto di questi 13 rami del secondo ordine alli 6 del primo, come 5 è a 6, o all'incirca. Dunque i tredici rami erano un poco minori, non solamente delli sei rami del primo ordine, ma anche del tronco; locchè presso a poco si accorda colla osservazione fatta sul Moro.

Deve parer cosa singolare, che i rami del primo ordine acquistano costantemente di valore sul tronco, e che nei due esempi poc' anzi citati, i rami del secondo ordine perdano sopra quelli del primo. Io credo, che la causa di questa stravaganza nasca perchè muore una quantità di piccoli ramicelli, e che ciò diminuisca tanto più la solidità di tal sorta di rami: poichè supposto che sia stato tagliato uno dei sei rami del primo ordine dell'albero N.° 5, egli è probabile, che gli altri avrebbero potuti diventar più vigorosi, e aumentarli un poco in grossezza; ma se questo aumento non fosse proporzionato al ramo tagliato, li cinque restanti rami si troverebbero uguali, o inferiori al tronco, il quale potrebbe anch'egli avere tratto qualche profitto dal taglio di questo sesto ramo.

Per tentar di conoscere questa verità, ho scelto per far questa esperienza un Noce giovane, disposto come nella Fig. 8.

Fig. 8.

Il quadrato della circonferenza del suo tronco misurato verso la parte bassa, fu trovato di 5625.

Il quadrato della circonferenza del suo tronco, misurato sotto dei primi rami, fu trovato di 2304.

Questa differenza di grossezza del tronco misurato verso la parte bassa, e verso la cima, diviene 1.^o perchè vi sono più strati legnosi abbasso degli alberi, che in cima. Quando parlerò dell'accrescimento degli alberi, ne dirò la ragione: 2.^o perchè, certamente, molti rami avevano perforata tutta la lunghezza di quel fusto, che era alto circa a cinque piedi e mezzo.

E quindi il rapporto del tronco, misurato verso la parte bassa, è al medesimo tronco misurato verso la cima, come 61 è a 25.

I quadrati dei cinque rami del primo ordine misurati vicino alla sommità principale, gli ho trovati di 3105.

Dunque il rapporto del tronco verso la cima, ai 5 rami del primo ordine, è come 20 è a 27; lo che combina con quanto si è detto di sopra.

Ho poi misurata la circonferenza di tutti i rami giovani, che partivano dai cinque primi, a un quarto di pollice incirca sopra della loro inserzione sui detti cinque primi rami. La somma dei quadrati di tutti questi rami fu trovata di 3237. Dunque il rapporto del tronco preso in cima, era alli ventuno piccioli rami, come 5 è a 7.

E quello dei detti ventun rami, ai 5 che partivanli dal tronco, era come 26 è a 25.





LIBRO SECONDO.

DELLE GEMME o BOTTONI, DEI FIORI,
E DEI FRUTTI.

INTRODUZIONE.

DORO di avere nel passato Libro esaminato il tronco e i rami degli Alberi, conviene ora parlare delle diverse parti, di cui sono provvisti i detti rami. E farà questo l'argomento del secondo e del terzo Libro. Tratterò nel secondo dei Bottoni da legno, delle foglie, dei peli, delle spine, e delle mani. Parlerò nel terzo degli organi della fruttificazione.

CAPITOLO PRIMO.

DEI BOTTONI DA LEGNO.

NEL periodo dell'estate formansi a poco a poco nell'ascella delle foglie, o nell'angolo che fanno i gambi o code delle foglie coi rami, certi piccioli corpi ordinariamente conoidali; i quali chiamansi *Bottoni*. Nell'inverno si veggono sui rami giovani; talvolta anche su i grossi, ma di rado sul tronco. Compariscono allora i bottoni sotto diverse forme, secondo i varj generi degli alberi su di cui essi sono. Sono attaccati ad un cortissimo picciuolo su d'una gonfiezza del ramo, somigliantissimo ad una mensola, e che nella precedente estate somministrava un'appiccio alla foglia, nella di cui ascella si è formato il bottone. Ne parleremo in appresso: quì di null'altro trattasi che dei bottoni.

Non

Non solo i bottoni di ciaschedun genere d'albero hanno delle forme particolari, ma molte volte i bottoni di ciascuna specie ne hanno una propria, la quale, bene osservata, serve di un gran vantaggio a distinguere le dette specie una dall'altra; e queste diverse forme di bottoni bastano ordinariamente ai Giardinieri, quando allevano gli alberi ne' semenzai, a far conoscere la maggior parte degli alberi che essi coltivano. Ora non mi è possibile d'entrare in uno più esteso dettaglio su di questa materia; m' accingo solamente a descrivere le differenze più massicce che presentano i bottoni degli alberi di diverso genere.

Il Signor Bonnet di Ginevra dispone in cinque classi la rispettiva disposizione dei bottoni su dei rami.

Ripone nella prima i bottoni alternativi, o *alterni*, come dicono Tav. VIII. fig. 1. i Botanici; come sono quelli del Nocciuolo. (Ved. Tav. VIII Fig. 1)

Nella seconda, i bottoni a paga incrociate: i Botanici gli chiamano *opposti*. Il Frassino può servir d'esempio. (Ved. Fig. 2)

Nella terza classe, i bottoni che si formano a una specie d'anelli d'intorno ai rami: I Botanici gli chiamano *Verticellati* ec. Il Bonnet Fig. 3. ne dà per esempio il Melo granato (Fig. 3). Per altro sopra quasi tutti i rami giovani di quest'albero, i bottoni sono solamente opposti.

I bottoni della quarta classe son quelli, che per la positura loro formano gli uni cogli altri delle quinconce, e tutti insieme una spirale molto allungata, e che scorre a guisa di cavastracci il giro dei rami, come si vede sui rami di molti alberi fruttiferi, e particolarmente Fig. 4. mente del Salsino (Fig. 4.)

Finalmente colloca il Bonnet nella quinta classe quegli alberi, le di cui foglie fanno attorno ai rami una doppia spirale, o una vite doppia, come vedesi sul Pino (Fig. 5.). Gli appiccichi delle foglie son quelli che segnano queste ellissi; imperciocchè i Pini non hanno punto i loro veri bottoni situati nell'ascelle delle loro foglie, ma solamente in cima ai rami.

Siccome io mi riservo a parlare nell'Articolo delle foglie, della positura loro alterna o opposta, differenza sensibilissima e propria a far distinguere certi generi d'alberi, in quei tempi in cui non hanno le parti della fruttificazione che debbono particolarmente servire a distinguerle, farò solamente osservar qui, che negli alberi che hanno le

le foglie opposte, i rami vanno il più delle volte a terminare in tre bottoni, che rappresentano una specie di giglio, col bottone di mezzo più grosso degli altri due; e che nella maggior parte degli alberi, i di cui bottoni sono alterni, i rami giovani vanno ordinariamente a terminare in un solo bottone. Poichè io valuto per niente quei piccoli bottoni abortiti, da cui altro non spunta che una o due foglie, e che il più delle volte neppure si aprono.

Si può anche osservare, che vi sono alcuni alberi, come il Lilac (Fig. 6.) i di cui bottoni si discostano talmente dai rami da cui essi nascono, che s'impiantano quasi perpendicolarmente sopra di loro: altri poi, come quelli dei Cornioli (Fig. 7.), sono in qualche maniera appiccicati per tutta la loro lunghezza sul ramo. Tav. VIII. fig. 6.
Fig. 7.

La Fufaggine dalle foglie larghe (Fig. 8.) presenta un'altra singolarità. I bottoni dell'estremità dei rami sono tutti attaccati accosto ai rami, come quelli del Corniolo, e i bottoni abbasso ne sono molto discosti. Fig. 8.

Oltre a ciò, vi sono dei bottoni angolati: quelli dell'estremità dei rami del Noce ordinario (Fig. 9.) ponno servir d'esempio. Altri lunghi e impuntiti; il Carpine (Fig. 10.). Altri corti e rotondi; la maggior parte dei bottoni del Noce già citato (Fig. 9.). Vi sono dei bottoni pelosi; il Viburno (Fig. 11.). Altri uniti e lisci; il Ciriogio (Fig. 12.) o resinosi, come il *Tacamahaca* (Fig. 13. e 16.) Alcuni son piccoli, come quelli della Quercia (Fig. 14.) o del *Catalpa* (Fig. 15.) Altri poi son molto grossi; come quelli del Marone d'India (Fig. 17.) ec. Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 9.
e 11.
Fig. 12.
Fig. 13, e 16.
Fig. 14.
e 15.
Fig. 17.

Non mi estenderò di più su di queste differenze; basta di averne accennate le principali, per indurre quelli, che avranno desiderio di conoscere gli alberi, ad avere attenzione alle diverse forme di bottoni: ed in tal guisa otterranno un'ajuto, che renderà loro molto facile il poter conoscere gli alberi nell'Inverno, in cui sono essi senza fiori e senza frutti, ed anche nudi di foglie.

Oltre alle differenze, che servono a distinguere i bottoni degli alberi di diverso genere, e talvolta di diverse specie, veggonsi ancora molte sorte di bottoni su dell'albero istesso: da alcuni, i quali sono ordinariamente impuntiti, ne escono dei rami; e da altri, che sono comunemente più grossi e più rotondi, ne spuntano i fiori. I primi vengon chiamati dai Giardinieri *Bottoni da legno* (Fig. 18.) e gli altri Fig. 18.

Tav. VIII. fig. 19. altri (Fig. 19.) *Bottoni da frutto*. Questi due bottoni rappresentati nella Figura son quelli del Pero.

Si ponno anche in molte specie d'alberi, come nei Peri, nei Meli, nei Nespoli, ec. distinguere due specie di bottoni da legno.

Se ne veggono in questi dei piccolissimi, da cui altro non spunta, che un mazzetto di foglie; ma questi bottoni sogliono col tempo diventar bottoni da frutto; e gli altri, che sono più grossi, producono dei rami.

Ciò, che adesso ho detto dei bottoni da frutto, spetta a quegli alberi, che fanno i fiori completi; cioè, ogni fiore dei quali racchiude tutti gli organi della fruttificazione; come il Pero, il Pesco, il Ciriegio, ec. Imperciocchè tra gli alberi, che producono dei fiori da stame, e dei fiori da pistillo, sopra diversi individui, o su d'un istesso individuo, in parti separate, bisogna distinguere due specie di bottoni da fiore, poichè in molte specie, i bottoni d'onde escono i castoni, sono molto diversi da quelli, da cui spuntano i frutti: per esempio, spunta dal grosso bottone posto in cima ai rami del Noce (Fig. 9.) un nuovo ramo; i frutti spuntano dai bottoni più piccolli, che sono per la lunghezza dei rami; ed i castoni escono da altri piccoli bottoncini, appena visibili, che sono situati accanto a quelli che producono i frutti.

Fig. 9. (Fig. 9.) un nuovo ramo; i frutti spuntano dai bottoni più piccolli, che sono per la lunghezza dei rami; ed i castoni escono da altri piccoli bottoncini, appena visibili, che sono situati accanto a quelli che producono i frutti.

Siccome una porzione di quanto mi resterebbe a dire su degli organi contenuti nei bottoni da legno ed in quelli da frutto, diventerebbe inintelligibile alla maggior parte dei lettori, che non hanno bastanti lumi preliminari sull'anatomia de' vegetabili, io non entrerò in tutti quei dettagli di tutto ciò, che vedesi nell'interno dei bottoni per mezzo della dissezione, e principalmente dei bottoni da frutto; mi contenterò solamente di dire, che i bottoni da legno, e quelli da fiore sono formati da certe squame scavate a guisa di cucchiari, le quali a vicenda ricuoprendosi, formano degl'involuppi capaci di difendere nelle stagioni d'inverno le parti interne, che tenerissime sono e delicate. Le squame esterne sogliono essere durissime, e guarnite tanto internamente, quanto sugli orli, di peli; l'esterno loro si rassomiglia il più delle volte alla scorza dei rami giovani. Le squame interne sono più sottili, più tenere, più succulenti; il colore inclina al verde; i loro peli sono morbidi e bianchicci; e quelle squame erbacee sono quasi sempre intonacate d'un'umor viscoso, che tenacemente le attacca insieme.

Pe-

Penetrando più indentro ai bottoni , si scuoprono dell'altre sottilissime foglie, di diverse figure, e che talvolta altro non sono, che semplici reticelle . Tutte queste parti disposte con molta arte , inviluppano l'embrione d'un ramo novello, oppur d'un fiore, che altrove descriverò . Qui è d'uopo soltanto il riflettere, che le squame esterne, quelle che sono interne, ed anche le fogliette, si appiccano sulle lamine interne della scorza, di cui sembra che quelle altro non sieno, che un prolungamento, e pare che i rami novelli o i fiori, si partano tralle fibre legnose e le corticali, o faccian capo nelle fibre legnose, e nella midolla dei piccioli rami che gli sostengono.

Vedraffi in seguito di quest'opera, che gli embrioni dei rami e dei fiori contenuti nei bottoni , si ponno conoscere in Autunno , e che queste diverse parti crescono anche nell'Inverno . Questa si è quella stagione, in cui pare, che si sospenda il moto del fugo, che le diverse parti de' fiori si fermino , per così dire , clandestinamente ; e che elleno si dispongano a comparire a Primavera: allora, che il movimento del fugo diventa più sensibile, si aprono i bottoni, cascano le squame esterne, le interne acquistano della estensione, e per qualche tempo si vedono accompagnare le novelle produzioni, che fanno del progresso ; ma da lì a poco queste interne squame si distaccano anch'esse come le esterne, oppure si seccano, e finalmente cascano.

Vi sono per altro certi altri bottoni anche più semplici di quelli fin qui descritti: pare che alcuni altro non abbiano, che degli esterni inviluppi ; ma non avendo io disegnato di descrivere i bottoni di tutti gli alberi di diversi generi, credo che quanto ora ho detto bastar possa a guidar quelli, che brameranno di farne un esame più preciso e più ampio.

Termino quest' Articolo col fare osservare , che le piante annuali non hanno nessun bottone: le piante solamente vivaci nelle loro radici, neppure hanno alcun bottone sul fusto, ma solamente sulle loro radici ; altra pianta non vi è se non quelle, che son vivaci nel fusto e nei rami, che ne sia provvista su di queste parti.

Si può, con il Grewio, come ho già detto parlando delle radici, considerar le Cipolle come una specie di bottoni. Il Mariotte ha benissimo osservato, che nel mese di Gennajo, si ponno vedere nell'interno delle Cipolle, per esempio in quelle del Tulipano, col soccorso d'una semplice lente, le sei foglie del fiore, il pistillo, che deve portare le semenze, e gli stami che l'accompagnano.

Posta

Posta in terra la Cipolla, spunta da una delle sue parti una nuova cipolla, la quale nel seguente mese d'Aprile non è più grossa d'una lente; e cresce poi nel tempo istesso del fiore. Esaminandola mentre ell'è ancor più piccola, si distinguono chiaramente i suoi involuppi; ma non si può scorgere veruna apparenza delle parti del fiore. Finalmente, quando il fiore è appassito, e quando le semenze son giunte alla loro maturità, la novella cipolla ha acquistata allora quasi tutta la sua grossezza; e verso i primi giorni di Giugno, cominciasi a scuoprire nell'interno qualche picciola foglia, che si stenta a conoscere anche col microscopio.

Ho creduto opportuno di riportar tutto questo per dare un'idea della maniera, con cui formansi a poco a poco nell'interno dei bottoni le parti che comparir devono a primavera. Mi estenderò di più su tale argomento, quando parlerò de' fiori.

Ci suggerisce il Mariotte un'altra bella esperienza sulle parti contenute nei bottoni: e siccome quì cade opportuna, io la riporto. Tagliò questo Fisico verso la fine del mese d'Agosto i rami d'un Rosajo, e tutte le sue foglie, e non gli lasciò se non i bottoni, che far dovevano le rose alla veggente primavera. S'aprirono i bottoni, produssero dei rami; ma non fecero alcun fiore. Ciò prova adunque, che i fiori non erano per anche formati nelli detti bottoni; che essi formavansi nell'Autunno, ed anche nell'Inverno; e che il troncamento delle rami e delle foglie essendo stato l'impedimento alla formazione dei fiori, i bottoni non hanno potuto produrre altro che rami.

C A P I T O L O II.

DELLE FOGLIE IN GENERALE.

SONO le foglie certe sottilissime produzioni; adornano queste principalmente i rami giovani; e col di loro colore, colla varietà delle forme, e colla loro molteplicità, formano il più durevole ornamento dell'albero. Molti fiori, egli è vero, dilettono colla vaghezza dei loro colori, e colla gentile loro forma, ma questi altro non sono, che fugace ornamento; quello però delle foglie degli alberi è più durevole, ed è anche più utile, perchè esse ci difendono dal Sol co-

cen-

cente dell'estate, e coll'ombra loro salubre ci permettono gli ameni passeggii. E le foglie d'alcuni alberi che durano tutto l'anno, possono anche servir di riparo agl' impetuosi venti dell' inverno. E seguendo a parlar dei vantaggi che le foglie arrecano, relativamente a certi oggetti stranieri agli alberi che le portano, si può anche aggiungere ch'esse servono di cibo a molti animali: e quanti insetti d'altro non vivono che delle foglie degli alberi? Gli scarafaggi, le cantaridi, i bruchi distruggono talvolta tutta la verzura degli alberi, ed i boscchetti più belli gli deformano come il più rigido inverno. I bachi da seta, che ci somministrano la materia dei nostri più pomposi vestiti, non si pascono se non delle foglie del Moro. In molte Provincie si brucano le foglie per nutrire i bestiami nell'inverno; si raccolgono quelle che calcano per farne letame, o per supplire alla carestia delle legne da scaldarsi; le foglie marcite formano un eccellente terricio. Finalmente i Medici impiegano molte volte e prescelgono le foglie a tutte l'altri parti dell'albero, perchè in certi casi le hanno conosciute per più attive ed efficaci.

Del resto poi, siccome questi usi sono stranieri agl'alberi, e che le foglie ne hanno dei particolari, immediatamente relativi alla vegetazione, io parlerò qui solamente di questo oggetto; ma devo prima di tutto dir qualche cosa delle varietà che si osservano nella loro forma e nella loro organizzazione.

ARTICOLO I. *Della posizione delle Foglie sui rami, e delle Stipule.*

SICCOME la positura delle foglie è simile a quella dei bottoni, mi basta di avvisare che quanto ho detto dei bottoni, può applicarsi alle foglie, e che anch'elleno sono, come questi, o opposte o verticillate, o alterne, o poste in ellissi semplici o doppie.

La maniera con cui esse s'attaccano sui rami presenta ancora delle osservabili varietà: le une, come il Noce (Fig. 20) hanno il Tav. VIII. fig. 20. gambo molto grosso nell'inserzione, oppure si slargano, e abbracciano quasi tutto il fusto, lochè è comune a tutte le umbellifere, come l'*Aralia* (Fig. 21). La parte inferiore delle foglie delle Graminacee forma un tubo in cui passa il fusto. Veggasi l'*Aruno* (Fig. 22) Fig. 21. Fig. 22. Quando pare che il ramo attraversi le foglie, si chiamano *perfoliate*: *Percyclimenum* (Fig. 23). Molte foglie si impiantano sopra di una pic- Fig. 23. cio.

- ciola gonfiezza del ramo , che è molto grossa nel Prugno della Regina Claudia , più piccola nel Pero , (*Ved. Fig. 24*) ed anche più piccola nel Ciriegio *Mabaleb* (*Fig. 25*). Ve ne sono finalmente di quelle , che sono accompagnate nella loro inferzione sul ramo da due piccole foglie chiamate *stipule*: queste stipule sono ovali , e molto grandi nel Tulipiero (*Fig. 26*), strette nel Pero , nel Ciriegio *Padus* (*Fig. 27*): esse formano un manichino , o un collare che circonda i rami del Platano (*Fig. 28*). Vi sono finalmente alcuni alberi che conservano le stipule fino al cader delle foglie , ed altri che le perdono molto prima .
- Fig. 29. La figura 29 rappresenta le stipule del Carpine: Quando per anche le foglie sono piccolissime , sono ricoperte da queste stipule , che poi s'aprono , ed allora appariscono le piccole foglie dell'albero .
- Fig. 30. figura 30 rappresenta le stipule del *Staphilodendron*; sono molto larghe e impuntite .

Il Lauro - Tulipiero ha le sue foglie involuppate da due stipule grandi , lunghe talvolta due pollici , queste cadono quando s'aprono le foglie . Le squame interne dei bottoni degl' Aceri (*Fig. 31*) s' allungano al contrario , sussistono molto tempo , e formano delle specie di stipule . Le foglie *conjugate* , che veggonsi nella detta Figura 30 (questo termine si spiegherà tra poco) , hanno anch' esse qualche volta delle stipule .

ARTICOLO II. Delle forma delle Foglie .

Vi sono alcune piante , che non fanno foglie , come , per esempio , sono i funghi : anche qualche arbusto ritrovasi che ne è senza , come l' *Ephedra* ; ma quasi tutti gli alberi , gli arborescelli , e gli arbusti ne sono provvisti .

Si ponno dividere le foglie in due Classi generali ; in semplici , ed in composte .

Le foglie semplici altro non sono che un' apriemento dei vasi del gambo : le foglie composte sono formate di molte foglie semplici , che si chiamano *Foliole* , o foglioline , le quali sono attaccate ad un gambo comune . Talvolta , oltre di questa coda o gambo comune , ha ciascheduna foglia un gambo suo proprio . Ora incomincio a dettagliare le differenze che si vedono tralle foglie semplici , e poi parlerò delle foglie composte .

A R -

ARTICOLO III. Delle Foglie semplici.

VI sono alcune foglie, come quelle del *Chenopodium vermiculare*, le quali sono grosse e succulenti: si chiamano *foglie grasse*: altre sono unite e secche, come quelle del Buffo, del Lauro. Altre foglie sono scanalate per di sopra da alcuni folchi assai fondi, e rilevate per difotto da grossi spigoli, o costole, come sono le foglie della Salvia: alcune sono lisce, e lucide, come quelle del lauro Ciriegio; altre sono ruvide al tatto, e d'un verde smorto, come quelle del Fico, e dell' Olmo. Alcune foglie son vellutate, come quelle del *Phlomis*: alcune son fisse come la carta pecora, come quelle del Platano; altre morbide come nel *Catalpa*. Le foglie d'alcuni alberi sono d'un verde gajo: per esempio quelle del Frassino; altre sono d'un verde carico; l' Ontano, il Tasso; o d'un verde scuro, come quelle del Cipresso; o d'un verde argenteo, come nel Salcio, nell' *Elaeagnus*, nel *Rhamnoides*: il verde d' alcune foglie inclina al turchino, come quelle dell' *Orbonna*: alcun' altre vengono in autunno d'un bellissimo rosso. La Vite vergine, l' Acero del Canada, ec.

Il difotto delle foglie è quasi sempre d'un color diverso dal disopra: ciò specialmente risalta moltissimo nelle foglie dell' Olmo, le quali sono per di sotto bianche come la carta, e per di sopra d'un verde così carico, che s'avvicina al nero. Quasi sempre il di sotto delle foglie è più pelofo del di sopra. Finalmente vi sono alcune foglie che sono taccate, o di bianco, o di giallo, o di rosso; come appunto sono molte specie di Tassi, e di Salvie.

Varia è la forma delle foglie quanto è vario il colore; ma si ponno in generale dividere in due classi; cioè quelle che sono intiere, e quelle che sono intagliate. Tralle foglie intiere, ve ne sono alcune tanto piccole, che si potrebbe quasi dire che elle fanno una parte del ramo che le porta, come vedesi in quelle di Cipresso; altre sono molto strette, ma più lunghe, e terminano in una punta, come quelle del Ginepro (Fig. 32). Quelle del Tasso (Fig. 33) sebbene sic-Tav. VIII. fig. 32. no quasi della istessa figura, non sono pungenti: quelle dei Pini (Fig. 34) sono talmente strette, relativamente alla loro lunghezza, Fig. 34. che si chiamano *filamentose*. Altre foglie si chiamano *Gramineae*; queste sono molto lunghe, molto strette; terminano in una punta, e

PARTE I.

G

pren-

prendono l'origine dai nodi, e formano nel nascere una guaina che
Tav. VIII. fig. 35. fodera il fusto: Veggasi *Arundo* (Fig. 35.)

Le foglie, che si chiamano *Foglie bislunghe*, sono quelle che hanno tre volte e mezzo, o quattro volte più di lunghezza che di larghezza, tali sono quelle del Mandorlo (Fig. 36).

Fig. 37. La *Foglie ovali*, per esempio, come quelle del Melo (Fig. 37) hanno un quarto, un terzo, una metà, o una volta più di lunghezza che di larghezza. Fra queste foglie ovali, alcune terminano in una punta ottusa; oppure terminano senza punta, come quelle dell'

Fig. 38. *Amelanchier* (Fig. 38). Altre finiscono in una lunghissima punta, come nel *Plaqueminer* (Fig. 39). Si ponno chiamare *foglie Ovoidali* quelle, il di cui piccolo diametro dell'ovale non è in mezzo della foglia; in tal caso, se lo slargamento è dalla parte dell'estremità della foglia, come nello Scotano o Cotino (Fig. 40), noi le chiamiamo foglie a paletta. Se al contrario lo slargamento è dalla parte

Fig. 40. del gambo (come nella Fig. 41), noi le chiamiamo *foglie di Mirto*.

Fig. 41. Molte foglie sono quasi tonde, come nel Siliquaastro volgare (Fig. 42) altre rotonde terminano in una punta molto lunga, come nel Albicocco (Fig. 43).

Alle volte i gambi delle foglie si impiantano molto avanti sul nervo del mezzo, e son simili ad un cuore; si chiamano *Cordiformi*: le foglie del Tiglio selvatico, molto si accostano alle volte a questa forma (Fig. 44). Quando il gambo s'impianta nella foglia medesima, e non sull'orlo, si chiama *umbilicata*; tali sono quelle del *Me-*

Tav. IX. fig. 44. *lispernum* (Fig. 45). Alcune specie di Pioppi neri portano delle *foglie triangolari* (Fig. 46). Se, oltre a questa figura, vanno esse a terminare in una lunga punta, allora chiamansi *sagittate*: quelle del

Fig. 45. *Lilac* (Fig. 47.) s'accostano a questa forma.

Tra queste *foglie intiere*, alcune hanno gli orli affatto uniti, come nelle figure 39, 40, 41, 42, ec. Altre son guarnite nella loro estremità di qualche dentatura, e si chiamano *merlate* o *dentate*;

Fig. 48. per esempio, quelle dello *Spiraea* dalle foglie dentate (Fig. 48). Ve n'ha alcune, che hanno una sola dentatura, come l'*Emerus* (Fig. 49).

Ve ne sono di quelle, che hanno sugli orli solamente qualche dentatura molto distante l'una dall'altra, come il Lauro-Ciriegio, (Fig. 50).

Le dentature d'alcune foglie sono talvolta meno distanti, come nel

Fig. 51, e 52. Faggio (Fig. 51), o molto impuntite, come nel Carpino (Fig. 52),

o un

o un poco rotonde, come quelle del Melo (Fig. 53), o anche più Tav. IX. fig. 53.
 tonde, come quelle del Moro dalle foglie larghe (Fig. 54). Tut- Fig. 54.
 te queste foglie sono più o meno finamente dentate. Altre hanno i
 denti talmente rotondi che essi formano delle crespe o gheroni. Ved.
 il Tremulo (Fig. 55.) Fig. 55.

Veggonsi alcune foglie con le dentature affai grandi, sopra le qua-
 li, o anche tralle quali vi sono altri piccoli denti; tali sono quelle
 dell' Olmo dalle foglie larghe (Fig. 56), del gran Visciole di Bosco Fig. 56.
 (Fig. 57), del Pioppo bianco (Fig. 58). Si possono chiamare *foglie* Fig. 57. e 58.
dentate a doppio o sopraddentate: quelle di questa specie cominciano
 ad uscire dalla classe delle foglie dentate, per entrar nella classe del-
 le foglie intagliate. Debbo fare osservare che queste dentature vanno
 qualche volta a finire in un filetto, come può vederfi nelle foglie
 del Moro (Fig. 54). Alle volte la dentatura è anche molto pun- Fig. 54.
 gente, come in qualche specie di Elce (Fig. 59). Lo Smilace (Fig. 60) Fig. 59. e 60.
 quello, che chiamasi *Riccione*, ha la superficie delle foglie armata di
 punte (Fig. 61). Potrebbe dirsi che le foglie del *Lauro-Jambon* so- Fig. 61.
 no *reticolate* all' intorno. Del resto, le merlature, le crespe, i denti
 semplici e i doppi somministrano delle varietà senza numero, nella
 enumerazione delle quali io non posso entrare; mi basta d' averne da-
 ta una sufficiente idea, per fissare l' attenzione di quelli che esamina-
 no più diligentemente e minutamente le foglie degli alberi.

Quando le dentature, di cui ho adesso parlato, divengono più con-
 siderabili, cessano allora le foglie d' essere reputate intiere, e chiamansi
ondeggiate o intagliate, o incavate, o laciniate.

Così adunque una foglia ovale, come la segna la linea punteggiata
 della Fig. 62, ma il di cui contorno è formato da crespe roton- Fig. 62.
 de, grandi ed ineguali, di modo che la parte che sporge in fuori
 corrisponda alle costole o nervi principali, e che la parte che va in
 dentro formata sia tralle dette costole, o nervi, da altre che sieno
 manco estese; allora si formerà l' idea d' una foglia di Quercia, e
 questa foglia chiamerassi *ondeggiata*: se in vece di queste onde, le
 foglie faranno quasi tonde o ovali, e che le parti sporgenti in fuori,
 e quelle in dentro saranno impuntite ed angolate, allora si denomine-
 ranno intagliate, purchè per altro le parti in fuori non sieno molto con-
 siderabili. Le foglie del *Crataegus folio serrato* (Fig. 63) ponno fer- Fig. 63.
 vir d' esempio. Se queste foglie intagliate hanno le parti che sporgo-

- no più in fuori, si chiamano *incavate*, come quelle del *Crategus folio laciniato* (Fig. 64), e *laciniate* quando sporgano anche di più; tali sono quelle della Vite, detta la *Cioutat* (Fig. 65) ed anche di più quelle dell' *Abrotanum*. Finalmente le foglie sono o semplicemente *incavate*, o *intagliate*, come quelle dell' Acero di Montpellier (Fig. 66); o doppiamente *intagliate*, o *dentate*, come nell' Acero dalle foglie di Platano (Fig. 67); e tanto nell' uno che nell' altro caso ve ne sono di quelle cogli orli dentati; cioè, l' Acero di Virginia (Fig. 68, e 69) o senza dentatura, come nell' Acero di Candia (Fig. 69) e in quello di Montpellier (Fig. 66): ma se questi intagli sono molto profondi e quasi arrivino al nervo di mezzo, o anche fino al gambo, allora queste faranno foglie composte: ora ne parleremo.

ARTICOLO IV. *Delle Foglie composte.*

- IMMAGINANDOSI una foglia grande rotonda, i di cui nervi si spandano a guisa di ventaglio, e supponendola intagliata fino alla coda o gambo in più parti, ed in tal guisa, che ogni costola o nervo occupi il mezzo di ciascuno dei detti intagli, questa allora sarà una foglia composta di 3 di 5, o di 6 foglioline, disposte a guisa di una mano aperta, che chiamasi *palmata*; per esempio il Citiso (Fig. 70) la di cui foglia è fatta a fiori di carte da gioco; il *Vitex* (Fig. 71) il quale ha cinque foglioline non dentate, il Marrone d' India (Fig. 72), che ne ha sei dentate.

- Se in vece di prendere una foglia rotonda, se ne scelga una bislunga o ovale, e che s' intagli fino al nervo di mezzo, in guisa che i nervetti laterali occupino il mezzo della fogliolina, allora avrassi una foglia *conjugata* o *pennata* (Fig. 73.)

Bisogna per altro osservare, che spesso volte due foglioline conservano questa figura in una parte della loro estensione, e che non sono separate senon in punta; di modo che ciò che far doveva due foglioline separate, non ne fa senon una. In tal caso questa unione comincia quasi sempre dal pedicelo, e questo è ciò che le fa conoscere per doppie.

- Offerverò ancora in proposito delle foglie composte, 1.º che o sieno esse *conjugate* o *palmate*, quasi tutte le osservazioni che ho fatte sulle foglie semplici, hanno la loro applicazione alle foglioline. Ve ne sono dell' unite, come nel Noce (Fig. 73.) nel *Vitex* (Fig. 71); del-

delle dentate, come nel Marrone d'India (Fig. 72), nel Sorbo (Tav. IX. fig. 72. Fig. 74); delle intagliate, come nell'Acerò dalle foglie di Frassino (Fig. 75); delle rotonde, dell'ovali, come nell'*Amorpha* (Fig. 76); Fig. 75. e 76. dell'imputante, come nel Sorbo, nel Somacco ec.

2.° Che il numero delle foglioline è vario: molte foglie non ne hanno che cinque, ed alcune ne hanno più di diciannove, il qual numero varia anche talvolta sullo stesso albero. Il *Rovo d'Ida*, ne ha alle volte tre, ed alle volte cinque.

3.° Le Fogliole delle foglie *conjugate* sono il più delle volte opposte sulle costole che le portano; per esempio, l'*Amorpha* (Fig. 76); Fig. 76. il Noce (Fig. 73): talvolta elleno sono alterne, come nel *Bonduc* (Fig. 77). Fig. 73. Fig. 77.

La posizione delle foglioline non corrisponde sempre a quella delle foglie. Le foglie del Frassino sono opposte, e le sue foglioline sono alterne. Le foglie del Marrone d'India sono opposte, le sue foliole sono palmate. Le foglie della *Falsa-Acacia* sono alterne, e le sue foliole sono opposte.

4.° Molte volte il numero delle foliole è dispari, perchè una ve n'ha, che termina la costola o nervo comune a tutte le foliole: veg- Fig. 73. gasi il Noce (Fig. 73). In alcuni generi manca questa foliola dis- Fig. 78. pare, ed allora tutte le altre rimangono pari, come nel Lentischio (Fig. 78). Talvolta anche l'istessa costola, in vece di essere termi- Fig. 79. nata da una foliola, finisce in punta aguzza, come la Barba di volpe (Fig. 79).

5.° Vi sono alcune foglie, le di cui foliole hanno tutte una ugua- Fig. 80. le grandezza, come nel *Barba Jovis* (Fig. 80), e vi sono altre so- glie, che hanno le foliole d'una grandezza molto inuguale, come quelle del Noce (Fig. 73).

6.° Vi sono alcune foglie, che chiamar si potrebbero *doppiamente* *conjugate*, perchè dal loro nervetto principale partono altre costole più picciole, che hanno delle foliole; tali appunto son quelle del *Bonduc* (Fig. 77). *Azeradach* (Fig. 81). Fig. 77. e 81.

7.° Vi sono finalmente alcune foliole, che stanno immediatamente attaccate al nervetto comune; ed altre hanno dei pediculi loro particolari.

Quanto ho fin qui detto prova certamente molte varietà: diamo- ne qualche esempio.

1.° Veggonsi nelle foglie del Noce da tre fino alle 15 foliole; quest'ultimo numero spesso si trova nelle foglie dei Noci neri giovani di Virginia. Le foglie della cima dei rami, hanno quasi sempre meno foliole delle altre.

2.° La foliola, che termina la foglia del Noce, è fatta ordinariamente in figura di paletta, ed è più grande dell'altre: se ne trovano per altro delle più piccole, e che sono quasi rotonde.

3.° Trovanfi anche talvolta sui Noci delle foliole di figura molto inuguale, attaccate al pedicelo, o al filetto comune, non solamente con il loro pedicelo particolare, ma anche con una porzione dell'aprimiento della foliola.

4.° Si è alle volte veduta l'estremità d'una foglia terminata da due foliole.

5.° Trovanfi spesso nel *Framboise* delle foliole unite insieme: dice il Signor Bonnet d'aver veduta una foglia del detto arbusto, le di cui foliole erano tutte unite, e il di cui comune pedicelo era spianato.

6.° Le foliole del Noce sono ordinariamente tanto più grandi quanto più s'avvicinano all'estremità della foglia. Vedesi per altro molte volte il contrario.

Si ponno bensì osservare dell'altre varietà, principalmente sul *Lilac* di Persia, e sul *Gelsomino* bianco; ma egli è inutile di più trattenerfi su questi capricci della Natura, la maggior parte de' quali si vedranno nell'Articolo ove tratteremo delle mostruosità delle piante, e dove sarò vedere, che una parte di queste mostruosità proviene dagli innesti, che si fanno naturalmente entro i bottoni.

Per terminare quanto spetta alle foglie *pennate*, devo far osservare, che vi sono alcuni alberi, come farebbe il *Paliurus*, i quali hanno delle piccole foglie situate ai due lati dei rami sottilissimi, di modo che esse si rassomigliano molto alle foglie pennate o conjugate, come sono quelle del *Giuggiolo*; ma facile sarà il distinguerle, quando si faccia attenzione, che alloraquando le foglie del *Paliurus* cadono in Autunno, i rami sottili, che le portavano, sussistono; ed al contrario il filetto comune, che porta le foliole delle foglie composte, cade contemporaneamente, o quasi nel medesimo tempo, che quelle. Questa è una regola, che può essere considerata come generale, sebbene m'abbia parso talvolta, che i nervi che sostengono le foliole del *Giuggiolo*, si convertano in rami: questo fatto ben confon-

frontato formerebbe una eccezione. Sarà anche facile il distinguere le foliole dalle foglie, perchè non trovasi bottone alcuno nell'Ascel-la delle foliole, ma trovasene bensì in quell'angolo, che fanno le folie coi rami.

ARTICOLO V. *Che la distribuzione de' Vasi influisce
su la forma delle Foglie.*

QUALORA abbiassi prestata attenzione a quanto poc' anzi fu detto intorno alle foglie *intagliate* ed alle foglie *composte*, ben vedrassi che i nervi, tanto delle foglie, che delle foglioline o foliole, meritano un particolare riflesso. Ed infatti, 1.^o Quando le foglie o foliole sono rotonde, o sieno elleno intiere o intagliate, vi si scorgono molti nervi grossi, i quali, allo uscir della coda o del gambo, si spandono a guisa di ventaglio. 2.^o Nelle foglie ovali ed intiere, spesso succede, che dalla coda partonsi tre nervi o costole principali, che quasi si stendono fino alla punta della foglia, come vedesi in quella del Giuggiolo (Fig. 82). Questi nervetti sono talvolta in maggior numero, come nel Corniolo (Fig. 83). 3.^o Nelle foglie ovali i principali nervetti si staccano a dritta e a sinistra dal nervo di mezzo, ed i più grandi si slargano nella parte della foglia, che ha maggiore estensione. 4.^o Quando le foglie son lunghe, il più delle volte non vi si scorge, che un solo nervetto, che le divide in due; o pure guardandovi da presso, vedesi che dal nervo di mezzo si partono altri nervetti laterali assai sottili, che a dritta e a sinistra si spandono. 5.^o Scorgeasi ancora sulle foglie ovali, che i nervetti dividonsi nella loro estremità, e che queste divisioni s'incurvano secondo le diverse centinature, o contorni delle foglie, (Vedi la Tav. VIII. fig. 37.) ma per altro le principali divisioni fanno sempre capo nelle principali dentature o negl'intagli più grandi. In molte foglie questi nervi eccedono la foglia, ed allora formano una specie di spina (Tav. IX. Fig. 54.).

Io non parlerò adesso nè dei sapori, nè degli odori di certe foglie, quantunque tali circostanze possano in certi casi servir d'aiuto per conoscere gli alberi. Mi riservo anche a parlare in altro incontro delle foglie femminali, come pure d'alcune specie di foglie, che accompagnano i fiori, come nel Corniolo maschio; o le semenze, come nel Tiglio, e nel Carpine: queste materie avranno altrove il loro

posto. Intanto sebbene abbia io stabilito di restringermi in ciò, che spetta agli alberi ed agli arbusti, per non ampliare i dettagli, in cui avrei dovuto necessariamente entrare, se estesero avessi le mie viste sopra tutti i vegetabili; altro non ho fatto, che sfiorare l'oggetto mio, perchè null'altro mi son proposto, che di far conoscere i punti particolarmente distintivi, che fissar debbono l'attenzione di quelli, che bramano di conoscere gli alberi: poichè se le particolari forme di ciascheduna foglia somministrar non possono dei caratteri esatti abbastanza per stabilire i generi, sono elleno necessarie almeno per la distinzione delle specie. Ma un'esame più preciso e più dettagliato delle differenze, che riconoscere si ponno tralle foglie di diversi alberi, noioso troppo e straniero sarebbe all'oggetto di quest'Opera; tanto più, che essendo essa diretta e consacrata a Leggitori intelligenti, e capaci di riflessione, io credo, che basti d'aver loro accennate le differenze essenziali; e quindi potranno essi agevolmente supplire al di più. Passo dunque all'esame Anatomico delle foglie; e farò ogni sforzo di non rendermi noioso con troppo lunghi dettagli.

ARTICOLO VI. *Anatomia delle Foglie.*

DISSECCANDO le foglie, vedesi ch'elleno sono coperte d'un'epidermide, e che formate sono da molti vasi linfatici, e da molta tessitura cellulare: vi si scorgono delle trachee, e la presenza dei vasi proprj si manifesta dall'odore dal sapore e spesso dal colore dei sughi ch'esse contengono.

Può dunque dirsi, che le foglie formate sieno delle medesime parti organiche, di cui son formati i rami, ma con diversa disposizione. Per esporla con ordine, riporterò 1.º le osservazioni da me fatte sulle foglie, allorchè chiuse stanno entro i bottoni, ed allorchè si dispiegano: v'inferirò molte cose, che ho tralasciate nell'Articolo dei bottoni: 2.º esaminerò il punto in cui la foglia s'attacca all'albero: 3.º dirò qualche cosa delle code o gambi, o pedicoli, che sostengono le foglie. 4.º Finalmente parlerò della foglia, considerata nel suo stato di perfezione.

ARTICOLO VII. *Delle Foglie rinchiusse nel bottone.*

Ho detto, che levando le squame o le fogliette o lamine del bottone, scuopresi un picciolo ramicello, carico di corpicciuoli, che sem-
bra-

brano tante foglie, tralle quali spesso scuopransi dei filetti, come vedesi nella *Tav. XI. fig. 85 e 86*. Questa operazione della Natura deve esser posta in dettaglio sotto gli occhi del Lettore; e a tale oggetto riporterò adesso le osservazioni, che ho fatte sullo sviluppo dei bottoni del Marrone d'India, e del Pesco. Tav. XI. fig. 85. e 86.

La Figura 87 rappresenta l'estremità d'un ramo giovane di Marrone d'India terminata da un bottone: ella fa vedere la disposizione degl'inviluppi, e lo stato in cui egli sono nell'inverno. Vedonsi sotto al detto bottone certe specie di grinze, e più di sotto alcuni punti, che indicano le fibre legnose, le quali si distribuivano nella foglia, che era stata in quel luogo; di queste ne parleremo in appresso. Vedesi molte volte sopra di detti punti un bottoncino: simili bottoni trovansi pure sotto gl'inviluppi squamosi del bottone principale; e da questi bottoncini altro ordinariamente non esce, che piccole foglie, o uno storto ramicello, che presto perisce. Fig. 87.

La Figura 88 è un taglio del medesimo ramo, secondo la sua lunghezza; vi si scorge pure la forma degl'inviluppi squamosi, e nel centro, il germe d'un ramicello con la midolla *a*, la quale è bianca, fuorchè verso la parte vicina al bottone ove ella diventa rossa: *bb* il legno, *cc* la scorza, d'onde partono gl'inviluppi squamosi del bottone: questa scorza tanto più diventa sottile, quanto è maggiore il numero degl'inviluppi, che da quella distaccansi: io credo per altro, che qualche interna laminetta si stenda in sul novello ramo. Fig. 88.

La Figura 89 rappresenta lo stesso ramo spoglio della sua scorza. Veggonsi verso *a* delle aperture, per cui escono delle produzioni midollari; verso *b* come va a terminare il corpo legnoso; verso *c* il punto d'unione del ramo giovane col corpo legnoso. Fig. 89.

La Figura 84 rappresenta una fetta, o un quarto d'un bottone; e per far meglio comprendere come gl'inviluppi squamosi si partono dalla scorza, ha bisognato discostarsi un poco dalla Natura, ad oggetto di schivare la confusione; e per ciò si è fatto lo spazio, dai *a* fino al *b*, molto più grande del naturale. Fig. 84.

La Figura 85 rappresenta l'interno d'un bottone da legno, un poco sviluppato: si è procurato di far vedere, ch'ei contiene un gran numero di foglie, le quali vanno sempre più diventando picciole; sono elleno spiegate e appoggiate le une sopra dell'altre; ed il tutto è coperto da molti peletti. Fig. 85.

La

Tav. XI. 6g. 86.

La Figura 86 fa vedere il di dentro del bottone da fiore; vi si scorge il grumulo del fiore, che è coperto da molte foglie: tutte queste parti sono anch'esse coperte da molti peli. La struttura dei bottoni da fiore sarà esposta e descritta più minutamente nel Libro seguente.

Fig. 90. La Figura 90 rappresenta un ramo di Marrone d'India, nella di cui estremità evvi un bottone aperto.

Vi si scorgono gl'inviluppi *a* del bottone fatti a guisa di cucchiari; gl'inviluppi esterni sono bruni, e gl'interni, che sono più sottili dei primi, sono verdi; questi qui crescono un poco, a misura che il novello ramo si spande; ambedue per altro cadono di poi.

Sono gl'inviluppi esteriormente e interiormente intonacati d'una gomma o viscosità; gl'interni sono per di dentro pelosi.

Vedesi uscir dal detto bottone il fusto *b* accompagnato da due foglie *c* *d*, il tutto ricoperto da una peluria folta e bianchiccia; slargando il grumulo o il cesto di mezzo, vedesi nell'asse il fusto *b*, da cui partonsi molte foglie mirabilmente piegate sopra loro stesse, ed accomodate l'una accosto all'altra: il tutto è vestito d'una peluria folta, che nuoce alla dissezione, quantunque la detta peluria facilmente si levi.

Questo ramo aveva due bottoni, che furono tagliati: *e* dinota il luogo ov'era uno dei detti bottoni.

Nel taglio obliquo *f* della estremità inferiore vedesi nel centro la midolla, poi una Zona o fascia di legno, poi una Zona di scorza.

Fig. 91. La Figura 91 rappresenta il detto ramo tagliato per lo lungo, ed un poco più grosso del naturale, per render le parti più sensibili. Si è tolto tutti gl'inviluppi squamosi del bottone, e la peluria. Vedesi in *a* *b* ciò che ha prodotto dopo la primavera il fusto novello; *c* *d* le due foglie laterali; *e* l'estremità d'una foglia tagliata, la di cui inserzione è per di dietro. Tutto ciò che si vede dall'*a* fino all'*f* è stato prodotto l'anno precedente, *b* *b* rappresenta il taglio della scorza, *g* *g* il taglio del legno, *f* il taglio della midolla. La midolla è bianca, e comparisce secca da *f* fino a *l*; da *l* fino a *i* ell'è verdognola; ell'è bruna o rossa verso *i*; e da *a* fino all'estremità ell'è verde e succulenta. Vedesi in *m* *m*, che la midolla si prolunga nei rami; e tra *i* ed *a* scorgonsi delle produzioni midollari, che traversano la sostanza legnosa, che forma un tubo continuo da *f* fino

fino in *a*; questo tubo è forato in *m m*, dove pare, che sieno uniti insieme due altri tubi corrispondenti a due rami giovani, che sono stati tagliati. Tutto ciò che vedesi di legno da *g* fino in *a* è il legno dell'anno precedente; e questo legno antico è fasciato d'uno strato erbaceo, sottilissimo, appena visibile, il quale per altro diventerà legno col tempo: anche questo strato erbaceo è ricoperto dalla scorza, di modo che la maggior parte di questo nuovo polloncino è formata di sostanza midollare. In quanto allo strato erbaceo del nuovo pollone, pare ch'egli sia una prolungazione delle fibre dello strato legnoso, che stà attualmente formandosi sul legno antico, e che lo ricuopre. Lo strato corticale sembra essere un prolungamento delle lamine interne della scorza, i di cui strati esterni vanno a terminare agl'involuppi del bottone. In quanto alla midolla, sebbene quella del pollone continui con quella del ramo, questa è bianca e secca, e quella del pollone è verde e succulenta.

La Figura 92 rappresenta un pezzo del picciolo sulto presso tra *a* ed *e*; si è solamente aumentata la grossezza dello strato erbaceo e del corticale, per renderli più visibili. Tav. XI. fig. 92.

Nel mese di febbrajo ho esaminato un bottone da legno d'un Pesco. Dopo aver levato tutti gl'involuppi squamosi fatti a guisa di cucchiaro, ho veduto un mazzo di filetti stretti, di color verde, situati e disposti a un di presso, come vedesi nella *Figura 93*. Dopo di aver staccati alcuni dei detti filetti, gli ho osservati col microscopio, che mi fece vedere (*Fig. 94.*) ch'essi erano dentati negli orli, e armati di peli; mi parve anche di vedere, che fossero piegati in due. Staccai quindi tutti i detti filetti, per potere esaminare col microscopio, un picciolo corpo ch'io vedea nel centro. Mi parve (*Fig. 95.*) composto di due picciole foglie piegate e dentate negli orli; ma che non mi parvero fornite di peli. Bisogna osservare, che queste foglioline erano affatto nel centro, e che parevano uscir dalla midolla: essendo per altro la picciolezza dei bottoni del Pesco meno favorevole alle osservazioni di quello sieno i bottoni dei Marroni d'India, credo che sia meglio di attenersi alle mie precedenti osservazioni. Fig. 93.

Le parti tutte contenute entro i bottoni del Marrone sono bianchissime: lo che non farà maraviglia, quando si pensi, che le piante che crescono all'ombra hanno le loro foglie di tal colore; ma ell'è cosa molto singolare, che quelle di Pesco sieno verdi. Fig. 94.

Esa.

Esaminando i bottoni in tutti i mesi dell'Inverno, e sul principio di Primavera, si conosce, che le parti che entro vi si rinchiudono, clandestinamente si sviluppano, e ch'elleno si dispongono a comparire, quando i bottoni verranno ad aprirsi. Mi estenderò più a lungo intorno ai diversi stati delle parti contenute entro i bottoni, quando parlerò di quelli da frutto; ma credo di dover qui replicare, che nel disseccare i bottoni mi è sempre parso, che le loro squame prendessero la loro origine dalla parte interna della scorza del ramo che gli porta, e che la scorza del novello ramo, che a primavera si mostra, prenda la nascita, o dagl'interni strati della scorza, o tra il legno e la scorza del vecchio ramo. Il legno dei rami giovani, che allora è picciola cosa, sembra prendere origine dalle fibre legnose, o dalle fibre dello strato legnoso, che stà attualmente formandosi; lo che non è agevole a decidersi. La midolla finalmente, la quale forma la maggior parte di queste produzioni novelle, è una continuazione della midolla medesima del ramo: io credo, che siasi tutto questo reso sensibile colle figure di cui poc'anzi ho data la spiegazione.

Appena che i bottoni da legno sono aperti, cadono le squame esteriori, mentre che le interne acquistano più o meno d'estensione.

Tav. VIII. fig. 30. Quelle dell'Acero (Tav. VIII fig. 30) si stendono considerabilmente.

A misura che si sviluppano i bottoni, veggonsi comparire delle picciole foglie; e può osservarsi, che nelle varie specie d'alberi elleno non sono tutte disposte nella guisa medesima nell'interno dei bottoni: alcuna, come quelle del Silac, sono rotolate le une sopra l'altra.

Tav. XI. fig. 96. Vedesi (Fig. 96) una foglia *e* quasi distesa, un'altra *b*, i di cui orli sono parimente rotolati, e tra queste due foglie un'altra *c*, che è affatto rotolata.

Per dare anche un' esempio delle foglie rotolate può vedersi la Fig. 97. Fig. 97, la quale rappresenta lo sviluppo di quelle del Pero: *a* è una foglia tutta rotolata, la quale ha la forma d'un fuso impuntito nelle due estremità. La foglia *b* è parimente tutta rotolata; ma ell'è molto più bislunga, ed è divisa, secondo la sua lunghezza, da un canaletto formato dal contatto della rivoluzione delli due orli della foglia. Vedesi finalmente in *c* una foglia quasi aperta, in cui altro non v'è che gli orli che sieno un poco rotolati: *d* sono le stipule che accompagnano le code delle foglie.

Le foliole delle foglie conjugate sono talvolta rotolate come quelle

le ora descritte: ne darò per esempio quelle del *Staphilodendron* (Fig. 98).

Tav. XI. fig. 98.

In altri alberi, come nell'Olmo (Fig. 100) nel Mandorlo (Fig. 101), Fig. 100. e 101. le foglie sono piegate in due, e poste accanto l'una all'altra; e nel *Viburnum* (Fig. 99) le foglie, le quali parimente son piegate in due, Fig. 99. sono applicate, l'una contro dell'altra nei loro orli, e vedesi verso c, tra le due foglie a b, il nervo di mezzo d'una di quelle due foglie che debbono svilupparsi in appresso.

Vi sono alcune foglie, quelle per esempio del Carpine (Fig. 104) Fig. 104. che sono così simetricamente piegate, come sono le carte dei ventagli.

Trovansi delle foglie intaccate, o intagliate, come quelle dell'*Opulus* (Fig. 102), o dell'altre composte, come quelle del Rosaio (Fig. 103), Fig. 102. e 103. che sono piegate, o increpate nel loro bottone, come le foglie semplici di cui ho già parlato. Le foglie del Rosaio sono portate da pediculi piatti, terminati in una specie d'orecchie che fanno le veci di stipule.

Vi sono finalmente alcune foglie che sono increpate per il verso della loro lunghezza, e per quello della loro larghezza, in tal maniera che elleno rappresentano le carte di cui fanno le lanterne: ne darò per esempio, la Palma.

A misura che i novelli rami si slungano, si sviluppano nella loro estremità delle nuove foglie, mentre che l'altre che furono le prime a comparire acquistano estensione; ed a tal proposito farò osservare che in tutti gli alberi da me osservati, le foglie, tanto semplici, che composte, avevano nell'uscir dal bottone la forma medesima, di quella che elleno hanno allor che giunte sono alla loro compiuta grandezza: tutti i nervi, tutte le dentature, erano parimente situate nelle più piccole, come in quelle che acquistato avevano l'ultimo grado d'accrescimento, dal chè si può concludere che le foglie della maggior parte degli alberi si distendono in tutte le loro parti. Non è già così nelle foglie di tutte le piante: perchè quelle delle piante *Cepacee*, per esempio, non si distendono quasi, se non nella parte che tocca la Cipolla. Ho voluto accertarmi di questo, col fare su delle foglie di Giacinto, che acquistato non avevano se non un quarto della loro grandezza, dei fegni con vernice di colore; ed avendo fatti questi fegni due linee tutti distanti trà di loro, ho osservato che quelli che erano vicini alla punta della foglia conservavano quella

ri-

rispettiva posizione; quelli che erano più bassi si slontanavano un poco dagli altri, e tanto più si allontanavano, quanto più avvicinavano alla Cipolla; ma la estensione maggiore facevasi accosto alla Cipolla. Non è già così dei fusti dei Giacinti; essi si distendono in tutta la loro lunghezza, e principalmente nelle due estremità. Di ciò m'occorrerà forse di parlare in appresso; basta per ora di fare osservare che le foglie delle piante *cepacee* non hanno i nervi o le ramificazioni dei vasi che osservansi sulle foglie degli alberi; e pare che formate sieno di tubi che si estendono per tutta la loro lunghezza. L'organizzazione delle *Gramineae* è presso a poco simile.

ARTICOLO VIII. *Del punto in cui le foglie s'attaccano su i Rami.*

QUANDO s'esamina l'attaccatura o l'inserzione d'una foglia sopra d'un ramo, vedesi che si staccano dal legno molti fascetti di vasi, i quali dopo aver trapassati obliquamente gli strati corticali, ed una eminenza che trovasi in quella parte, si prolungano secondo la lunghezza del pedicelo, o coda delle foglie.

Bisogna dunque comprendere che nei punti in cui i bottoni e le foglie s'attaccano ai rami, vi è quasi sempre un'eminenza fatta a guisa di picciola mensola, e che è molto più grossa in certe, che in altre specie. Ne ho già parlato nell'Articolo dei bottoni. Queste eminenze, che servono di sostegno ai bottoni ed alle foglie, sono formate dai fascetti delle fibre legnose, di cui ora ho parlato, e da un'

Tav. XI. fig. 105. ammasso della cellular tessitura. Vedesi nella *Figura 105* un pezzo di legno guarnito di scorza, con il bottone appoggiato al suo sostegno.

Fig. 91. La *Fig. 106* rappresenta lo stesso pezzo di legno scorzato, e la tessitura cellulare del sostegno tolto via: veggonsi i tre filetti legnosi che vanno ad unirsi alla foglia; e nell'ascella, il bottone che è congiunto al legno da un filetto legnoso.

ARTICOLO IX. *Delle Code delle Foglie.*

I PEDICOLI o code o gambi delle foglie sono esternamente ricoperti dall'epidermide; e vedonsi nell'interno dei vasi d'ogni specie, dei vasi linfatici, dei vasi proprj, delle trachee, e talvolta molta tessitura cellulare.

I principali fascetti delle fibre legnose, i quali passano nei pedicu-
li

li delle foglie, sono riuniti in un fascio solo; poichè dalla trasversale sezione dei pedicoli, vedesi che questi fasci formano talvolta un'angolo, talvolta una porzione di cerchio; che essi sono ora 3, ora 5, ora 7. Nella Malva formano questi fascetti, colla loro reciproca disposizione, la 8.^a, o la 10.^a, parte d'un cerchio; nello Smilacce, la 12.^a parte; nella Siringa, la 6.^a; Consultisi il Grewio sopra tutte queste particolarità.

Offervasi ancora, che il più delle volte questi pediculi non son rotondi: se ne vedono molti che sono spianati di sopra, ed altri che sono scavati a guisa di doccia: il Pioppo della Carolina gli ha compressi sui lati: altri finalmente vi sono che tengono tenacemente le foglie, ed accostate ai rami, come l'Alloro (*Fig. 107*): altri coi pediculi facienti una curva, e colle foglie quasi orizzontali, come il Pioppo nero (*Fig. 108*); ed altri colle foglie affatto pendenti, come nel Tremulo (*Fig. 109*).

Tav. XI. fig. 107.

Fig. 108.

Fig. 109.

ARTICOLO X. *Delle Foglie nello stato della loro perfezione.*

SE si esamina l'estremità dei pediculi, che attaccati sono alla foglia, vedrassi che tutti i vasi, che in qualche guisa erano stretti insieme nella lunghezza del pedicolo, si distribuiscono in molti grossi fasci, da cui si partono parimente molti altri fasci men grossi: questi poi danno nascita a degli altri, ed a forza di divisioni e ripetute suddivisioni, formasi un'immensa quantità di ramificazioni, le quali scambievolmente congiungendosi in moltissimi punti, formano una reticella, la quale costituisce lo scheletro della foglia: *Ved. la Figura 110. 111.*

Fig. 110. e 111.

Questo spandimento di vasi può chiaramente vederfi, coll'esaminare colla lente il di sotto d'alcune foglie; ma io non l'ho così chiaramente mai veduto, quanto sulle foglie di Platano, che erano state dagl'insetti scarnificate, con tutto che in tali foglie, considerate intiere, i nervi del di sotto delle foglie non sieno molto sensibili. Accordar bisogna, che trovansi delle foglie poco opportune a tali osservazioni; ma può bensì crederfi, che l'organizzazione di tutte le foglie si rassomigli, almeno nei punti principali.

Molte foglie, quelle principalmente dell'Agrifoglio, permettono di separarne i vasi, di cui ho poc'anzi parlato, in due strati principali;
ma

ma quando s'efamina col microscopio il tronco d'uno di questi vasi; fcorgefi un fufcetto di fibre fimile a quelli , che ho accennati nell' Articolo delle fibre corticali: e fe dopo aver lafciato per molto tempo macerar le fibre tirate dalle dette foglie, fi battono in più volte con un picciol martello , che termini in forma di cono , e col taglio ottufo , fi potrà dividerle in un numero di filamenti sottiliffimi; e potraffi allora vedere una prodigiofa quantità di fibre fatte a fpirale.

Ho già detto , che la forma delle foglie par che dipenda dalla diftribuzione dei principali tronchi de' vafi poc' anzi accennati , che nella maggior parte delle foglie, e delle foliole intiere, i nervi principali fi dividono nell'accozzamento degli orli delle foglie in due tronchi , i quali poi s'incurvano per andare a congiungerfi col ramo d'un'altro nervo; che, quando vi fono degl'intagli o delle dentature nelle foglie, vedefi fempere un fufcetto di fibre, che corrisponde alla punta del dente; che anzi talvolta il detto fufcio lo fopravanza, e vi forma un filetto , come vedefi nelle foglie d'una fpecie di Quercia, la quale per quefto chiamafi *Quercia Spinofa*.

Sarà forfè quefto intralciamento di vafi più fretto negli orli delle foglie, che nel mezzo; lo che fa, che quella parte che chiamafi il *marginè della foglia*, fia ordinariamente più fiffo e ftabile, che il reftante. Pare alle volte, che il detto marginè fia unicamente formato da una raddoppiatura dell'epidermide: in tal cafo egli è sottile e trasparente; quefta parte ell'è talvolta fiffa e groffa , e fembra formata da' vafi. Vedonfi anche delle foglie, che orlate fembrano da un contorno di glandule; altre orlate di spine; di quefte ne ho già parlato, e dovremo forfè in appreffo dirne qualche altra cofa.

Se adeffo c'immaginiamo , che tutte le maglie della reticella, di cui ho già detto, ripiene fieno d'una tefitura cellulare affai tenera, e che il tutto, tanto per di fotto , che per di fopra ricoperto fia dall'epidermide , fi avrà un'idea molto giufta della ftruttura delle foglie degli alberi e degli arbufti, poichè io eccettuo le foglie d'alcune piante, le quali molto fi ftenterebbe a ridurre a quella organizzazione, di cui adeffo ho data l'idea.

Sono arrivato a conofcere le diverfe parti, che compongono le foglie , col farne la diffezione , dopo di averle lungamente lafciate a macerare . Volendo per altro rifparmiarfi tanta fatica , i bruchi da
M. di

M. di Reamur chiamati *Mineuses* ec. renderanno col loro lavoro sensibile l'epidermide. I vermi che diventano piccioli scarabei, e che distruggono il parenchimo delle foglie dell'Olmo, lasceranno i vasi facilmente visibili. Rompendo con diligenza il pedicelo o i principali nervetti delle foglie, potranno vederfi le trachee. L'odore finalmente, il colore, ed il gusto dei liquori proprj saranno segni certi della presenza de' vasi contenenti il detto sugo.

Evvi una così intima comunicazione tralle parti tutte d'una foglia, ed i vasi che s'incrocicchiano ed a vicenda combaciansi, e che reciprocamente si comunicano i sughi, che essi rinchiudono, che sebbene una percossa di grandine, o qualche insetto trafori una foglia, o tagli un nervetto, tutte le circondanti parti nulla ostante la lor verdura conservano. Tagliando colle cesore un pezzetto d'una foglia, il restante non muore. Ho colato delle gocce d'acqua forte su delle foglie; l'efcara non si è molto dilatata, quando per altro non sia stato distrutto uno dei più grossi fascetti. Conservano il più delle volte le costole o nervi la loro verdura, sebbene tutto il parenchimo delle foglie distrutto sia dagl'insetti.

ARTICOLO XI. *Della caduta delle foglie.*

AVENDO noi veduto, che le foglie unite sono ai rami per via dei fascetti legnosi, che si partono dai rami medesimi, creder potrebbe ch'elleno facciano col ramo un tutto inseparabile. Eppure questa idea generalmente presa sarebbe falsa; egli è vero, che vi sono molti alberi, che lungamente le foglie conservano, e che perciò *Alberi sempre verdi* si appellano. Le foglie de' Pini muojono, e sugli alberi si seccano, come ancora i rami; ma la maggior parte degli alberi perde in autunno le foglie, che di primavera gli ornavano; ed allora diceasi ch'essi si spogliano. Il Frassino, il Noce, l'Olmo, ec. sono di questo genere.

Potrebbero addurfi in esempio alcuni alberi, come la Quercia comune, ed il Carpino, le di cui foglie ogni autunno si seccano e muojono, ma solo cascano a primavera, all'aprirsi delle gemme, e allo spuntar delle foglie novelle; vi sono finalmente alcuni alberi e molti arbuti i quali conservano le foglie verdi fino a primavera, quando vanno dolci gl'inverni; ma che le perdono ai rigidi freddi: l'

∴ PARTE I.

H

Ace-

Acero di Candia, il Ligustro, il picciolo Gelsomino giallo sono legni di tal genere.

Difficil cosa si è l'indagare la causa della caduta delle foglie, quantunque siasi impiegata ogni possibile attenzione per esaminare le circostanze che l'accompagnano: ora riporterò quelle che ho osservate. 1.^o Vedrassi in seguito della presente Opera, che gli alberi che depongono le foglie, traspirano più di quelli, che per tutto l'anno le serbano. 2.^o Quando s'innesta un'albero, che non si spoglia, su d'un'altro albero che depone le foglie, un Lauro-Ciriegio, per esempio, su d'un Viscioło; un Leccio sulla Quercia comune; l'esperienza dimostra, che il Lauro-Ciriegio, o il Leccio le sue foglie conservano; ciò combina colla precedente osservazione, perchè il Lauro-Ciriegio, che poco traspira, attrae dal Viscioło molta sostanza per conservar le sue foglie, tanto più che il moto del fugo non rimane affatto interrotto durante l'inverno. Accordar per altro bisogna, che tal sorta d'innesti non per molto tempo sussistono. 3.^o Comunemente le foglie s'ingialliscono in autunno; ed allor quando sopraggiunge la pioggia poco dopo la brinata, in brevi giorni sen cadono. 4.^o Vengono talvolta in estate caldi sì forti, ch'essi bruciano e seccano le foglie; se dopo sopravvengono delle calde piogge, allora casca la foglia, e gli alberi nuove foglie producono, che dir si ponno *Autunnali*; e queste durano sugli alberi molto più nell'innoltrato inverno che le foglie di primavera: le moderate brine, che queste cader farebbero, non danneggiano l'altre. 5.^o Ho veduti degli Olmi molto vigorosi, forniti di grandi foglie foltissime e molto verdi, morir istantaneamente nell'estate, per una malattia, che separata aveva la scorza dal legno; dopo del quale accidente, si seccavano le foglie, ma rimanevano tenacemente attaccate alle fronde. 6.^o Dopo i gran tuoni vedonsi talvolta in un attimo morir le foglie. In tal caso restan le foglie tenacemente attaccate alle fronde. 7.^o Un'effusione del fugo proprio nei vasi linfatici fa spesso volte perire in un subito nell'estate dei rami di Ciriegio o di Pesco; allora le foglie si seccano su i rami, e vi rimangono molto attaccate.

Io non starò a render ragione di tutti questi fatti; mi contenterò solamente di compararli colle osservazioni, che tutti avranno potuto fare sopra i tralci della Vite.

Si vedono su i detti tralci, di distanza in distanza, alcuni nodi
ove

ove son poste le genime, da cui parton le foglie, o i grappoli, o i vitici della vite. La parte di questi tralci vicina al ceppo, è ordinariamente dura quanto basta, perchè piegando un tralcio al grado di romperlo, la rottura non si faccia mai nei nodi, che sono più capaci di resistenza, di quello sia la porzione del tralcio, che è tra i due nodi. Nell'altra estremità, ove il detto tralcio è ordinariamente molto più tenero, egli è un poco erbaceo; ciò nulla ostante quando dolce ed asciutto fu l'Autunno, maturano i tralci per quasi tutta la di loro lunghezza; ed allora quand'anche i diacci alquanto forti venissero, facile non sarebbe il fare la separazione dei nodi, nemmeno nelle vette del tralcio.

Non è già così, qualora freschi ed umidi vadano gli Autunni; poichè allora l'estremità de' rampolli non avendo acquistata una bastevole maturità, i minimi freddi d'Autunno attaccano principalmente i nodi, che allora si separano quasi da per se stessi, come appunto si separano l'*epifisi* dal corpo degli ossi nei giovani animali. Questo accidente diminuisce talvolta la lunghezza dei tralci, a segno tale, che non rimane tanto legno che basti per la veggente tagliata.

Può farsi la medesima osservazione su i rami del Vischio: facendo bollir nell'acqua delle frondi grandi di detta pianta, vedrassi, spogliate che sieno della scorza, che nei grossi rami i nodi sono molto solidi, ma che quelli dei rami giovani si separano come l'*epifisi* dell'ossa.

Da questi due esempj egli è evidente, che la sostanza che separa i nodi in due parti è più facilmente danneggiata dal freddo, o intenerita dall'ebullizione, della porzione dei fusti che è tralli nodi. Avvi forse in mezzo ai detti nodi qualche porzione, che rimane per più lungo tempo erbacea; l'istessa cosa forse anche trovasi nell'inferzione delle foglie su i rami. Se ciò fosse, la causa della sfogliatura, e quella della caduta delle foglie sarebbe la stessa; e secondo questa congettura, gli alberi sempre verdi conserverebbero le foglie, per la ragione, che il punto della loro inferzione verrebbe ad acquistare una sufficiente maturità per resistere all'ingiurie dell'inverno. Io confesso per altro, che questa spiegazione della caduta delle foglie non mi appaga pienamente; poichè non so comprendere, perchè le foglie, che non comparvero se non al principiar dell'Autunno, resistano più al freddo di quelle, che a Primavera sviluppansi, quantunque queste qui dovessero certamente essere meno erbacee dell'altre.

Ciò nulla ostante siccome sono state fatte molte osservazioni, le quali provano che le piante vigorose, e che con forza germogliano, sono dai piccioli freddi danneggiate meno di quelle, che tanto vigorose non sono; sembra che l'addotta spiegazione possa aver luogo nel caso che la spoglia degli alberi precipitata venga dai freddi d'Autunno; ma l'esperienza dimostra, che se durante l'inverno freddi rigidi non sopraggiungano, gli alberi non ostante non lasciano di deporre le foglie; lochè ho potuto osservare più volte. Oltre di che prova anche l'esperienza, che nelle calde conserve, ove artificialmente si mantiene un calore sempre maggiore di quello dell'aria aperta, a primavera allorchè gli alberi spuntano, quelli che per natura loro si spogliano, perdono anche dentro le conserve la foglia, per poi da lì a poco tempo altra novella foglia produrre. Cercar dunque conviene una causa della caduta delle foglie, che indipendente sia dal freddo: ed eccone una che molto sembrami verisimile.

Le foglie traspirano molto; questa è verità conosciuta, e proverassi in appresso. Quando le radici non cooperano più a questa gagliarda traspirazione, ne risulta un principio di disseccamento, ed una cessazione d'accrescimento per le foglie, mentre i rami continuano ad acquistare grossezza: poichè sarà provato, che l'accrescimento dei rami in grossezza continua molto tempo dopo che l'accrescimento in lunghezza è cessato.

E quindi se i pediculi delle foglie cessano d'ingrossarsi, mentre che i rami seguitano a dilatarsi per questo verso, deve accadere una separazione delle fibre di queste foglie da quelle dei rami; ed allora debbono esse necessariamente cadere.

Per dare qualche risalto a tal congettura, farò osservare, 1.^o che le foglie degli alberi piantati all'esposizione del Nord, poco traspirano, e che quest'alberi più tardi degli altri si spogliano. 2.^o Che se le foglie della Quercia e del Carpine, quantunque morte e secche, restano nell'inverno attaccate ai rami, e solamente a Primavera si staccano, quando gli alberi cominciano a far delle nuove produzioni, ciò probabilmente nasce perchè i rami de' detti alberi poco s'ingrossano in Autunno, e perchè le foglie non si staccano se non quando il sugo di primavera comincia a fare ingrossare i rami. Io per altro non espongo ciò se non come semplici congetture, sopra le quali ho quasi rimorso d'essermi soverchiamente fermato. Passerò intanto a parlare dell'uso delle foglie, relativamente alla vegetazione.

ARTICOLO XII. *Dell' uso delle Foglie ,
relativamente ai Vegetabili.*

CREDE il Cefalpino, che l'uso delle foglie quello sia di servire d'inviluppo, di difendere i novelli getti, i fiori e i frutti, e di ripararli dal troppo ardente caldo del Sole. Se l'uso delle foglie consistesse in questo solamente, diventerebbero quelle quasi inutili, finiti che fossero i fiori, e tosto che le nuove rimesse acquistata avessero qualche solidità. Vero si è, che nei paesi ove si allevano i bachi da seta, si spogliano i mori delle prime lor foglie, senza temere che ciò possa far morire le piante. L'uso del Piemonte si è di brucare anche due e tre volte all'anno quest'alberi, senza che i mori grave danno risentano. Egli è dunque dei mori come dell' Erba Medica, la quale due o tre volte si sega, senza che le radici periscano. Le Cantaridi, che quasi ogni anno divorano le foglie del Frassino, non attaccano all'albero un notevole danno. Gli alberi degli Orti nostri, come pure quei delle felve, non muojono, quantunque sieno di tanto in tanto spogliati dai bruchi.

Non per questo concluder debbesi, che sieno le foglie inutili agli alberi: ne ho veduti alcuni morire per un repentino brucar delle foglie. I mori, cui non levansi le foglie, con più vigore certamente germogliano, e si fanno molto più grandi di quelli che ogni anno si sfrondano; ed i bravi Amministratori lasciano di tanto in tanto che i Mori si riposino, non togliendo loro la foglia. Sono affai più belle le rimesse degli alberi in quegli anni, ne quali non regnano gl'insetti, ed abbiamo osservato che essi perdono molti dei lor ramicelli, quando le foglie per molt'anni di seguito furono dagl'insetti corrose. Osservasi ancora che gli alberi producono frutta deformati e cattive negli anni in cui li Bruchi divoran le foglie. Ben lo fanno i Giardinieri, quanto i Bachi detti *Tigri* (*), i quali attaccano solamente le foglie del Pero buon cristiano, danneggino i frutti loro. Io aveva una Carpineta piantata su d'una altezza in buona terra, ma molto secca e leggiera, lungo un muro esposto a mezzo giorno: vestivasi la detta Carpineta ogni Primavera di belle frondi, che poi del tutto seccava-

PARTE I.

H 3

no

(*) Piccolo insetto grosso come una Cimice, rotondobigio; chiamasi in Latino *Tigrinus Pulex*.

no i primi caldi: gli alberi veramente non morivano, ma venivano talmente stentate e piccole le lor produzioni, che fui costretto a sbarbarla. Nei freschi terreni ed esposti al Nord, le foglie lungamente sussistono sugli alberi, i quali molte legne producono. Osservasi parimente, che quando le foglie di qualsivoglia pianta vengono attaccate dalla ruggine, tutta la pianta allora cade in uno stato di languore, fin tanto che riproduca nuove foglie.

Ecco un'altra osservazione, la quale prova la grande utilità delle foglie. Finchè gli alberi germogliano, finchè abbondano di sugo, non giungono le frutta ad una perfetta maturità. Se poi vogliasi sollecitar la detta maturità, si toglie agli alberi una porzione delle fronde. Ciò non suol farsi ordinariamente se non coll'idea di esporre i frutti all'azione del sole; ma infatti rallentasi il moto del sugo, lochè, come ho detto, contribuisce a far maturare le frutta. Ho per altro fatta pruova, che togliendo una troppa quantità di foglie, e prima che i frutti arrivati sieno alla loro grossezza, allora invece d'ingrossarsi s'invizziscono, e sempre mediocre è la loro quantità. Ciò non rechi maraviglia; poichè per convincersi, che lo sfrondamento rallenta il moto del sugo, basta il levar le foglie ad un'albero giovane che sia in pieno sugo, e la di cui scorza agevolmente si stacchi dal legno: vedrassi dopo due giorni, che la scorza sarà così fortemente attaccata al legno, quanto esser lo può nell'inverno.

Siccome ho voluto anche più assicurarmi, se le foglie influiscono sulla formazione, e la maturazione dei frutti, ho tagliate tutte le foglie di molti capi di vite, allorchè l'agresto cominciava a voltare; i granelli invece di maturare appassivano, e riuscirono molto inferiori in bontà a quelli dei vicini ceppi lasciati guarniti di tutte le loro foglie; ed ho ancora osservato, che sopra di questi ultimi le uve del mezzo del ceppo, che stavano interamente al coperto del sole, erano più mature di quelle degli sfrondati ceppi (*). Se si aggiunga a questa esperienza, che le uve quasi più niente maturano sulle viti che naturalmente si spogliano in Autunno, mi si accorderà volentieri che le foglie molto contribuiscono alla perfetta formazione dei frutti. Potreb-

(*) Quando feci questa esperienza non mi sovvenni, ch'ell'era stata già fatta da M. Parent. Le mie osservazioni sono state le medesime delle sue, riferite già nelle Memorie dell'Accademia Reale delle Scienze.

trebbe darli, che col toglier le foglie si arrivasse a indebolire i rami ingordi, o succhioni, i quali tanto stancheggiano gli alberi fruttiferi: merita questa idea d'essere ponderata.

Non può dunque rivocarsi in dubbio di quanta importanza sieno le foglie per i progressi della vegetazione: ma in che cosa consiste mai questo vantaggio? Su questo appunto nascono e durano ancora le diverse opinioni. L'esperienze di Mariotte, di Woodward, e del Dottore Hales, provano che le foglie sono tanti organi destinati principalmente alla traspirazione, e che la maggior parte del sugo per quelle strade sen fugge. Sono dunque le foglie tanti organi secretorj, per i quali si scaricano gli alberi d'un sugo troppo copioso ed inutile.

Hanno ancora provato molti Fisici, che le foglie s'inzuppano dell'umido delle piogge e delle rugiade, e che un tal rinfrescamento molto giova alle piante. Sono dunque le foglie tanti organi capaci di succiamento, i quali d'accordo colle radici alimento alle piante somministrano.

Ho detto, che nelle foglie si scorgono molte trachee. Afficura il Dottor Grewio avervi trovato molte vescichette ripiene d'aria: e da tali osservazioni ne fu concluso che le foglie sono polmoni delle piante; ch' elleno ricevono l'aria dell' Atmosfera, la quale per quei canali introduceasi in tutte le parti delle piante, e che vi produce sopra il sugo un effetto simile a quello, che l'aria respirata dagli animali produce sopra la massa del sangue loro. Hanno preteso alcuni Fisici d'anche più estendere l'utilità delle foglie, considerandole come viscere capaci di dare al sugo delle preparazioni essenziali, che lo rendevano proprio a nutrire le diverse parti che compongono i vegetabili. Esaminerò queste opinioni in tanti particolari Articoli; queste discussioni ci metteranno in istato di spandere qualche lume sopra la questione principale.



C A P I T O L O I I I .

DELLA TRASPIRAZIONE DELLE PIANTE.

SAPPIAMO, che oltre a gli escrementi grossi, di cui gli animali si sgravano, i loro liquori si depurano ancora, e producono altre evacuazioni conosciute col nome di *traspirazione sensibile*, e *traspirazione insensibile*.

Siccome i vegetabili attraggono dalla terra per mezzo delle radici, che ponno essere paragonate alle vene lattee degli Animali, il loro nutrimento affatto digerito; e siccome il sugo così trombato dalle radici, può essere paragonato al Chilo (*); ne viene in conseguenza che, non essendo i vegetabili nella necessità di sgravarsi dei grossi escrementi, e che il sugo loro, a guisa del sangue degli Animali, avendo bisogno d'essere depurato, egli deve produrre delle secrezioni particolari, che devonfi paragonare alle traspirazioni sensibili ed insensibili degli animali. Provano molte esperienze e molte osservazioni, che le piante soggette vanno a queste secrezioni, e ch'elleno compariscono più essenziali all'economia vegetabile che all'economia animale.

Resta dunque già da gran tempo accordato, che le piante traspirano; cioè, che una parte dei sughi, i quali rinchiusi sono nei vasi loro, si disperde per una sensibile o insensibile traspirazione. Si fa parimente che i vegetabili traspirano, non solamente per le foglie, ma ancora per i giovani rami, per i fiori, e per i frutti. Siccome le foglie devono essere considerate come gli organi principali della traspirazione, ho creduto a proposito di parlarne nel presente Capitolo, ove proposto mi sono l'efame d'un organo, il quale è singolarmente destinato ad operare questa secrezione. Lo che farà l'oggetto degli due seguenti Articoli.

A R.

(*) Vedi appresso Lib. V.

ARTICOLO I. *Della insensibile traspirazione delle Pianta.*

PER provare in generale che le piante traspirano, basta tagliare un ramo d'albero, smaltare col mastice la parte tagliata, e pefarlo. Vedraffi di là a qualche giorno, ch'egli ha perduta una parte del suo peso, e che le foglie appassiscono. Devesi dunque concludere che una parte della sostanza si è dissipata per una insensibile traspirazione, mentre che niente potè svaporare dalla parte tagliata; non avendo il mastice permessa dissipazione alcuna di sostanza. Il Mariotte, che ha fatta questa esperienza, ha trovato che da un ramo adoperato da lui a tale officio, nello spazio di due ore, in un giorno caldissimo, erano usciti due cucchiari d'acqua; e ne concluse, che in 12 ore doveva seguire una dissipazione di dodici cucchiari d'acqua. Potrebbe per altro rigettare una tale osservazione come una prova della traspirazione delle piante; imperciocchè se la traspirazione è una dissipazione di certi fughi, e se ella risulta da una secrezione, ella suppone degli organi propri ad operarla; e potrebbe dirsi, che nel ramo tagliato la vaporazione che diminuisce il suo peso, si fa senza il concorso di verun organo, e nella guisa medesima che da un bagnato pannolino esce l'umidità. Ma se bastanti non sembrano queste generali considerazioni, vi sono delle sperienze, le quali incontrastabilmente provano questa secrezione. Ho introdotto una ciocca di foglie, e il ramo che sostenevale, in alcuni globi di vetro che impedivano la dispersione del liquore della traspirazione. Ho potuto in tal maniera raccogliere molti cucchiari del detto liquore; sopra del quale ho fatte poi alcune esperienze, per conoscerne la sua natura; ma siccome tutte le mie ricerche non uguagliano nell'esattezza quelle che fatte furono in primo luogo dall'illustre Signor Hales, e poscia dai Signori Bonnet e Guetard, mi contenterò di riportare in ristretto le esperienze di questi celebri Fisici; e con tanta maggior fiducia io le riporto, perchè avendo io volute ripeterne alcune fatte dal Signor Hales, ebbi il contento di ritrovarle esattissime.

Sul principio del mese di Luglio, prese il Signor Hales un Sole (*Corona Solis*) della specie grande, che egli aveva apposta allevato in un vaso di terra: aveva allora questa pianta tre piedi d'altezza. (*Ved. Fig. 112*).

Tav. XI. 6g. 111.

Per

Per prevenire l' evaporazione dell' umido della terra contenuta nel vaso , egli applicò agli orli del vaso una piastra di piombo con diligenza stuccata col mastice : ella cuoprìe tutta la bocca del vaso , ed abbracciava esattamente il fusto del Sole , di modo che l' umido della terra non poteva uscire ; eranvi in altre faldati a detta lamina o piastra due tubi , uno dei quali molto stretto , e lungo nove pollici , trovavasi posto accosto al fusto : il qual tubo , che destinato era a conservare una comunicazione dell' aria esterna con quella contenuta nel vaso , restava aperto .

L' altro tubo che aveva due pollici di lunghezza sopra un pollice di diametro , serviva ad introdurre l' annaffiature , ed avevasi l' attenzione di tenerlo esattamente chiuso quando non annaffiavasi ; erano stati finalmente diligentemente ferrati i buchi del fondo del vaso . Il vaso e la pianta pesati furono sera e mattina per quindici giorni consecutivi del mese di Luglio , per conoscere quanto umido uscìr potesse per traspirazione . Ma essendo il vaso fatto di terra porosa e permeabile ai vapori , cadeva in acconcio di conoscere quanto umido uscisse dai suoi pori , ad oggetto di sottrarre questa straniera evaporazione dalla evaporazione che facevasi per la pianta .

A tale oggetto appunto , dopo quindici giorni d' esperienza , tagliò il Signor Hales il fusto del detto Sole rasente la lamina di piombo , sigillando poi col mastice l' apertura , per cui il detto fusto passava . E continuando poi a pesare il vaso , conobbe che la traspirazione straniera alla pianta , era , in dodici ore del giorno , di due oncie , le quali doveansi sottrarre dalla evaporazione che era stata osservata nei quindici giorni , in cui la pianta ed il vaso erano stati pesati .

Fatta che fu questa rettificazione , ne risultò dall' esperienza , che la maggior traspirazione , nello spazio di dodici ore d' un giorno molto caldo ed asciutto , era d' una libbra quattordici oncie ; e che la traspirazione media era d' una libbra e quattr' oncie , o 34 pollici cubi , se si convenga che un pollice cubo d' acqua pesi 254 grani .

Quando le notti erano calde , asciutte , e senza rugiade , andava l' evaporazione fino alle tre oncie ; ma non conoscevasi veruna evaporazione quando le rugiade cadevano ; anzi se copiosa era la rugiada , o se di notte poca pioggia cadeva , il peso del vaso e della pianta cresce.

facevano due o tre oncie . Ciò ha relazione coll' inzuppamento delle piante di cui parleremo in appresso (*).

Giacchè le foglie devono esser considerate come l'organo principale della traspirazione, egli è probabile che una pianta traspirerà più che un'altra pianta della medesima specie, nelle medesime circostanze, qualunque volta che la superficie di tutte le sue foglie averà un'estensione maggiore; ed ecco appunto la ragione, perchè il Sig. Hales aveva avuta l'avvertenza di misurare la superficie di tutte le foglie del Sole della sua esperienza, collocandole successivamente sotto una rete, le di cui maglie erano d'una grandezza a lui ben nota: trovò in tal maniera che la superficie di tutte le foglie e dei fusti del detto Sole era uguale a 5616 pollici quadrati.

Sbarbicò un'altra volta il Signor Hales un piede di sole, il quale era presso a poco della grossezza medesima dell'altro della precedente esperienza.

Dopo di aver conosciuto per via di metodi d'approssimazione, che la superficie delle radici della detta pianta era uguale a 2286 pollici quadrati, lo che fa $\frac{3}{4}$ della superficie delle parti della pianta le quali erano fuori della terra, ei ne concluse, che la velocità, con cui il fugo entra per le radici per riparare la traspirazione, è alla velocità, con cui la traspirazione esce per le parti della pianta le quali sono fuori della terra, all'incirca come cinque è a due. Ed infatti egli è evidente, che la velocità dei fughì, i quali entrano nelle piante per la superficie delle radici, paragonata colla velocità della traspirazione, che esce per la superficie delle foglie, è in proporzione reciproca delle superficie delle radici e delle foglie; la quantità dei fughì aspirati dovendo essere all'incirca uguale alla quantità dei fughì che se n'escono per la traspirazione.

Proponesi poscia il Sig. Hales di fare un confronto, il quale non farà forse che semplicemente curioso; ed è quello della traspirazione del Sole, che fu il soggetto della sua esperienza, colla traspirazione del corpo umano: ei la conclude come 50 è a 15; cioè, che se in un determinato tempo la traspirazione del detto Sole è, per esempio, di 15 oncie, quella dell'Uomo è nel medesimo spazio di tem-

po

(*) Sarebbe stato desiderabile che il Signor Hales avesse osservato l'inzuppamento del vaso, siccome egli ha osservata la sua evaporazione.

po di 50 oncie : egli attribuisce la causa di una tal differenza all' essere il calore negli animali assai maggiore che nei vegetabili. Ed infatti, egli dice, il calore de' vegetabili appena supera quello dell' Atmosfera, il quale non arriva al più che a 35 gradi sopra il termine del diaccio; ed all' incontro il liquore d' un termometro, tenuto per qualche tempo sotto l'ascella d' un Uomo sano, sale fino a 54 gradi; e quello del sangue è di 64 gradi, il quale è il termine del calore dell' acqua nella quale appena si può tener la mano senza scottarsi. Egli è costante che s' alzan dall' acqua scaldata molti vapori fino a questo grado.

L' esperienza del Signor Hales gli ha somministrato una riflessione importante e più esatta: eccola:

Secondo il Dottor Keill, un' uomo prende 4 libbre 8 oncie d' alimenti solidi o liquidi nello spazio di 24 ore: il peso dei suoi escrementi è di cinque oncie; quindi le materie estratte degli alimenti per il suo nutrimento, son ridotte a 4 libbre 3 oncie. Si è trovato che il sole in un simile spazio di tempo attrae 1 lib. 6 oncie. Ma d' uopo è di fare attenzione, tanto rispetto al nutrimento, quanto rapporto alla traspirazione, che la pianta del sole, la quale faceva l' oggetto dell' esperienza di M. Hales, ha molto minor massa d' un Uomo, e volendo seguitare il calcolo fatto da questo celebre Fisico, si vedrà, che a masse uguali la detta pianta attrae e traspira 17 volte più d' un Uomo. Questa considerabile traspirazione rendesi tanto più necessaria quanto che le piante altro che questa strada non hanno per sgravarsi del superfluo oltre il lor nutrimento: era dunque necessario, che avessero le foglie delle ampie superficie per compiere una tal secrezione; e l' uomo all' incontro, oltre alla facoltà del traspirare, ha ancora l' evacuazione dei grossi escrementi, dell' orine, della saliva, di ciò ch' esala dalle narici, dalla respirazione, ec. Sembrerà forse sorprendente cosa, che le piante attraggano dalla terra una quantità sì copiosa di sostanza; ma egli è probabile che ella non sia tanto nutritiva quanto lo son gli alimenti presi dall' Uomo, sebbene il fugo attratto dalle piante sia una specie d' chilo, il quale somministrar non deve materia veruna di grosso escremento.

Queste riflessioni fanno conoscere, che la traspirazione la quale certamente influisce sullo stato della salute o della malattia degli Uomini, ell' è altresì importantissima alla vegetabile economia, e che il suo

ec.

ecceffo o fcarfezza produr devono delle malattie nelle piante. Di ciò dovrò parlare in appreffo.

Avendo il Sig. Hales replicata la medefima efperienza fù d'un cavolo di mezzana groffezza, la media traspirazione fu di 19 oncie. La fuperficie della tefta del detto Cavolo era di 19 piedi, offia di 2736 pollici quadrati: la fuperficie delle radici fu reputata efferè all' incirca di 256 pollici quadrati; e il piano del taglio orizzontale del tronco, di $\frac{22}{56}$ pollici quadrati, dal che deduffe il noftro Autore, che neceffariamente bifogna che il fugo entri nelle radici delle piante, con 11 volte più di celerità di quello che fcappi per le foglie; e che la celerità del fugo nel tronco, prefcindendo dalla circolazione, e non computando quello che efce per la traspirazione, è alla celerità della detta fecrezione che forte per le foglie, come 4268 è a 1, fuppofto ancora che il tronco del cavolo fia un tubo vuoto; e non farà efa-gerazione, fe fi diminuiſce d'un quarto il detto canale, per le parti folide che vi fon dentro rinchiufe; lo che potraffi efattamente riconſtare, col difeccare perfettamente un pezzo di tronco d'un Cavolo: poichè dal peſo che reſterà ſi conoſcerà, quanto peſo di parti folide rinchiuda. Ma ciò non baſta; ficcome egli è probabile che il fugo paſſi nelle piante, ridotto in vapori, o almeno in uno ſtato maſſimo di rarefazione, la di lui celerità deve crefcere in proporzion diretta dello ſpazio, che occupar potrebbe una ſimile quantità d'acqua, qualora ridotta foſſe in vapori; di maniera tale che ſe l'acqua ridotta in vapori occupa dieci volte più di ſpazio, bifogna concludere che il fugo paſſerà nel tronco con dieci volte più di rapidità di quello ab- biam detto.

Il Sig. Hales, dopo aver replicate quelle iſteſſe efperienze fopra la Vite, ſu d'un Melo del Paradifo, ſu d'un Cedro, ſu degli alberi che non depongono le foglie, conclude da tutte queſte efperienze, che la traspirazione di tutte queſte piante, in ſuperficie uguali, e in tempi uguali, ell'è uniforme; e che coſtantemente gli alberi, che non perdono le foglie, traſpirano molto meno degli altri.

Il Signor Miller ha allevato a Chelſea, in vafi verniciati, e non bucati nel fondo, una pianta di *Mufa*, un *Aloe*, ed un Pomo del Paradifo; aveva coperto il di fopra dei detti vafi con una laſtra di piombo, provviſta di tubi ſimili a quelli dell' efperienza dell' Hales. Dalli 27 Maggio fino ai 4 di Giugno egli continuò a peſare ogni

di

di i detti vasi, a dieci ore, a mezzogiorno, ed all'ore ventitre: medianti tali avvertenze, egli era sicuro che tutta l'evaporazione doveva esser fatta per i pori delle dette piante. Ei le aveva tenute ora in una conserva caldissima, ora in un camerino esposto al Nord, ov' erano due inferriate lasciate aperte, mai battute dal sole, e liberamente percolse dal vento. Siccome può vederfi nell'Opera dell' Hales (*) il giornale dettagliato della detta esperienza, non starò a riportare adesso che le conseguenze che se ne ponno dedurre, tanto dalla presente esperienza, quanto da quella del Signor Hales.

1.^o La traspirazione, date tutte le cose uguali, è proporzionale alla superficie traspiranti; e quindi più foglie che hanno le piante della medesima specie, più elleno traspirano; e siccome hanno le foglie la superficie grande, a proporzione della lor massa, ben vedesi che devono elleno traspirar di più di qualunqu'altra parte delle piante.

2.^o La diversa temperie dell'aria molto influisce sulla traspirazione; il freddo, l'umido la diminuiscono, o del tutto la sospendono: anche più, quando piove, o quando copiose cascano le rugiade, può darfi che le piante ne rimangano caricate; e da ciò nasce che le piante che stanno coperte dalle Capanne, non si appassiscono, poichè, siccome elleno sono in un' Atmosfera umida, poco traspirano; ma siccome bisogna alzare di tanto in tanto la Campana che le ricuopre, per rianimare la traspirazione, allora non molto stanno ad appassirsi.

3.^o Un giorno che l'aria fu calda, e il Cielo sereno, osservò il Sig. Miller nella veggente mattina, delle grosse goccioline d'acqua, che uscivano dalla punta delle foglie del Musa (**).

4.^o Quan-

(*) Statica dei Vegetabili.

(**) Siccome quelle goccioline d'acqua escono dall'estremità della costola o nervo, che divide la foglia in due, ancora ciò somministra una prova che le dette costole sien formate dall'unione di molti vasi.

Navarrette nel suo supplemento alla relazione della China parla d'una specie di Liana, che in quel Paese chiamasi, *Bejugo*, e dice che quando si taglia la detta pianta, tramanda un'acqua limpida e grata a bevorsi, e in tanta copia, che basta a cavar la sete a sette o otto Passeggieri. Il defonto Sig. Sloane narra l'istesso d'una Vite felvatica, la quale cresce nella Giamaica su dell'aride montagne.

Io trovo una nota, da cui apparisce che il Ruischio dice d'aver veduto nelle conserve del Giardino d'Amsterdam, una specie di *Arum* d'Egitto, le di cui costole di mezzo delle foglie andavano a terminare in un filetto ricurvo, il quale oltrepassava la foglia; e che quando inaffiavasi la detta pianta, uscivano delle goccioline d'acqua dall'estremità del detto filetto.

4.° Quando le piante destinate dal Signor Miller all' esperienza, stavano in una conserva calda, la gran traspirazione ordinariamente facevasi dalle 10 ore fino al mezzo giorno.

5.° O fossero le piante nella calda conserva, o nel Camerino esposto al Nord, la minor traspirazione quasi sempre faceasi nella notte: spesse volte era nulla; inzuppavansi talvolta le piante dell' umido dell' aria, ed allora si aumentavan di peso, lo che era molto più sensibile nell' Aloe che nell' altre piante.

6.° Una troppo abbondante traspirazione fiacca certe piante, allorchè specialmente le loro radici non trovano in terra umido bastante, per riparare questa dispersione di sostanza. E questa si è la ragione, che ancora quando tutto alla traspirazione è favorevole, noi vediamo che le foglie e i novelli getti si appassiscono durante il giorno, ma nella notte poi si ristorano, allorchè cessa la traspirazione, o allorchè diviene notabilmente minore.

7.° La traspirazione, se sia sospesa per lungo spazio di tempo, produce molti mali nelle piante: alcune patiscono più dell' altre.

8.° Generalmente una pianta che sia vegeta, e che vigorosamente germogli, traspira più d' un' altra che sia languente e stentata.

9.° Le osservazioni su la traspirazione fanno vedere, perchè abbisogni tagliare molti rami ad un' albero che si trasplanta; ed infatti, se vi abbisogna una certa quantità di radici per riparare la dispersione dei sughi, la quale faffi per la traspirazione, egli è evidente che devonfi potar dei rami o degli organi della traspirazione proporzionalmente alla quantità delle radici che tagliar devonfi ad un albero che si trasplanta.

10.° Queste osservazioni fanno anche conoscere, perchè un ramo tagliato per farne incalchi, non tarda guari a perdere il sugo, se gli si lascin le foglie, lo che non accade quando si levano questi organi della traspirazione.

11.° Comprendesi finalmente perchè le piante dei paesi caldi, le quali molto traspirano, sieno più aromatiche di quelle del Nord.

Le cognizioni fino ad ora acquistate intorno alla traspirazione, somministrerebbero ancora molte osservazioni utili all' Agricoltura; ma per scansare le ripetizioni, io credo dovermi riferbare a parlarne, allor quando ragionerò dei casi particolari a cui potranno elleno essere applicate.

Resta intanto chiaramente provato che molto liquore svapora, per
la

la insensibile traspirazione. Mi occorrerà in appresso di far vedere quali sieno le parti delle piante, che più d'ogn'altra a tal secrezione contribuiscono; ma credo qui necessario di far conoscere di qual natura ella sia. Siccome questo liquore naturalmente svapora dalle piante le quali son vigorose, e che i vegetabili soffrono sensibilmente qualora sospendasi questa evacuazione, sembra ragionevole il considerarla materia di questa traspirazione, o come un escremento di cui hanno bisogno le piante d'essere sollevate, o almeno come un soprabbondante fugo, il quale potrebbe essere a quelle nocivo. Ma queste idee generali abbenchè vere, non ce ne somministrano delle abbastanza precise sulla natura di questo liquore. Per conoscere la sua natura, d'uopo era di sottoporla a delle osservazioni; e per far questo d'uopo era raccoglierne una bastante dose. Ed a tale oggetto M. Hales introdusse nelle storte di vetro, i rami di diversi alberi ed arbusti (*Fig. 113*); Usò l'attenzione di otturare perfettamente il becco della storta colla vescica bagnata, e con tal mezzo ha cavate molte oncie del liquore traspirato dalla Vite, dal Fico, dal Pomo, dal Ciriogio, dall'Albicocco, dal Pesco, dalla Ruta, dal Ravano, dal Reobarbaro, dalla Pestinaca e dal Cavolo.

Tav. XII. fig. 113.

Tutti questi liquori erano limpidissimi; e dice il Sig. Hales, che differenza alcuna distinguere non potè nel di loro sapore: il peso loro era lo stesso di quello dell'acqua comune: non contenevano più d'aria. Solamente quando l'aria era calda e scottante il Sole, essi avevano un lieve odore della decozione della pianta da cui scaturivano.

Ho cavato anche dei liquori dalla traspirazione d'alcune piante; e mi ha sembrato che quello delle piante molto aromatiche ne partecipasse un odor leggiere, che in breve svanivasi. Egli è per altro probabile, che anche l'acqua pura prenderebbe un simile odore, se tenuta fosse per lungo tempo rinchiusa in un vaso ove state fossero le dette piante; ma pure forza è il credere che il liquore della traspirazione non sia un'acqua pura, mentre questo più presto dell'acqua comune si corrompe.

Ha parimente posto il Sig. Hales il fiore d'un gran Girasole in un lambicco: il liquore che dal detto fiore colla sua traspirazione usciva, dopo che si era condensato alle pareti del vaso, stillava per il becco. Questa è una maniera semplicissima e comoda per racco-

glie-

gliere una gran quantità del detto umore, qualora atto si conoscesse a qualche uso.

Il Sig. Guettard, che molte esperienze ha fatte sopra di ciò, si è servito d'un pallone tubulato, come nella Fig. 114. Egli vi ha introdotto il ramo d'una pianta la quale era in piana terra; il tubo inferiore del pallone corrispondeva ad una boccia o recipiente, ch'ei teneva ricoperto di terra, per facilitare la condensazione dei vapori; tutte le aperture del detto vaso erano esattamente stuccate di terra, acciò svaporar non potesse la minima porzion dei vapori, e con tal disposizione non poteva alcuna foglia del ramo tuffarsi nell'umore, che dalla traspirazione uscìr doveva. Oltre di ciò, siccome a misura che l'umor condensavasi, egli colava nel recipiente, dentro del quale egli stava al coperto, potea manco temersi, che una parte del detto umore di nuovo si convertisse in vapori, i quali avrebbero potuto uscire dalla pianta assorbiti, o avrebbero almen potuto rallentare la sua traspirazione. Il Sig. Guettard ha avuta l'attenzione di unire alla Memoria da lui letta sopra di questo all'Accademia, delle osservazioni termometriche e barometriche, proseguite con molta esattezza. Tav. XII. 6g. 114.

Le sue prime esperienze fatte furono sul Ribes nero, o *Cassis*, sull'Agripomo, o *Cardiaca*, sul Piratro, o radice salvatica delle Canarie, sul Tamarindi di Narbona, sull'Artemisia, o erba di San Giovanni, e sopra il Corniolo dal frutto bianco.

La traspirazione del Corniolo, la quale è stata la più abbondante di tutte l'altre piante, è montata in quattordici giorni a 20 oncie 4 grossi $\frac{1}{2}$; lo che fa 1 oncia 3 grossi $\frac{3}{4}$ per giorno: il qual ramo non pesava per altro che 5 grossi $\frac{1}{2}$. Egli dunque nello spazio di 24 ore dava per traspirazione quasi il doppio del suo peso.

Vero si è che tutte le piante non traspirano come il Corniolo, e che secondo alcune circostanze, deve quest'albero traspirar molto meno di quello che traspirasse nel corso della riferita esperienza.

Tralle piante sottoposte dal Sig. Guettard all'esperimento, alcuna ve n'ha che non ha dato per traspirazione altro che la metà del suo peso; ma generalmente apparisce, che fu maggiore il numero di quelle che somministrano almeno tanto quanto esse pesano.

Vedesi ancora dall'esperienze di M. Guettard, come pure da quelle dell'Hales, che la traspirazione della notte non è quasi niente, a

PARTE I.

I

con-

confronto di quella del giorno. Volendo il Signor Guettard spinger più oltre le sue ricerche, introdusse due rami affatto simili, d'un istesso albero, in due globi di vetro, uno de' quali stava tutto esposto al Sole, e l'altro coperto da un tovagliuolo, che alle volte tenevasi accosto al detto globo, ed alle volte sospeso con delle pertiche, per interrompere la immediata azione del Sole: la traspirazione fu sempre molto più copiosa nel globo immediatamente esposto a tutta l'azione del Sole, che nell'altro.

La curiosità del Sig. Guettard crescendo a misura ch'egli andava facendo delle esperienze, volle conoscere se un ramo, il quale non fosse tanto immediatamente esposto al Sole, ma tenuto solamente in un'aria più calda, od un'altro simile ramo, il quale ricevesse immediatamente i raggi del Sole, desse maggiore o minore traspirazione. Per far tale esperienza scelse una spalliera armata d'invetriate, sotto delle quali eran piantati dei Pomi granati: accomodò dei globi e dei rami di Pomo granato, i quali erano alle due estremità della detta spalliera; e tutta la differenza consisteva nell'essere l'invetriata aperta da un capo della detta spalliera, e ferrata quella dall'altro capo. Sebbene indicasse il termometro, che l'aria dalla parte chiusa era più calda di quella dell'altra parte, nulla ostante pareva, che la traspirazione vi fosse costantemente minore. L'azione immediata del Sole influisce dunque sulla traspirazione per altre cause, che per quelle del calore.

Mostra questa esperienza, che se torna il conto ad esporre al Sole dei frutti, che alla maturità s'avvicinano, per concentrar in tal guisa i sughi per via d'una forte traspirazione, egli è altresì mal fatto e pernicioso lo scuoprire delle lor foglie i frutti acerbi, perchè allora corrono rischio di seccarsi, lo che accade ai nostri frutti d'Europa, allorchè nei troppo caldi climi trasportansi; e come pure vedesi in Francia nelle annate troppo calde, in cui sono il più delle volte danneggiate le frutta dalla sferza del Sole.

I diligenti Cultori chiudono in Autunno le Uve entro i cartocci, acciò non le mangin le vespe. Una tal diligenza, che da tali mosche le difende, serve ancora a scemare la traspirazione dell'Uve, così diventando più grosse; ma pure si sente, che hanno meno di sapore.

S'impagliano i Cardi, si colmano di terra i Sedani, si legano le
Indi.

Indivie, se ne piantano nelle Cantine: e con tali avvertenze, si diminuisce, veramente, di molto la di loro traspirazione, e divengono questi erbaggi più succulenti, più teneri e più delicati, ma hanno per altro un gusto affai minore. Egli è dunque ben fatto il diminuire la traspirazione delle piante e delle frutta troppo saporite, e che null'altro manca loro, che lo acquistare un certo grado di delicatezza; e conviene anzi trovare il modo di aumentare la traspirazione delle frutta troppo succulenti ma di poco sapore.

Alcuni rami, le di cui foglie erano state tagliate alla metà del pedicelo, hanno dato a M. Guettard 18 soli grani di traspirazione; ed all'incontro rami simili, delle lor foglie vestiti, ne hanno data 2 oncie 7 groffi.

Diminuisce la traspirazione a misura, che l'Autunnale stagione s'innoltra; ed a norma dell'esperienze di M. Guettard, la traspirazione d'una pianta verso la fine d'Ottobre, è a quella dell'istessa pianta nel mese d'Agoſto, in ragione di $2\frac{1}{2}$ a 9. Siccome egli è dimostrato, che le foglie contribuiscono ad aumentare il moto del fugo negli alberi, non si potrebb'egli forse levare ad un'albero una parte delle sue foglie, ad oggetto di rallentare questo moto, e di sollecitare in tal guisa la maturità delle frutta? Ed infatti, si sa, che fino a tanto che gli alberi germogliano, fino a tanto che essi abbondano di fugo, non giungono i frutti ad una perfetta maturità. Potrebbeſi dunque levare agli alberi una parte delle lor foglie, non già ad oggetto d'aumentare la traspirazione dei frutti loro, col procurar loro la immediata azione del Sole, ma colla mira d'indebolire il moto del fugo di quelli. Qualora tentar vogliaſi questo metodo, farà d'uopo, come ho già detto, aspettare, che sieno i frutti arrivati quasi all'intiera loro naturale grossezza, altrimenti io ſo per prova, ch'essi invizziranno.

Dopo avere M. Guettard ricoperto d'una vernice fatta collo spirito di vino, la ſola superior ſuperficie d'alcune foglie, e d'alcun'altre la inferiore, egli s'è accorto, che tanto l'une che l'altre molto avevan ſofferto. Gli è per altro ſembrato, che le ſuperficie superiori delle foglie contribuiffero alla traspirazione più delle inferiori. Già tempo ſà, feci anch'io le medefime esperienze; ma reſtarono le foglie talmente offeſe dalla vernice, che non potei niente dedurre.

Secondo M. Guettard, le piante molto ſucculenti, come la Zuc-

ca, il Titimalo, l'*Acorus verus*, hanno traspirato meno dell'altre piante di natura più secca, come il Corniolo; e non si ardirebbe di dire, che elleno sono più succulenti, per la ragione che meno traspirano, poichè le foglie di quegli alberi, che non si spogliano d'Inverno, non sono già più succulenti di quelle degli altri alberi, quantunque i primi pochissimo traspirino.

Tutte l'esperienze fatte da M. Guettard intorno ai liquori provenienti dalla traspirazione delle diverse piante, si accordano a provare insieme con quelle del Sig. Hales, che nulla essi differiscono dalla natura dell'acqua la più semplice.

Provano benissimo l'esperienze di M. Hales, che la pioggia, e per fin le rugiade formano un'ostacolo alla traspirazione; ma M. Guettard ha di più osservato, che i rami, che rinchiusi aveva entro un pullone o globo, hanno traspirato poco durante la pioggia, quantunque non potessero esser bagnati, ed anzi quantunque difesi da qualunque umidità dell'aria: questo fatto si accorda con quella sua esperienza, nella quale un tovagliolo, che cuopriva il globo, era bastante a diminuire l'azione della traspirazione. Il Sig. Guettard ha parimente osservato che, quando ad una giornata molto piovosa altre ne succedevano belle e serene, in cui netto era il Cielo e vivacissimo il Sole, non era allora la traspirazione delle piante tanto abbondante quanto lo è due giorni dopo la pioggia. Sembrerebbe adunque, che acciò fosse copiosa la traspirazione, abbisognerebbe, che l'acqua della pioggia avesse avuto il tempo di ridursi in vapori entro il terreno. Potrebbe anche essere, che fosse necessario, che ella sia ridotta in quello stato, per poter penetrare le piante.

Molte esperienze fatte da M. Guettard con tutta l'esattezza possibile, provano di più.

1.° Che la traspirazione è stata di due terzi più gagliarda in Luglio che in Giugno, ed anche più copiosa in Agosto che in Luglio; e siccome la vegetazione è quasi sempre maggiore in Giugno che in Agosto, si potrebbe quasi credere, che la traspirazione non è sempre in proporzione con i progressi della vegetazione. Ma per tirarne con sicurezza una tal conseguenza, avrebbe abbisognato di osservare le produzioni delle piante le quali hanno fatto il soggetto di queste osservazioni in questi diversi mesi; lo che non ho veduto nelle memorie di M. Guettard.

2.° Ef.

2.° Essendo stata la quantità d'acqua piovuta a Parigi, luogo dell'esperienze di M. Guettard, in Giugno (*), di due pollici $9\frac{1}{2}$ di linee, in Luglio, di due pollici $7\frac{1}{2}$ linee; ed in Agosto, di 1. pollice $7\frac{1}{2}$ linee, si vede che la traspirazione non si è aumentata proporzionatamente alla quantità d'acqua caduta nei detti tre mesi; anzi ell'è stata maggiore nel mese più asciutto; lo che s'accorda coll'altre osservazioni di M. Guettard e con quelle di M. Hales, le quali stabiliscono, che la traspirazione delle piante è poco considerabile mentre piove, ed anche quando il Cielo è coperto di nuvoli; e ch'ella non è mai tanto copiosa, che allorquando il Sole è netto e scottante, ed anche allora quando fa vento ed arsiura, purchè per altro non sia la terra arida all'eccesso, e possano le radici trombar tutto il fugo opportuno alle piante.

3.° Hanno fatto conoscere molte altre esperienze a M. Guettard. 1.° Che le piante grasse comunemente traspirano pochissimo. 2.° Che i frutti, quelli specialmente che sono succulenti, traspirano molto meno, relativamente alle lor masse, delle foglie delle medesime piante: furono fatte queste esperienze su delle Zucche, su dei Poponi, delle Uve, ec. 3.° Il Sig. Guettard considera ancora come probabile, che i fiori, a massa uguale, traspirino meno delle foglie. Il Sig. Hales all'incontro ha preferito il confronto delle superficie. 4.° Che la traspirazione dei rami, quando sono alquanto induriti, è lieve cosa: fu fatta questa esperienza su d'un fusto d'Artemisia assai tenero, il quale ha data pochissima traspirazione.

Sono in troppo gran numero l'esperienze di M. Guettard per poterle tutte qui dettagliare: può il Lettore vedere i tomi delle Memorie dell'Accademia delle Scienze, dell'anno 1748 e 1749.

Egli è certo che oltre l'umore flemmatico, che esce dalle piante per la loro traspirazione, e di cui ora ho parlato, scappano ancora dalle piante delle particelle sottilissime, che non è possibile di estrarre con veruno di quei mezzi rammentati di sopra. Si fa, per esempio, che alcune piante spandono un'odore cotanto acuto, che profumato ne rimane tutto un giardino; questa è una prova certissima che da quelle scappa un sottilissimo vapore. Sembrerebbe ragionevole il credere che possibil fosse l'estrarre il detto vapore, con quei mezzi che tan-

PARTE I.

I 3

to

(*) Memorie dell'Accademia delle Scienze 1749.

to felicemente riuscirono per avere la flemmatica traspirazione delle piante; ma pure, come ho detto, la traspirazione delle piante molto aromatiche, di cui si è parlato nelle precedenti esperienze, conservato non aveva che un lievissimo odor della pianta, il quale odore svaniva anche prestissimo. Per rendere di ciò ragione, egli è bene il sapere, che l'odore anche più acuto di molte piante, suol'essere il più delle volte talmente volatile, che non si può estrarre per via di distillazione. L'odore del Tuberoso e Gelsomino ponno servir d'esempio: sono tanto gagliardi questi odori che al grasso si comunicano ed all'olio; ma sono altresì tanto tenui, che soli non si possono estrarre. Avremo campo di parlare in appresso sopra di ciò; basta per ora l'aver fatta menzione di una tal secrezione, la quale non potrebbe essere considerata come una traspirazione insensibile, qualora fosse provato che questi odori non escono immediatamente dalle piante, ma dalle sostanze che sono somministrate dalla traspirazione sensibile. In quanto a me, credo ch'elleno emanino, parte immediatamente dalle piante, e parte dalle secrezioni di cui ora ragioneremo.

ARTICOLO II. *Della traspirazione sensibile delle Pianta.*

PER traspirazione sensibile delle piante s'intende quella evacuazione che faasi per i pori di quelle, in guisa o troppo massiccia o troppo abbondante, perchè possa sul momento dissiparsi. Questa traspirazione ell'è specialmente sensibile nella Frassinella, o sia Dittamo bianco, il qual vedesi intonato d'una resinosa sostanza: oltre di che quando l'aria è tranquilla, e quando calda fu la giornata, trovasi la detta pianta circondata da un atmosfera resinosa, il quale si accende appena che una candela accesa gli si avvicina. Succede talvolta che passeggiando sull'ore calde del giorno sotto di certi alberi, come per esempio sotto dei Salci e dei Pioppi, si sentono alcune goccioline cader dalle foglie: le quali goccioline sono il prodotto della traspirazione sensibile dei detti alberi. Lo stesso deve pensarsi di quelle goccioline d'acqua, che il Signor Miller ha vedute uscire dall'estermità del *Musa*, ed il Signor Ruischio dell'*Arum*. Possono queste evacuazioni esser considerate come effetti d'una traspirazione sensibile linfatica. M. de la Hire osservata avendo sotto d'alcuni Aranci una specie di manna sparfa per terra, volle assicurarsi d'onde ella venisse; e per ciò pose sotto ai detti

ti Aranci dei vasi atti a riceverla, e trovò ch'ella veniva dalle foglie dei detti alberi. Dice il Malpighi d'avere osservato sulle glandule degli orli delle foglie una materia simile all'olio.

Riferisce il Signor Reneaume nelle Memorie dell' Accademia delle Scienze, ch'egli ha osservato attentamente la secrezione d'un'umore più fisso del precedente, e che par ch'ei venga dal sugo proprio. Se si esamina con attenzione l'umidità che talvolta vedesi sulle foglie degli alberi, vedrassi, dice questo Accademico, 1.° ch'ell'è untuosa, viscosa, e dolce. 2.° Ch'ella trovasi in maggior quantità sulle foglie esposte al Sole, che su di quelle che stanno all'uggia. 3.° Che la parte superiore delle dette foglie comparisce in più luoghi lucente, o a puntini, o piccole laminette; talvolta elleno ricuoprono tutta la foglia. 4.° Che vi è qualche probabilità che questa materia si liquefaccia colla rugiada, poichè ella non vedesi prima dell'apparir del Sole. 5.° Che le Api raccolgono la materia di questa traspirazione, con uguale industria, con quanta raccolgono la sostanza melata che sta in fondo ai fiori. 6.° M. Reneaume ha fatte queste osservazioni sull' Acero-Seccomoro, sul piccolo Acero, con cui fanno le spalliere, sul Tiglio dei Boschi, e su quello d'Olanda. 7.° Vi sono delle piante pelose, come lo è una specie di *Martina*, che mi è venuta dall'alta Luigiana, i di cui peli sono tutti tinti d'un'umor viscoso, il quale sembra essere una secrezione della natura di quella di cui ora si tratta.

La Manna di Briançon, che tramandano i Larici, il *Labdanum* del Cisto possono anch'essi esser considerati come prodotti della traspirazione sensibile. Qualora troppo copiosa sia questa evacuazione, succede talvolta ch'ella fa perir gli alberi; poichè a norma d'una lettera riportata da M. Reneaume, i Roci che alle volte tramandano una specie di manna, sono soggetti a morire in quegli anni nei quali troppo copiosa è una tal secrezione.

Da una Lettera diretta da M. Marzorelle, Segretario dell' Accademia di Tolosa, all' Accademia delle Scienze in data dei 4 Febbraio 1756, rilevasi che M. Mouffet, Speciale a Carcassona, aveva raccolto li 25 Settembre 1754 su dei falci piantati lungo il fiume di Fresquet vicino a Ponnautier, una concrezione che dai detti alberi scollava: appena spuntava il Sole, cadeva questa manna a guisa di pioggia, subito s'induriva, e diventava bianchiccia. Alcuni fanciulli che i primi fu-

rono a vederla, ne mangiarono; e l'inzuccherato sapore ch'ella aveva gli rendeva folleciti a raccoglierla: ciò indusse M. Mouffet ad esaminarla; e trovò ch'ell'era molto simile alla manna di Calabria, e la giudicò applicabile agli usi istessi. Giudicandone da una piccola mostra inclusa nella detta lettera, ci ha parso che questa manna unisse un gusto un poco acidetto allo inzuccherato sapore che la caratterizza, e ch'ella non avesse quel tanto ingrato ritorno alla gola come la manna comune. Dice M. Mouffet che i Frassini dell'istesso Terreno di Pennautier tramandano anch'essi la manna, ma in minor quantità dei Salci.

Egli è da osservarsi che nell'estate del 1754, in cui fu raccolta la detta manna, la stagione andò caldissima ed asciutta. Il liquore d'un Termometro di Mercurio, il di cui spazio tra il termine del gelo e quello dell'acqua bollente è diviso in 100 parti, era allora a Tolosa, ove la temperie è molto simile a quella di Carcaffona, a 30, 31 e 32 gradi sopra zero; e altra pioggia non cadde in due mesi di quella stagione, che $11 \frac{7}{11}$ di linee. Rinfrescatali l'aria nel mese d'Ottobre, e sopraggiunte delle copiose piove, cessò affatto la raccolta della manna.

Sembra da tali osservazioni di poter concludere, che se nel nostro clima facesse più caldo e più asciutto, potrebbesi fare a meno di far venir la manna dalla Calabria. Credo per altro che la manna di Calabria coli più spesso dal tronco e dai rami del Frassino, che dalle foglie; ma ciò non reca una gran differenza, poichè ciò che abbiamo chiamato sugo proprio è ugualmente contenuto nei vasi delle foglie, ed in quelli della scorza.

Potrebbesi ancora riporre nell'ordine della traspirazione sensibile, la secrezione del sugo melato dei fiori, come pure qualche accumulazione d'olio essenziale che trovasi fuori dei vasi delle piante; ma non credo che si possano comprendere in questa classe certi stravasi di sugo proprio, come sono la trementina, la resina, la gomma degli alberi, come quella che chiamasi *Adraganta*, e la gomma arabica: quantunque queste effusioni di sugo possano essere in certi casi vantaggiosi alle piante, sono talvolta a quelle funeste, ed allora nascono quelle malattie di cui dovremo parlare altrove; e poichè ora dobbiamo, per quanto ci è possibile, ristringerci a non trattar di null'altro che di ciò, che alle foglie considerate in se stesse appartiene, mi basta d'aver pro-

provato ch'elleno sono organi di secrezione, senza far parola di quanto operar possa la traspirazione sul moto del sugo. Ora farò vedere, che in certe altre circostanze le foglie sono atte ad eseguire delle funzioni affatto contrarie, imperocchè caricandosi esse dell'umidità sparfa per l'aria, concorrono anch'elleno insieme colle radici a somministrare alimento alle piante.

ARTICOLO III. *Che le Foglie delle piante s'inzuppano dell'umidità che le circonda.*

Ho tagliate delle fronde da diversi alberi, e dopo di aver saldatura la fezione con del mastice, non mi ha recato meraviglia il vederli scemar di peso ed appassirsi, mentre era questo l'effetto della traspirazione a me già noto. Riposi alcuna delle dette fronde in cantine umide; altre ne circondai d'umido atmosfera, ponendole tra umide pezze che da ogni parte le circondavano, senza per altro toccarle. In questi rami per lo avanti appassiti ritornato il primo vigore, si raddrizzaron le foglie, e talvolta diventavano i rami più pesanti di quello fossero appena tagliati. Siccome non poteva quest'effetto nascere da altro che dall'umidità che gli circondava, credo di poter con fondamento concludere, che tale umidità penetrata fosse nei vasi dei detti rami per li pori delle foglie e dei teneri fusti.

Ho messe a Primavera diverse piante, tagliate di fresco, entro delle pezze bagnate; e si sono mantenute fresche e verdi per molti giorni, anzi hanno fatte alcune produzioni, che nascere non potevano se non dall'umido introdotto per le foglie e per i rami, poichè erano le dette piante staccate dalle radici.

Osservasi spesso, che quando l'arsura ha fatto invizzir le piante, si rinverdono alla venuta d'una piccola piovra, ancorchè talmente lieve che null'altro bagni che la superficie della polvere. Non essendo certamente una simile piovra atta a penetrare fino alle radici, egli è probabile che quel vigore, che allora acquistano le dette piante, nasca in parte dall'acqua che hanno esse bevuta principalmente per le foglie loro, quantunque si possa anche dire, che la traspirazione da tali leggiere piove interrotta, contribuisca allo stesso oggetto.

Racconta il Mariotte che tagliato avendo molti rami di Sermolino, di Cerfoglio, ec. ficcome ognuno di questi rami dividevasi in due ramoscelli, gli pose sull'orlo d'un catino pieno d'acqua (vedi

Fig.

Tav. XII. fig. 115. *Fig. 115.*) di modo tale che a qualcheduno, le foglie d'un ramoscello toccavano l'acqua del vaso, e l'altro ramoscello pendeva al di fuori. Altri rami erano posti in guisa che veruno dei ramoscelli loro non tuffavasi nell'acqua, e questi si seccarono presto; ma gli altri conservarono la loro verdura per lo spazio di più di 4 giorni d'estate.

Prese alcuni capi di Cipolla, ed avendoli roversciati (come nella Tav. XIII. fig. 116. *Figura 116 Tav. XIII*) gli accomodò in guisa, che le cime delle foglie esterne, che sono le più lunghe, potessero star nell'acqua, mentre che la Cipolla e le interne foglie stavano all'aria. Pose finalmente altri capi di Cipolla in una tal situazione, ma esposti affatto all'aria: e questi fecero solamente qualche debole produzione, a spese della Cipolla che si appassiva; ma le foglie di mezzo dei primi si allungavano talvolta nello spazio d'un giorno, 3 in 4 pollici, a segno tale che queste piante in buon stato durarono per più di 15 giorni; lo che non da altro nascer poteva che dall'acqua, che attratta veniva dalle foglie, la di cui cima stava nell'acqua.

Il Signor Bonnet della Società Reale di Londra, corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Parigi, ha osservato: 1.° che due foglie, o fogliole di fagiuolo ne hanno nutrita una terza per lo spazio di 6 settimane, e che queste foliole nutritrici si sono ingiallite tre settimane prima delle nutrite. 2.° Che una foliola di Noce ne ha nutrita quattro per 3 giorni. 3.° Che due foliole di Noce ne hanno nutriti tre quasi per lo spazio di otto giorni, ed un'altra volta per lo spazio di 17 giorni. 4.° Che due foglie d'Albicocco ne hanno nutriti altre due per lo spazio di 16 giorni. 5.° Che una foglia d'Albicocco, tuffata affatto nell'acqua, ne ha nutriti altre due per lo spazio di 19 giorni. Provano tutti questi fatti, che le foglie sono provviste di succiattoj, o di vasi assorbenti.

Se si cuoprano con campana di vetro le piante giovani dei meloni che si allevano sopra letti (*), vedonsi, quando il Sole è ardente, del-

(*) Letto, per questo nome s'intende una preparazione d'un quadro di terra fatta con del lettame, e del terriccio, od altri governi per farvi venire dei Poni, delle Lattughe, ed altri frutti ed erbaggi: si fanno in tal guisa venire anche i Funghi, ma non hanno il sapore gustoso dei funghi spontanei. *Vedi alla parola STRATO, o LETTO.*

delle goccioline d'acqua attaccate in cima alle foglie dei detti meloni, ed elleno restano verdi e falde; ma appena levatisi la campana, spariscono le gocce e le foglie appassiscono, quantunque allora sieno meno riscaldate, che per lo avanti. Facilmente comprendesi, che nel primo caso era la detta pianta in un'atmosfera umida, di cui ella appropriavasi una porzione; e che quando alzavasi la campana, dissipava allora il vento quell'atmosfera, ed eccitava una gagliarda traspirazione, la quale non potendo esser così presto riparata dalle radici, faceva che appassissero le foglie.

Se questa esperienza per altro appoggiata ad altre non fosse, dir si potrebbe, che la posta campana potesse aver diminuita la traspirazione, o col fare ostacolo alla diretta azione del Sole, o col ritenere i vapori tanto del letto quanto della pianta; ma nulla v'è che determini meglio la facoltà che hanno le foglie d'inzupparsi, quanto l'esperienza dei Signori Hales e Miller, le quali ho poc'anzi riferite in proposito della traspirazione. Hanno questi dotti Fisici osservato, che quando le rugiade eran copiose, quando l'aria era umida molto, o pregna di vapori, o quando pioveva; le piante, le quali servivano alle loro esperienze, e pesavano più volte al giorno, conservavano il naturale lor peso, ovvero lo accrescevano: non procedendo dunque un tale accrescimento dalle innaffiature, da null'altro nascer poteva, se non dall'umido dell'aria, che le dette piante attraevano.

Se nota non fosse la diligenza, che il Signor Hales impiega nelle sue esperienze, potrebbesi forse credere, che un tale aumento di peso attribuir si dovesse all'umido, che si fosse attaccato alla lamina di piombo, al vaso, ed a tutte le parti della pianta, che serviva all'esperienza; ma troppo è cognita la vigilanza e l'attenzione del Signor Hales, e questo aumento di peso è troppo considerabile (poichè fu trovato di 30 oncie su d'una pianta, che non pesava più di 3 libbre), per non avere verun scrupolo intorno ad un fatto, il quale combina ancora con altri molti.

Il Signor Bonnet intimamente persuaso, che sieno le foglie provviste di succiatoy, o d'organi, che assorbono l'umido dell'aria, e che il detto umido concorra con quello, che sale su per le radici per somministrare alimento alle piante, null'altro si è proposto che di scuoprire se l'aspirazione loro fosse più abbondante da una, che dall'altra superficie; per di sopra, per esempio, o per di sotto delle foglie;

glie; come pure se questa aspirazione fosse uguale a quella, che si fa dal pedicelo.

A tale oggetto, pose il Signor Bonnet sulla superficie dell'acqua, di cui pieni avea alcuni vasi, molte foglie d'una istessa pianta, in guisa tale, che alcune erano umettate soltanto nella faccia superiore, altre nell'inferiore: dei vasi di vetro, come, dei polverini, servirono a questa esperienza.

Ebbe egli l'avvertenza di scegliere delle foglie assai grandi, acciò gli orli delle medesime fugli del vaso si appoggiassero; poichè volendo egli distintamente conoscere l'inzuppamento di ciascheduna delle loro superficie, gli premeva, che non s'immergessero nell'acqua: avea pur l'avvertenza, che il gambo di quelle non si tuffasse: Vedi

Tav. XIII. fig. 117. Fig. 117.

La ruvidezza delle foglie solea far sì, che la di lor superficie tutta intiera non toccasse ben l'acqua; e perciò agir non potendo tutti i fucciatoy, appassivansi talvolta le foglie a tal segno, ch'ei più non sperava di rivederle tornare al di loro primo vigore; ma lo riprendevano tosto che potea la superficie combaciarsi coll'acqua.

Venivano scelte le foglie sane, e verdi, che già fossero della loro naturale grandezza, e molte sempre ponevansi alla esperienza nella positura medesima: in alcune, come ho detto, stava il pedicelo fuori del vaso, ed in altre egli solo era immerso nell'acqua; finalmente a misura che l'acqua andavasi svaporando, altra se ne rimetteva con una picciola siringa, stando bene attenti a nulla scomporre.

Si appigliò il Bonnet ad osservare l'alterazione che provavano le dette foglie, ed il cambiamento del lor colore, prendendo per termine di confronto il tempo in cui elleno la verdura perdevano. Ed infatti, se le foglie che non toccano l'acqua perdono il verde in tre giorni, e se quelle il di cui gambo sta immerso nell'acqua, lo conservano per otto giorni, si può giustamente concludere che la differenza nasce perchè le foglie faranno state nutrite per il gambo immerso nell'acqua. Come pure, se le foglie distese sull'acqua conservano la verdura per tre settimane, pare che concluder si possa a ragione, che stando le foglie in quella positura, attratto abbiano più copioso alimento. Ma in tali confronti valutavasi per niente l'alterazione dell'orlo delle foglie, il quale posavasi sugli orli del vaso, e che non toccava l'acqua. Ciò che potrebbesi obiettare contro questa esperienza, si ri-

fi riduce nel dire, che le foglie distese sull'acqua duravano di più di quelle che toccavano l'acqua col solo gambo; perchè queste potevano maggiormente traspirare, e l'altre al contrario non dovevano niente affatto traspirare.

Siccome doveva la temperie dell'aria influir molto sulle esperienze del Bonnet, d'uopo è l'avvertire, che ella è sempre stata, per una porzione della primavera e dell'autunno, tra i 5 e i 10 gradi sopra il termine del gelo; e che alla fine di primavera, nel tempo d'estate, come ancora in principio d'autunno, ella ha variato tra i 15 e i 20 gradi.

L'*Arum* o il piè di Vacca, il Fagiuolo, il Girasole, il Cavolo, lo Spinace, la Malva piccola, tutte queste piante hanno conservata la lor verdura presso a poco per lo stesso spazio di tempo, tanto umettate nella loro faccia superiore, quanto per quella di sotto. In quanto poi alla Piantaggine, alla Malva grande, e alla Cresta di gallo, ha parso che la superficie superiore delle lor foglie fosse più disposta ad attrarre l'umido della superficie inferiore: la qual differenza fu anche più sensibile nell'Ortica, nel Verbasco, e nell'Amaranto dalle foglie purpuree. Ecco quì lo stato della loro durata, nelle loro diverse positure.

Nomi delle Piante,	umettate per di sopra	per di sotto
Ortica,	2 mesi.	3 settimane.
Verbasco,	5 settimane.	5 in 6 giorni.
Amaranto,	3 mesi.	7 in 8 giorni.

Al contrario poi la superficie inferiore delle foglie ha parso avere qualche vantaggio, quando si è fatta l'esperienza sulle foglie del *Gelapo* o *Bella notte*, e della *Melissa*: questa ha durato 4 mesi $\frac{1}{2}$.

La Malva grande, l'Ortica, il Girasole, il Gelapo, lo Spinace, i di cui pediculi erano immersi nell'acqua, hanno durato meno di quelli che hanno afforbito il fluido per l'una o per l'altra superficie; ma il Gelapo, la Piantaggine, l'Amaranto purpureo, che si sono nutriti per il gambo, si sono mantenuti per più tempo di quelli che per la superficie inferiore alimentavansi. Le foglie del piè di Vacca, e della Cresta di gallo si sono mantenute di più per il loro pediculo, di quelle che sono state applicate sull'acqua da una o dall'altra superficie.

Certe foglie di Vite, che non avevano acquistata per anche tutta
la

la lor grandezza, umettate per la superficie inferiore, hanno durato quindici giorni, mentre che certe altre foglie, le quali non avevano che 8 in 10 linee di diametro, son perite in 5 giorni, con tutto che bagnate nella medesima positura; ed al contrario alcune foglie di mezzana grandezza, bagnate per la superficie superiore, hanno durato più tempo delle foglie grandi. Le foglie piccole, il di cui pediculo stava nell' acqua, si mantenevano più di quelle che giunte erano alla di loro grandezza.

Una osservazione da non trascurarsi si è quella, che nelle foglie che si nutrono per il pediculo, comincia a marcirfi quella parte, poscia la foglia si secca. La maggior parte delle foglie, che stanno sull' acqua, si corrompono, mentre che il lor pediculo che sta per aria si secca; ma succede talvolta alle foglie della medesima specie, che quelle che son bagnate per la superficie superiore, si seccano, mentre che quelle, che lo sono per la superficie opposta, si corrompono.

Rispetto agli alberi ed agli arbusti, come il Lilac, il Pero, la Vite, il Tremulo, il Lauro-Ciriegio, il Ciriegio, il Prugno, il Marrone d' India, il Tiglio, il Moro bianco, il Pioppo bianco, l' Albicocco, il Noce, il Nocciuolo, la Quercia, e la Vite del Canada; tra tutte queste specie, il Lilac e il Tremulo sono le sole, la di cui superior superficie delle foglie sia comparsa avere uguale disposizione ad aspirare alla superficie inferiore. Ma molto singolar, cosa sembrò al Signor Bonnet il vedere delle foglie di Moro bianco, le quali bagnate per di sopra, perivano nel quinto giorno, mentre che le foglie del medesimo albero, che assorbivano l' acqua per la superficie inferiore, si conservavano verdi per lo spazio di quasi sei mesi. Le foglie di Vite, dei Pioppi, del Noce, perirono quasi presto ugualmente, dopo di essere state bagnate per la parte superiore, quanto allorchè restavano tutte in aria. Le foglie di Pero, di Moro bianco, di Marrone d' India, e della Vite del Canada, che attratta avevano l' acqua per il gambo, si sono mantenute quanto quelle che posavan sull' acqua colla superficie superiore. Le foglie della Vite, del Pioppo, del Noce, e del Nocciuolo, che hanno trombata l' acqua per il gambo, si sono mantenute di più di quelle che posavano sull' acqua colla superficie superiore.

Non bisogna sorprendersi di vedere maggior irregolarità nell' esperienze fatte sulle foglie dell' erbe, che su quelle degli alberi. La tessitura

LIB. II. CAP. III. *Della Traspirazione ec.* 143

tura delle foglie delle piante erbacee suol'esser molto fiacca e paracchimatosà; e generalmente, veggonsi più differenze tralle foglie delle piante erbacee, che tra quelle degli alberi: ma siccome queste appartengono più al presente Trattato, egli è bene il sapere, che in generale quasi tutte queste foglie hanno una maggior facilità ad aspirar l'umido colla loro superficie inferiore, che colla superiore.

Prima di passare ad altri riflessi, mi si conceda di fare alcune considerazioni su quella proprietà, che ha la maggior parte delle foglie degli alberi, di bere, cioè, i fluidi più copiosamente colla superficie inferiore, che colla superiore; cioè a dire, con quella superficie, che più o meno obliquamente guarda il terreno, che con quella che stà rivolta al Cielo.

Egli è abbastanza provato, che certe leggiere brinate, nunzie per lo più del bel tempo, formate sono da certe esalazioni, che sollevansi dalla terra, e che queste esalazioni son condensate e rese sensibili dalla freschezza dell'aria: si vede adunque, che quando l'aria è fredda dopo il tramontar del Sole, deve questa freschezza condensare i vapori, che alzati si sono nel calore del giorno; e questo infissimento di vapori produr deve quelle brinate, che si credono uscir la sera dall'acqua o dal sen della terra, come pure quella rugiada, che chiamasi la *guazza*. In quanto alle brinate della mattina, o che diventano sensibili alla levata del Sole, io credo che esse dipendano dall'essere la terra o l'acqua 1500 volte forse più dense dell'aria, e che per ciò conservino per più tempo il calore ricevuto dal Sole, e che ne conservino abbastanza per tramandar quei vapori, che poi l'aria più fredda condensa, e che gli rende sensibili sotto la forma della brinata.

Può farsi la prova, che in tali circostanze la terra e l'acqua conservano più calore dell'aria, col sotterrare, o col tuffare nell'acqua un termometro; poichè vedrassi, che nelle presenti circostanze, il liquore del termometro esposto all'aria si manterrà più basso di quello degli altri termometri.

L'Esperienze di M. du Fay, riportate nelle Memorie dell'Accademia, appoggiano le presenti: quelle provano, che la rugiada s'alza dalla terra; che questo vapore è composto d'un'infinità di picciole goccioline d'acqua, d'una piccolezza estrema, e d'una gran leggerezza, di cui l'aria è pregna, e che dovunque ella vada seco le porta col

col suo moto ondeggiante: per conseguenza, i corpi che s'incontrano con questo acquoso vapore, lo ricevono in tutte le parti della loro superficie, ma più copiosamente entro le parti della inferiore, che della superiore superficie. Lo che potè essere schiarito coll' esporre alla rugiada dei quadrelli di specchio di varie dimensioni, e ponendoli a gradi gli uni sopra degli altri, di modo che i più bassi erano posti distanti un piede dal terreno, e gli altri succedivamente a diverse altezze fino a più di trenta piedi d'elevazione. I quadrelli più vicini alla terra, ricevevano la rugiada prima di quelli più alti; e la loro superficie inferiore trovavasi più pregna d'umido della superiore.

Da ciò rilevasi, che la superficie inferiore delle foglie, la quale, a parere di M. Bonnet, è provvista d'un numero maggiore di vasi assorbenti della superficie superiore, ell'è a portata di ricevere una maggior quantità di rugiada; e se la superficie superiore delle foglie riceve anch'ella una certa quantità di rugiada, non dice già M. Bonnet, che ella sia sprovvista di vasi assorbenti. Oltre di che egli è certo, che vi sono alcune rugiade di densità molto diversa: le gocciollette, che le formano sono più o meno tenui; e quindi deve esservi una gradazione precisa dalla rugiada la più sottile fino alla pioggia la più tenue. Esservi ponno delle rugiade, le di cui goccioline sono abbastanza grosse per cadere a guisa di piccola pioggia; e cadendo una simile rugiada bagnerebbe principalmente il di sopra delle foglie.

Vero si è, che nell'esperienze di M. Bonnet riposavano le foglie su d'una massa d'acqua, e che stando sugli alberi, elleno non possono il più delle volte aspirare altro, che un'umido ridotto in vapori. Una tal circostanza può certamente produrre delle differenze, poichè una organizzazione, che attissima fosse ad aspirar dei vapori, potrebbe anche non essere ugualmente disposta ad aspirare un'acqua radunata in massa. Ma quando ciò fosse, avrebbero l'esperienze del Signor Bonnet almeno la loro applicazione al tempo della pioggia, o delle grandi rugiade. Non bisogna per altro credere, che questa aspirazione possa esser paragonata all'inzuppamento d'una spugna o d'un pezzo di legno secco: dipende questa aspirazione da una particolare organizzazione, poichè le foglie morte e secche non traspirano punto.

Dalle qui riportate esperienze si è veduto, che le piante tirano molt'acqua per i pedicoli delle lor foglie; e siccome egli è abbastanza

stanza fissato, che la superficie delle foglie sia provvista di succiatoy, si è proposto il Bonnet di conoscere se l'acqua, che per il pedicelo passa nelle piante, entri per dei succiatoy analoghi a quelli delle foglie, e se i detti succiatoy sieno nella superficie dei pediculi, o se quest'acqua introducasi per quelle fibre, le quali formano la sostanza delle code delle foglie. A tale oggetto egli mise sulla bocca d'un polverino (come nella *Figura 118*) una lamina di piombo traforata da molti buchi: in ognuno di questi buchi introdusse un gambo d'una foglia d'albero; dico d'albero, perchè le foglie erbacee producono un'effetto un poco diverso. Erano questi pediculi piegati e ricurvi a guisa d'uncino, acciò la estremità loro star potesse fuori dell'acqua; la superficie delli detti pediculi stava nell'acqua per molta lunghezza; e l'estremità, che fermata era sull'orlo del foro da uno spillo, che traversava il pedicelo, restava, come dissi, fuori dell'acqua, ed all'aria.

Le foglie così accomodate si seccarono ugualmente presto, che le foglie, che prive affatto erano d'acqua; lo che dimostra: 1.º che l'acqua, che fu trombata nelle precedenti esperienze, dai pediculi passava per le fibre, secondo l'ordinario corso del sugo: 2.º che quando si difende sull'acqua una foglia d'albero, colla superficie superiore rivolta in alto, non vien l'acqua in tanta copia aspirata dai nervetti, quanto dal parenchimo delle medesime foglie, in cui probabilmente vi sono degli organi particolari, i quali noi per anche non conosciamo.

Io credo, che quanto ho fin qui detto delle esperienze dei Signori Mariotte, Hales, Miller e Bonnet, unito anche alle mie esperienze, sia bastante a provare, che le foglie delle piante provviste sieno d'organi assorbenti, o di succiatoy, che trombino l'umido delle piogge, delle rugiade, e quello ancora, che in guisa meno sensibile stà disperso per l'aria: egli è dunque provato, che le foglie concorrino colle radici a somministrare alimento alle piante, e che il soccorso loro sia certamente utilissimo in molte circostanze.

1.º In quei climi e in quelle posizioni, ove le radici trovansi in un seccissimo terreno, non lasciano però le piante d'esser talvolta vigorose, quando copiose sieno le rugiade.

2.º Se ho detto che gli alberi molto germogliano in legno ed in foglie, all'esposizione del Nord, o del Ponente, questo vigor delle

piante può essere certamente attribuito al traspirar che fanno le piante meno in tali posizioni, che in quella di mezzogiorno; ma mi pare, che anche l'inzuppamento delle foglie vi possa aver molta parte, tanto più ch'egli è provato, che in tali esposizioni sussiste la rugiada fino alle 14 e 15 ore della mattina, ed all'incontro a buonissim' ora disperdesi alle esposizioni del Levante e del Mezzogiorno.

3.° Se riflettiamo, che gl'innaffiamenti a guisa di pioggia, sono più utili alle piante di quelli quando spandesi l'acqua sulle sole radici; e che in estate gl'innaffiamenti della sera sono più vantaggiosi di quelli che si fanno nel giorno, sembra che se ne possa pure attribuire ragionevolmente la causa tanto all'inzuppamento delle foglie, quanto alla diminuzione, che operano gl'innaffiamenti sulla traspirazione.

4.° Se si rifletta, che torna il conto a difendere le piante novelle ed i talli dal troppo Sole, non si vede chiaro, che mentre si diminuisca la traspirazione, si viene a trattenere la sollecita dissipazione dei vapori, i quali, coll'infinuarsi nelle piante, somministrano loro un nutrimento, che non può in quelle venir dalle radici, poichè elleno ne son poco provviste in quegli alberi, che si trapiantano, e che ne sono affatto prive, quando elleno son piante da tallo?

5.° Può questo inzuppamento andar d'accordo colla sospensione della traspirazione, per conservare in buon stato quelle piante, che si tengono nel Moscolo umido, allora quando in Estate o in Primavera da un luogo all'altro trasportansi.

6.° Vedesi, che la brucatura delle foglie deve recar danno alle piante, che provviste son di radici, non solamente perchè in tal guisa si privano d'un'organo, che serve alla traspirazione, ma ancora perchè si viene a togliere dei succiatoy, che contribuiscono a provveder l'alimento.

7.° In alcune circostanze per altro può un tale inzuppamento esser nocivo alle piante: per esempio, quando vanno le annate fresche e piovose, le piante che difese sono dal vento e dal Sole soffrono più dell'altre, perchè i vasi loro sono, per così dire, ingorgati d'un umore, che si corrompe, dal che nasce, che alcune piante allora s'imputridiscono.

8.° Le piante, che s'allevano sotto campane o sotto invetrate bene impiombate e chiuse, ivi stanno in un'atmosfera umida, il quale può essere a quelle in alcune circostanze vantaggioso, ma che per altro

tro le fa spesso marcire, qualora non abbiasi l'avvertenza di lasciare di tanto in tanto dissipare i vapori. Molto importante si è una tale attenzione; poichè trascurandola, si perde molte volte un gran numero di piante in tal guisa tenute, o nelle calde conserve; si ha il dispiacere di vederle piene di muffa, e finalmente morire dopo di averle viste belle e vigorose germogliare.

9.° Si può, come accenna il Bonnet, indebolire un'albero troppo vigoroso, col brucare una parte delle sue foglie.

10.° Si può parimente in tale maniera impedire, che i rami ingordi non spoffino un'albero, e prevenire ancora che non colino i fiori per una troppa abbondanza di sugo.

11.° Devonsi poi risparmiare le foglie degli alberi deboli; poichè ficcome pare, che sia la traspirazione il primo agente del sugo, le foglie contribuiscono a farlo muovere; ed è probabile, che questa causa predomini in certe circostanze sull'inzuppamento, il quale, in altri casi, soccorre ai loro bisogni col somministrar loro alimento. Ma non bisogna per altro prestare una cieca fede ai modi accennati in questi tre ultimi Articoli; anzi sarà bene l'aspettare, che colle molteplici esperienze si riscontrino, e si venga in chiaro della loro efficacia.

Troveremo anche degl'incontri per fare delle applicazioni utili alla pratica dell'Agricoltura, di quella proprietà, che hanno le foglie d'inzupparsi dell'umido che le circonda. Penso anch'io, come il Signor Bonnet, che sarebbe desiderabile, che si potesse giungere al segno di poter paragonare la quantità precisa dell'alimento, che attraggono colle loro radici le piante, con quello che esse aspirano colle foglie. Egli è probabile, che debba questa proporzione variare secondo un numero di circostanze. E a tale oggetto il Bonnet immerse nell'acqua delle piante di Mercorella, che tutte ovali egli aveva scelte. Alcune toccavano l'acqua colle foglie, altre colle radici. In capo a sei settimane, le produzioni delle parti non immerse erano le medesime in tutte le piantine.

Non essendo mia intenzione di fondare un sistema, ma di semplicemente esporre il vero, acciocchè possano gli amatori dell'Agricoltura mettersi in istato d'estendere le loro cognizioni per mezzo di nuove ricerche, io credo di dover qui riportare un'esperienza di M. Guettard, quantunque ella non comparisca troppo favorevole a quell'

inzuppamento, che tanto ben fondato sembra su d'un gran numero d'esperienze fatte da molti abili ed eccellenti Fifici.

Erafi proposto il Guettard di tener delle foglie d'alcuni alberi in un' atmosfera asciutto, ad oggetto d'osservare, se questi alberi acquistassero meno degli altri della medesima specie, le di cui foglie esposte fossero all'aria aperta.

A tale effetto introdusse la testa d'un Arancio giovane in un globo grande di vetro tubulato; la estremità del tubo corrispondeva ad un recipiente ficcato in terra, acciò stasse al coperto dai raggi del Sole. Con tale disposizione, non potevano le foglie del detto Arancio ricever l'umido delle pioggie, nè delle rugiade; ed a misura che andavanfi condensando i vapori della traspirazione, essi colavano per la maggior parte nel recipiente, ove difesi dal Sole non potevano sciogliersi di nuovo in vapori: concludeva dunque M. Guettard, che le foglie del detto Arancio erano in un atmosfera tanto asciutto quanto mai far potevasi. Il qual'albero creduto da lui privo della facoltà d'inzupparfi d'alcuna sorta d'umido, germogliò con maggior vigore d'un' altro lasciato libero all'aria. Fu replicata l'esperienza. L'Arancio, la di cui testa era rinchiusa nel globo di vetro, mandò per traspirazione 2 libbre 10 once 54 grani d'acqua, e ciò nello spazio di quarantasette giorni dei mesi d'Agoſto e di Settembre; e non mostrò d'aver niente sofferto per la privazione delle rugiade.

Io ben sò che dir si potrebbe, che ad onta delle precauzioni usate da M. Guettard, l'albero riuchiuſo nel pallone di vetro ſtava non oſtante in un' atmosfera umido, poichè ivi ſoggiornar dovevano i vapori della ſua traspirazione, fin tanto che la freſcura della notte diveniſſe tanto potente da condenſarli; e che al contrario l'albero, che ſtava all'aria aperta, poteva eſſere diſſecato dal Sole e dal vento. Potrebbeſi a ciò riſpondere, che i vapori di queſta traspirazione, i quali farebbero in tal guiſa ritombati dalle piante, potrebbero anche eſſer loro nocivi. Non può negarſi che non ricevano gli alberi molto alimento dalle radici; e ficcome probabilmente quelle dell' Arancio dell' esperienza di M. Guettard erano in un terreno baſtevolmente bagnato, doveva quell'albero tanto più attrar di quell'acqua, per eſſere la ſua teſta in un'aria calda, e per ciò più favorevole alla traspirazione.

Checchè ne ſia, l'esperienza di M. Guettard, da me riferita tale e
qua

quale egli la espone, deve far nascere dei sospetti, ed impegnare quelli che si applicano alla fisica dei vegetabili, di approfittarsene nelle ricerche ch'essi faranno per fare, onde assicurarsi di più della verità di quella proprietà, che si attribuisce alle foglie delle piante, di concorrere colle radici al nutrimento dei vegetabili. Potrebbero per esempio piantar due alberi della medesima età e della medesima specie dentro dei vasi aggiustati, come il Signor Hales aveva disposto il Girasole della sua esperienza, ed in tale stato riconoscere, dopo averli di tanto in tanto pesati, la quantità che ciascheduno di questi aspirava dalle radici. Dovrà uno di quest'alberi aver la testa chiusa entro d'un globo, come fece M. Guettard; farebbe forse anche meglio fatto di tenere in alto del globo un'apertura, per cui potessero svanire i vapori prima che si condensassero; e per sollecitare questa dissipazione, potrebbero consegnare dentro il pallone un canale o corrente d'aria, per mezzo d'un soffietto, che attraesse il suo vento da una camera molto asciutta, non si trascurerà finalmente di sincerarsi, per mezzo di due termometri, se l'aria nel pallone rinchiusa sia all'istessa temperie di quella al di fuori; poichè se l'albero rinchiuso nel pallone, è in un'atmosfera più caldo di quello che sta esposto all'aria, deve più vigorosamente vegetare, quantunque privo del beneficio delle rugiade.

In tanto che qualcuno s'accinga all'esecuzione d'un'esperienza quasi simile a questa, dirò in comprova dell'opinione di M. Guettard, che comunemente vedonsi dei Giacinti, dei Narcisi, ec. far delle bellissime produzioni sulle mensole dei Cammini ove per tutto il giorno mantiensì il fuoco, e situati nel centro degli appartamenti abitati, e dove l'aria è sempre asciutissima.

ARTICOLO IV. *Delle produzioni, che fanno le piante sradicate.*

S'INCLINEREBBE facilmente ad attribuire all'effetto dell'inzuppamento delle foglie, certe produzioni che fanno le piante, allorchè sono fuori del terreno: io non pretendo già che l'umido inzuppato dalle foglie non abbia parte alcuna alle sue produzioni; ma certamente quei fughi, che erano precedentemente contenuti in quelle piante, vi contribuiscono per la maggior parte, poichè, non ostanti questi nuovi sviluppi, la pianta intiera perde del suo peso: riportiamone qualche esempio.

PARTE I.

K 3

Egli

Egli è noto, che il Semprevivo comune dura per molto tempo, e che anzi egli continua a fare delle produzioni anche dopo ch' egli è svelto dal terreno. Prevenuto da un tal fatto, ho piantato un Semprevivo in un bicchiere di vetro, in cui posta aveva poca e cattiva terra, aridissima; misi il bicchiere nel piatto d'una bilancia posta in una stanza ove non penetrava punto di Sole; da lì a qualche tempo vidi comparir nel centro della detta pianta molte novelle foglie, e crescere qualche nuova pollone intorno a lei; ma a misura che generando andavasi qualche produzione, si seccavano le foglie abbasso, e perdeva la pianta sensibilmente del suo peso. Tutta questa diminuzione di peso io l'attribuisco alla pianta medesima, perchè la terra, contenuta nel bicchiere era, come ho detto, molto asciutta. Confesso per altro, che avrei dovuto aver riflesso alla evaporazione dell'umido della detta terra, per quanto poca ella avesse potuto essere.

Fu dimenticato nel Giardino del Re una rama di Cereo triangolare, la quale fu trovata qualche tempo dopo a caso su d'una tavoletta d'una calda conserva. Era questa rama situata in modo, che una delle sue estremità, la quale corrispondeva all'angolo della detta conserva, era circondata da qualche ragnatello. Questo ramo così dimenticato un'altro ne aveva prodotto lungo più di due piedi, e molto grosso: non avendo io pesato questo primo ramo, nulla potei dedurne dalla mia osservazione, nè prò nè contra lo inzuppamento. Meriterebbe per altro questa esperienza d'essere ripetuta, tanto più che nutrendosi tutte le piante grasse d'una picciolissima quantità di terra, si averebbe campo di restar sorpresi delle considerabili produzioni ch' elleno fanno, qualora fosse ben dimostrato ch' elleno non ritraggono soccorso dall'umido sparso per l'atmosfera.

Scelse il Signor Miller, nel mese d'Ottobre, una radice di Rorastro, ossia Vite bianca, o Brionia, la quale pesava otto oncie e mezzo; rimase quella radice in una conserva calda su d'una tavoletta, sino al seguente mese di Marzo; e si riscontrò ch'egli aveva perduto del suo peso, quantunque fatta non avesse produzione alcuna. Nel seguente Aprile egli aveva prodotto quattro rami, due de' quali erano lunghi tre piedi e mezzo, il terzo quattordici pollici, ed il quarto nove pollici. Tutti questi rami erano provvisti di larghe foglie; ciò nulla ostante questa radice con tutti i suoi rami perduto aveva un'oncia e tre quarti del primo suo peso: in capo a tre settimane ella aveva
per-

perduto altre due oncie e mezza, e finalmente la pianta divenne appassita.

Vedesi da queste esperienze che, se l'inzuppamento contribuisce alle produzioni che fanno le piante prive di radici e di terra, egli è almen certo ch'ei non basta a tutte le loro produzioni, nè al risarcimento di ciò che scappa per la traspirazione, ma che devono queste produzioni in gran parte l'origine ai sughi già contenuti entro la pianta.

Non è già contraria questa proposizione a qualche osservazione che far si potrebbe sulle piante che vegetano; poichè sembra, che in certi casi vi sieno delle foglie destinate a somministrare una parte della loro sostanza alle produzioni che fanno le piante. M. Bonnet ha osservato, e potrà ciascheduno richiamarsi alla memoria questa osservazione, che quando i Cavoli i fiori producono, a poco a poco una parte delle lor foglie si vuota e si dissecca, e che nel tempo medesimo vedonsi, lungo il fusto, spuntar nuove foglie. Lo stesso accade in certe Cipolle, le quali col disseccarsi, producono alcuni bulbetti o spicchi, e delle foglie e dei fiori.

ARTICOLO V. *Se le Foglie facciano l'ufficio di Polmoni.*

ASSICURA il Dottor Grewio di avere osservato nelle foglie delle piante una quantità di vescichette ripiene d'aria. Da tale osservazione, e da una quantità di trachee, le quali chiaramente scorgonsi nei pediculi e nelle principali costole delle foglie, molti Fisici hanno concluso, che le foglie fossero i polmoni delle piante; che questi organi ricevessero l'aria dell'atmosfera; che quest'aria s'introducesse nella pianta, e penetrasse fino alle radici col soccorso delle trachee, e che operasse sul sugo un'effetto simile a quello, che l'aria respirata dagli animali produce sulla massa del sangue loro.

Riporta il Papino un'esperienza che favorisce questa opinione: egli dice che mettendo sotto del recipiente della Macchina Pneumatica una pianta intiera, ella presto vi muore; ma che, se le sole radici vi si rinferino, e che le foglie liberamente giuochino nell'atmosfera, sussisterà per molto tempo la pianta; egli soggiunge che deve questo fatto esser considerato come una prova, che le foglie sieno gli organi della respirazione di tutti i vegetabili.

Quelli che hanno creduto di poter chiaramente dimostrare, se non l'ingresso dell'aria nelle piante, o per dir così, la loro *ispirazione*, l'uscita almeno dell'aria medesima, ossia la loro *espirazione*, hanno adoperati i seguenti modi.

Immergevano nell'acqua chiarissima un ramo d'albero delle sue foglie ornato, e vedevano che nel bollor del giorno, quando il Sole batteva sul vaso in cui stava l'acqua, le foglie e i giovanetti rami si caricavano d'una quantità di bolle d'aria, le quali s'ingrossavano insensibilmente, e dopo avere acquistato un certo volume, si staccavano dalle foglie, e andavano alla superficie dell'acqua. Questa osservazione è stata creduta decisiva; e fin tanto che non son comparse quelle di M. Bonnet, è stato creduto che queste bolle prodotte fossero dall'aria che usciva dalla pianta, dopo che rarefatta fosse dal calor del Sole, e che quest'aria resa fosse sensibile dall'acqua circondante; ma avendo il Bonnet replicata l'istessa esperienza con maggiore attenzione, ha osservato:

1.° Che le bolle dell'aria non si formano se non quando il Sole abbia scaldato il vaso contenente le foglie.

2.° Che il numero e la grossezza delle dette bolle vanno crescendo a misura che l'acqua si riscalda.

3.° Che le foglie diventano più leggiere, e che tendono ad avvicinarsi alla superficie dell'acqua.

4.° Che la faccia inferior delle foglie è più carica delle bolle d'aria della superiore, e che pare che le bolle più grosse escano dagli angoli delle costole, ma senza essere aderenti alle costole principali.

5.° Che veggonfi ancora alcune bolle su i pedicoli delle foglie, e su i rami giovani.

6.° Che le dette bolle erano talmente aderenti alle foglie, che quando scrollavasi il ramo, pochissime se ne staccavano.

7.° Che tutte quelle bolle sparivano dopo il tramontar del Sole.

8.° Che il giorno dopo ricomparivano, quando aveva il Sole alquanto scaldato l'acqua del vaso; ma non erano in tanta copia, ed il lor numero andava sempre scemando, di modo che in capo a qualche giorno, quantunque il calor dell'aria si facesse maggiore, altre bolle attaccate alle foglie non apparivano.

9.° Fin quì s'inclinerebbe a credere, che le bolle fossero un'effetto d'una sorta di traspirazione dei vegetabili; che la espirazione si fa.

facesse durante il calor del giorno, e la inspirazione al raffreddarsi dell'aria, e che le bolle sparissero, allorchè l'aria fredda ferrati avesse gli organi della respirazione; ma l'esperienza ch'io sono per riportare alterano e sconvolgono tutto questo raziocinio.

10.° Il Signor Bonnet fece bollire dell'acqua per tre quarti d'ora, per ben purgarla dall'aria; fredda ch'ella si fu, dentro v'immerse gl'istessi rami della precedente esperienza; ma quantunque ardentissimo fosse il Sole, non scorfe sulle foglie alcuna bolla.

11.° Fece poi l'inverso di questa esperienza, e quindi, dopo aver caricato d'aria una certa quantità d'acqua, per mezzo d'un soffietto, i rami in quella immersi, essendo l'aria calda, si caricarono imminente di bolle d'aria, le quali erano anche più grosse di quelle che viste aveva nell'acqua ordinaria.

12.° Il ramo dell'articolo non mandando più bolle, fu trombata l'acqua con un cannello, ed altra nuova acqua fu sostituita: di là a qualche ora, comparve una quantità di bolle d'aria sulla faccia inferiore delle foglie.

13.° Sparite queste bolle, si cambiò parimente quell'acqua, ed altre bolle d'aria pure si videro attaccate alle foglie, ma in minor quantità.

14.° Riuscirono queste medesime esperienze su delle foglie di piante erbacee, del pari che su quelle degli alberi; e tanto su dei pezzetti di foglia, come sulle foglie intiere.

15.° Egli è noto, che i corpi immersi nell'aria restano bagnati, per così dire, da quel fluido, nell'istessa guisa che que' corpi medesimi tuffati nell'acqua ne restano inumiditi, cioè a dire, che l'aria si attacca ai corpi immersi in quel fluido. Essendo il ferro specificamente molto più grave dell'acqua, egli deve precipitare al fondo: ma pure un'ago sottilissimo e bene asciutto galleggia sull'acqua, lo che si attribuisce all'essere molte particelle d'aria attaccate all'ago, le quali lo fanno galleggiare: ma togliendo queste particelle d'aria collo strofinar l'ago nell'acqua, più allora non galleggerà. L'oro è ancora molto più grave dell'acqua, ma pure una foglia d'oro battuto, quantunque fermata apposta nel fondo d'una tazza per mezzo d'un picciolo peso posto nel di lei centro, cerca cogli orli suoi di ascendere alla superficie: d'onde nasce questo, se non perchè le foglie dell'oro battuto, esaminate col microscopio, son traforate da molti buchi?

chi? Possono dunque esser considerate queste foglie d'oro come tante reticelle, tralle cui maglie vi restino delle molecole d'aria, le quali sieno in tanta copia che basti ad annientare il peso dell'oro; e queste molecole divengono sensibili quando son rarefatte dal caldo, poichè allora si manifestano in forma di bolle. L'adesione dell'aria ai corpi solidi si manifesta in guisa anche più sensibile, in un pezzo di tela rada tuffata nell'acqua.

16.^o Riflessioni presso che simili a queste, impegnarono il Bonnet a immolare, ed a ben lavare, per dir così, nell'acqua le foglie ch'egli voleva sommergere, come pure il vaso in cui dovevano essere immerse. Tutte quelle foglie ch'ei poté umettare perfettamente, pochissimo, o niente si caricarono di bolle d'aria, e se qualcheduna ve ne comparve, ciò fu perchè egli è difficilissimo il poter perfettamente bagnare certe foglie che son ricoperte della loro naturale vernice, su di cui l'acqua non si attacca.

17.^o Da questa esperienza ne viene, che le bolle d'aria non nascono già da quella contenuta entro la pianta, ma da quella che è aderente alle sue parti esterne, e che quest'aria non fa sì sensibile se non quando venga rarefatta dal caldo.

18.^o Ma perchè dunque non veggonsi le bolle d'aria su quelle foglie, le quali senza che sieno lavate coll'acqua, sono state tuffate in quel fluido purgato dall'aria? Ciò nasce perchè l'acqua discioglie molta aria; e perchè cerca d'impregnarsene fino ad un tal punto, che anzi talvolta ella se ne impregna oltre modo; e quindi quell'acqua, già purgata dall'aria, essendone divenuta avidissima, s'impregna di quella che le foglie ricuopre, prima che le bolle si sieno potute formare.

19.^o Le esperienze fin qui riportate riusciranno ugualmente, se, in vece di foglie verdi, si adoprinno le foglie morte e secche; lo che prova benissimo, che la formazione delle bolle d'aria è indipendente dalla vegetazione, e ch'ell'è simile a quelle che si formano su d'una foglia d'oro, su d'un pezzetto d'oro, su d'un pezzo di tela, ec.

20.^o Tutte adunque le osservazioni fatte sulle bolle d'aria in verun conto non provano, come credevasi, che vi sia nelle piante dell'aria rinchiusa, nè che la detta aria, in qualche maniera, faccia quegli uffizj medesimi di quella che gli animali respirano. Queste sono le conseguenze che malamente si tiravano da una osservazione, che, pri-

prima di M. Bonnet, non era stata fatta con tutta la dovuta attenzione e diligenza.

21.^o Non bisogna per altro da tutto ciò concludere, che l'aria in alcun modo alla vegetazione non sia necessaria; molte ragioni provano anzi l'opposto. Pare che il fugo ascenda nelle piante in forma d'un vapore; e siccome ell'è cosa certa, che molta aria vi è nei vapori, vi deve esser dunque molta aria nelle piante; e probabilmente quest'aria medesima, che ivi non è stagnante, vi entra, vi esce, e si rinnova. Quando parlerò delle lagrime della Vite, e dell'altre piante da cui sgorga molta linfa in tempo di Primavera, farò osservare che insieme con questa linfa esce molt'aria.

Le osservazioni di tutti quelli, che si sono applicati intorno all'Anatomia delle piante, c'insegnano ch'elleno rinferrano molt'aria, e che ella vi sta rinchiusa entro de' vasi particolari da quelli chiamati *Trachee*, le quali si trovano vuote d'altri liquori una parte almeno dell'anno. In tal caso, questi vasi conterrann'eglino un fugo ridotto in vapori, oppure l'aria che essi rinferrano, è ella pura e diversa da quella che è mescolata col fugo? Questo è quello ch'io non avrei il coraggio di decidere.

Per mezzo della macchina pneumatica s'estrae molt'aria dai vegetabili; e siccome le osservazioni, le esperienze, e molte plausibili ragioni ci convincono e ci obbligano a credere, che nei vegetabili vi si rinchiusa molt'aria, rimane a sapersi per dove ella entri, e per dove ella n'esca.

Hanno preteso alcuni che l'aria entrasse nelle piante solamente per le foglie; altri che ciò seguisse per le radici; ed altri finalmente han creduto, che quella per ogni parte vi si introducesse.

Riporterò l'esperienze fatte dal Signor Hales, per provare che l'aria è aspirata dalle piante, nell'istessa guisa che il fugo. Sebbene abbia io già parlato di queste esperienze, credo di doverle ciò non ostante presentare sotto altro punto di vista.

Avendo accomodato, servendosi del mastice *n*, il tubo *i*, (*Vedi Lib. I. Tav. II. Fig. 25.*) al ramo *b* provvisto di foglie; unì nell'istessa guisa, un tubo *z* sottilissimo, abbasso del tubo grosso *i*, col nodo del mastice *c*; senza riempire d'alcun liquore i tubi *z* ed *i*, gli bastò di far toccar l'acqua all'estremità del tubo *z*, contenuta nel vaso *x*: l'acqua allora s'alzò nel tubo *z* molti pollici; lo chè prova, che il ramo *b* aspirava l'aria contenuta nel tubo *i*.

Per

Per meglio conoscere per dove potesse introdursi l'aria nei vegetabili, prese M. Hales dei bastoni di Betula e di Viscioło (*vedi ivi Fig. 26.*) come appunto n : mise la cima loro a tuffar nell'acqua del vaso x , ricoperse di mastice le cicatrici b , a , z , n , ove erano stati dei bottoni; quindi fece passare i detti bastoni per l'apertura superiore del recipiente tubulato $p p$, il quale posava sul piatto d'una macchina pneumatica. Ebbe l'avvertenza di ben saldar col mastice quei bastoni nell'apertura $p p$ del recipiente; e dopo aver trombata l'aria, egli vidde per molti giorni, e fino a tanto ch'ei tenne il recipiente senza aria, dei fili di bolle d'aria uscir dall'estremità x dei detti bastoni. Ciò solamente prova che l'aria, essendo caricata dal peso dell'atmosfera, può trapassare i pori del legno, ovvero i vasi legnosi.

Dopo avere poscia coperto col mastice la cima dei bastoni sopra n , si accorse che andava scemando il numero e la grossezza delle bolle. Ma siccome si andava tuttavia vedendo alcune di quelle bolle, se ne può concludere che esse provenivano dall'aria che entrava a traverso della scorza, da z fino in n .

Debbo avvertire, che il Signor Hales osservò che quelle bolle d'aria uscivano non solamente dalle fibre corticali, ma ancora da quelle del legno, e particolarmente da una parte del corpo legnoso, dove le bolle erano più grosse e in maggior numero che altrove.

Per saldare le aperture della scorza, per cui poteva penetrar l'aria, M. Hales pensò di accomodare con del mastice sopra del recipiente un tubo $y y$, ch'ei riempì d'acqua: allora scemarono le bolle, ed un'ora dopo non se ne vidde alcuna; ed anche allora che fu votata con un sifone l'acqua che era nel tubo $y y$, i vasi gonfiati dall'acqua non permettevano altrimenti all'aria di attraversarli. Ma avendo M. Hales presentata al fuoco, e seccata la parte $z n$ del bastone, ricomparvero le bolle dopo che di nuovo era stata trombata l'aria del recipiente.

Un'altro ramo, accomodato nell'istessa maniera, ma in positura rovesciata, cioè, colla cima sottile abbasso, produsse il medesimo effetto.

Dopo avere M. Hales replicate queste istesse esperienze sopra dei rami di diversa specie d'alberi, ha osservato: 1.º che vi erano alcune specie d'alberi che non si accomodavano a tale esperienza. Io cre-

credo, per esempio, che comparir non dovesse alcuna bolla in x , quando si adoperava un fermento di vite, perchè l'aria doveva suggire per tutti i punti del fusto della detta pianta, cominciando dalla superficie dell'acqua sino in alto del recipiente: 2.° Che l'aria trapassa molto più difficilmente la scorza degli alberi giovani, che quella delli rami più vecchj. 3.° L'aria entra specialmente con molta facilità per le cicatrici, quando non abbiassi l'avvertenza di ben risaldarle col mastice.

Queste due osservazioni dimostrano, che l'esperienze di M. Hales non ci rischiarano abbastanza, nè ben ci additano per quale strada l'aria entrar possa nelle piante, potendo il peso dell'atmosfera determinarla ad aprirsi un passaggio, ch'ella forse non percorre secondo l'ordine della vegetazione.

4.° Avendo M. Hales sostituito ai rami, di cui si era prima servito, delle radici, l'aria le trapassò più agevolmente, in qualunque positura che collocate le avesse, cioè, tanto mettendo abbasso la cima grossa quanto la sottile. 5.° Se dopo avere riempito d'acqua il tubo $y y$, egli pigiava o sopprimeva quella del vaso x , allora l'acqua colava nel detto vaso; lo che prova che i vasi delle radici sono più grandi di quelli dei rami: ma crescendo anche più la pressione, può costringersi l'acqua a trapassare anche i più grossi legni, e compatti quanto mai esser lo possano. Lo che appunto vien provato dall'esperienza di M. Camus, che ho riportata nel Libro I. pag. 49.

Chechè ne sia, egli è certo che i vegetabili contengono molta aria; ed a tal proposito non posso fare a meno di fare osservare che questo fluido ivi può essere in diversi stati. Io qui mi spiegherò più chiaramente di quello abbia fatto nel primo Capitolo.

Quando si veggono delle bolle d'aria uscir fuori da una tazza di Thè infuso, in cui sia messo del zucchero, si attribuiscono le dette bolle all'aria frapposta tralle molecole dello zucchero, la qual'aria, rarefacendosi, s'alza verso la superficie. Non può supporci che siavi una gran quantità d'aria in un pezzo di ferro che vien fuori dalla fucina, ove egli stava quasi in fusione, come neppure nell'olio di vetrolo tenuto sul fuoco per fissarlo o concentrarlo. Ma se si mescolano queste due materie in un recipiente di vetro, al di cui collo sia attaccata una vescica strizzata o compressa, e vuota d'aria quanto mai si possa, ella si vede venir gonfia per l'aria che esce da quella dissolu-

soluzione. La qual'aria, che in alcune dissoluzioni è molto abbondante, si conserva nel medesimo stato per molto tempo. Altre esperienze, molto simili a queste, assai ripetute e moltiplicate da M. Hales, l'hanno indotto a concludere, che l'aria poteva essere in due stati diversi. 1.º Che quando ell'era priva della sua elasticità, allora ella formava una parte dei corpi solidi. 2.º Che ogni qualvolta ella riprendeva la sua elasticità, ella diventava fluidissima, ed acquistava tutte le proprietà dell'aria, che si respira. Dopo aver dunque provato il Signor Hales, che certi mestugli producono molta aria elastica, e che alcuni altri assorbono l'aria, o le fanno perdere la sua elastica proprietà, egli dubitò, che possa entrar nel sugo un'aria non elastica, la quale dopo che ha ripresa la sua elasticità nella pianta medesima, vi occupa un grandissimo volume, e poscia si manifesta sotto la forma dell'aria che si respira.

Io non nego, che possa l'aria entrare per nessuna parte delle piante; anzi io credo, che in gran copia ella vi s'introduca col sugo, talvolta per le foglie, ed abbondevolmente per le radici. Poichè essendo probabile, che il sugo ascenda nelle piante in uno stato d'una massima rarefazione, si può ragionevolmente congetturare, che insieme con quello molt'aria introducasi. Per potere spiegare quali sieno sopra di ciò le mie congetture, d'uopo sarebbe di parlare del moto del sugo. Questa è una materia, che sarà trattata nel quinto Libro.

ARTICOLO VI. *Esperienze fatte per sopprimere la traspirazione e l'inzuppamento del sugo, o per impedire l'introduzione e lo svanimento dell'aria per le foglie.*

Egli è certo, che le proprietà che hanno le foglie, e le parti ancor tenere dei vegetabili, di traspirare e d'inzupparsi dell'umido delle rugiade, e di caricarsi d'una gran quantità d'aria, devono molto contribuire all'accrescimento loro ed alla loro esistenza. Per arrivare a conoscere fino a qual segno elleno influiscano sulla vegetabile economia, ho studiato di porre degli ostacoli a queste secrezioni ed a questi inzuppamenti. Ho creduto sul principio di potervi riuscire, collo strofinare per di sopra e per di sotto le foglie con del miele: pareami questo glutinoso corpo attissimo a turare i pori assorbenti o escretorj; ma non produsse alcun sensibile effetto. L'umido delle rugiade, e forse quello ancora della traspirazione, inteneriva il miele,

e ren-

e rendevalo troppo colante. Le foglie di miele impiastrate conservavano quasi tutta la lor verdura, come se neppur non fossero mai state tocche. Lo sciroppo di Zucchero non produsse un' effetto più notabile.

Ho creduto di meglio riuscirci servendomi della colla forte; cercai dunque di cuoprir ben delle foglie con un sottile strato della detta colla ben stemperata; ma siccome quasi tutte le foglie sono coperte da una specie di vernice grassa, la quale impedisce, ch' elleno sieno tutte bagnate dall'acqua; trovai molta difficoltà a cuoprire esattamente tutta la superficie delle dette foglie coll'acqua di colla. Un'altro ostacolo incontrai, veramente impensato, alla perfetta applicazione della detta colla, e che mi obbligò di sostituire all'acqua di colla una soluzione di gomma arabica: se adoperavo la colla molto calda, per renderla più scorrevole, allora ella danneggiava le foglie; se tepida l'adoperava, ell'era troppo fissa, e mal distendevasi sulle foglie; ma avendo pensato di passarvi sopra un'acqua gommata, allora le foglie esattamente cuoprivansi, e non ne risentivano danno maggiore di quello che arrecato avesse loro lo sciroppo inzuccherato. Nei giorni caldi ed asciutti s'ingiallivano le foglie; ma se faceva tempo coperto, se copiose erano le rugiade, se sopravveniva la pioggia, gli strati della gomma o della colla s'intenerivano, e riprendevano le foglie la naturale verdura. Ho eziandio veduto, che queste sostanze non si seccavano affatto giammai. Stimai dunque meglio di adoperare alcune materie, che l'umido non disciogliesse, e perciò mi servii della vernice fatta collo spirito di vino. Ne rimanevano le foglie così presto danneggiate, ch'io mi figurai, che in altra guisa agir non potesse la detta vernice se non col formare un' ostacolo alla traspirazione ed allo inzuppamento; e mi parve di conoscere, che ella agisce anche più direttamente sulle parti solide o fugli umori, e che da questa azione ne risultasse un disordine negli organi così celere quanto quello, che dalla grandine vien prodotto. Ciò che mi confermava sempre più in tale idea, si è che avevo veduto, che le foglie d'un ramo di Ciriegio avevano in brevissimo tempo perduta la lor verdura, per essere state sospese sopra d'un vaso grande di pietra, ove in fondo erano delle piante poste in fusione nello spirito di vino. Se dunque i soli vapori del detto spirito avevano tanto presto potuto alterare il color delle foglie del detto ramo di Ciriegio, poteva bene a ragione concludere, che il contatto immediato della detta

ta vernice dovesse immancabilmente alterare le foglie delle piante. Per altro lo spirito di vin puro disteso su d'una foglia con un pennello, non vi ha prodotta l'alterazione medesima, che prodotto aveva la vernice: lo che probabilmente farà, perchè lo spirito troppo rapidamente svanisce. Comunque siasi, per salvar le foglie dall'immediato contatto della vernice, principiai dal cuoprirle d'uno strato di colla; ed acciò ella non fosse dalle rugiade intenerita, pensai di cuopirla con uno strato di vernice: tutto questo per altro riuscì malissimo; poichè in tal guisa la colla non cuopriva esattamente le parti tutte delle foglie, per le quali parti introducevasi la vernice; oltre di che quella vernice a stento applicavasi su quelli strati di colla, che non trovavansi mai ben secchi. In conseguenza di queste diverse circostanze, alcune delle mie foglie divennero nere in più luoghi, ed altre senza alterarsi serbarono il colore.

Risolli dunque di adoperare una vernice grassa ed oleosa; ma le foglie di quella coperte si annerirono ed in breve seccaronsi. Un tale accidente è egli stato prodotto dall'interruzione della traspirazione, o dall'ostacolo all'inzuppamento, o perchè l'olio della vernice, che si sarebbe potuto introdurre nei vasi della pianta, gli avesse ostruiti, o alterati i fughi in quella contenuti? Questo è quanto non ho potuto bastevolmente schiarire.

Avendo il Signor Calandrino immerso un tralcio di vite nell'olio di noce, le di lei foglie presto perirono. M. Bonnet, che riporta questa esperienza, soggiunge, ch'egli ha voluto replicarla su dei rami di diversa specie d'alberi; ed in conseguenza egli ha osservato, che generalmente le parti erbacee e delicate erano più spesso danneggiate di quelle di tessitura più forte. Dei giovani rampolli si sono anneriti nello spazio d'un giorno o due, mentre che altri più attempati rampolli si sono senza annerirsi semplicemente seccati; ovvero, le foglie son cadute per anche verdi, come in Autunno succede. Le foglie del Lauro-Ciriegio, e quelle dell'Amaranto dai fior pendenti, si sono conservate per molti mesi, quantunque d'olio ricoperte. In Autunno un tralcio di vite affodato, tuffato nell'olio per trent'ore, ne uscì apparentemente sanissimo, ma da lì a qualche giorno perdè tutte le foglie. Pare che l'olio di noce non troppo s'innoltri nei vasi delle piante; poichè le foglie più vicine a quelle tuffate nell'olio, in verun conto soffrirono. M. Bonnet ha fatte delle esperienze,

ze,

ze, che possono confermar questo fatto: ha immerso il pedicelo di diverse foglie d'alberi e d'erbe nell'olio d'oliva: le foglie d'albero già pervenute alla naturale grandezza, non hanno attratto punto d'olio; le foglie erbacee poco ne attrassero; ma in una foglia d'Amaranto porporino, che più dell'altre attratto ne aveva, lungo le costole principali, alcune nere macchie scorgeansi.

Soggiunge il Bonnet, che avendo osservato, che le foglie pareangli più danneggiate, allorchè per di sotto erano state strofinate coll'olio, di quello, che pareffero allorchè era stata unta la superior superficie, egli volle dilucidar questo fatto; e per riuscirvi, egli pensò di mettere sulla superficie dell'acqua delle foglie di Lilac, di modo che l'acqua in alcune toccar non potesse se non la superiore superficie, in altre la inferiore: quella delle due superficie, che non toccavano l'acqua, fu strofinata coll'olio. Egli ha osservato, che le foglie, che posavano sull'acqua colla loro superficie inferiore, aveva durato più dell'altre.

Variò molto il Bonnet le sue esperienze: aveva anch'io disposte le foglie delle mie esperienze in diverse guise; ma non avendomi nè le une nè l'altre presentato i risultati ch'io bramava, credo di aver detto abbastanza per animare i Fisici a seguitare le medesime esperienze, coll'usare delle nuove diligenze.

Avendo detto di sopra, che il vapore dello spirito di vino attaccava gagliardamente le foglie, credo di dover qui riportare dell'altre esperienze fatte da M. Bonnet, ad oggetto di riscontrar se le piante attrar potessero qualche sorta di nutrimento dall'acqua vite. Le piante ch'egli adoperò per tali esperienze hanno attratto questo liquore con forza maggiore di quella attraggano l'acqua comune; ma il pedicelo si scorciò, e le foglie si seccarono più presto di quelle, che restate erano all'aria; e quello che è più singolare si è, che M. Bonnet ha osservato, che vi erano lungo le costole principali, delle striscie di color scuro, che andavano seguitando la direzione delle fibre: erano quelle probabilmente prodotte dall'acquavite attratta dalla pianta.

Ho tinto con dell'ocra macinata con dell'olio il tronco e i rami d'alcuni Prugni giovani pieni di *Licbene* e di moscolo: morirono queste piante parassite, e non parve che gli alberi patissero; mi sembrò per altro, che venissero meno grossi degli altri, e che più debolmente germogliassero.

PARTE I.

L

Chec-

Checchè ne sia di tutte queste osservazioni, ell'è cosa molto probabile, che sieno le foglie provviste di succiatoj, i quali si caricano dell'umido dell'aria, e non può revocarsi in dubbio la comunicazione, che hanno le foglie coll'altre parti delle piante a cui esse appartengono. Si ponno dunque, in una certa maniera, considerarle le foglie come tante specie di radici, le quali radunino colla di loro molto estesa superficie i vapori e le esalazioni vaganti per l'aria; ed abbiamo detto di sopra, ch'esse erano gli organi principali della traspirazione: son dunque dotate le foglie, come lo è la pelle degli animali, d'organi escretorj e d'organi assorbenti. Può anche tenerli, almeno come cosa probabile, che una parte dell'aria contenuta nelle piante vi s'introduca per i loro pori, unitamente all'umido delle rugiade. Tutte queste cose, le quali sono abbastanza stabilite, hanno indotto i Botanici a reputare i peli, e le rugosità che cuoprono le foglie, come tanti organi destinati a diverse funzioni; e quindi non sembrerà fuori di proposito ch'io qui tratti di queste parti, tanto più ch'elleno comunemente si trovano in maggior quantità sulle foglie, che sull'altre parti delle piante.

C A P I T O L O I V .

DEI PELI, DELLE SPINE, DELLE MANI O VITICCI DELLE PIANTE.

ARTICOLO I. *Dei Peli, e dei Corpi glandulosi, che sono sulla superficie delle piante.*

POCHE sono le parti delle piante, che non si trovino talvolta coperte di peli: sogliono le foglie specialmente esserne più d'ogn'altra vestite: e vedonsi anche talvolta o sulla loro superficie, o sugli orli, o su i pediculi, delle concrezioni, che sembrano glandulose.

Non intendo già di assicurare, che queste concrezioni sieno tante glandule; anzi mi dichiaro d'aver fatto indarno molti tentativi per scuoprire l'organizzazione di certe macchie, che si vedono su i novelli rami dei Peschi, le quali a mio parere non si ponno meglio para-

paragonare che alla *Scabbia-infetti*, che ordinariamente chiamansi *Cimici d'Arancio*. Servendomi per altro di questo nome, non mi diparto in verun conto da quanto ha creduto la maggior parte di quelli Autori che hanno trattato dell' Anatomia delle piante; ammetto anche i peli, come parti vascolose. Molti di questi Botanici hanno detto che le pelurie, che sulle foglie scorgonsi, sono tanti organi secretorj, escretorj o assorbenti, per i quali le piante si sgravano della loro traspirazione, e per i quali esse aspirano l' aria ed i vapori che in quelle son sparsi. Se tali funzioni non vengono loro per anche incontrastabilmente accordate, almeno si ha tanto in mano da poterle ad essi attribuire, come una cosa verisimile.

Ed infatti, siccome quasi tutti questi peli sono piantati su dei piccioli corpi simili a quei bulbi da cui nascono i peli degli animali, egli era naturale il considerare questi piccoli corpi come tante glandule cutanee, il di cui uffizio si è quello di lasciar fuggire la insensibile traspirazione. Le materie viscoso le quali intonacano molte specie di piante, come per esempio il *Labdanum* che si raduna sulle foglie del Cisto, le varie sorte di manna che si trovano sulle foglie degli Aceri e dei Larici, i granelli resinosi o gommosi che si raccolgono sopra dell' altre piante, mostra tutto questo che i vegetabili provvisti sono d'organi escretorj, e che i corpi glandulosi di cui ragionasi, sono di questo genere. Nulla v'è che tanto appoggi una tale opinione, quanto una specie di *Martinia* che mi venne mandata dalla Luigiana, nella quale i finissimi e sottili peli, che le foglie, i frutti, e i fiori della detta pianta ricuoprono, terminan tutti in una gocciolletta di liquor trasparente, viscoso e odoroso, qualità che fanno conoscere che quel liquore trasfuda dalla pianta medesima, e non già ch'egli sia deposto dall'aria su i peli che la rivestono.

Vi è luogo di credere che una parte degli organi, che colle lenti e i microscopj sulle foglie distinguonsi, sieno veri vasi assorbenti: si crede in medicina, che nell'uso dei bagni, una parte dell'umido entri nella massa del sangue; sono talmente sensibili gli effetti delle docciature, che non lasciano luogo a dubitare che l'acqua non penetri nell'interno dei membri dei corpi a quelle soggetti: la salivazione che nasce dalle freghe mercuriali, i bruciori nell'orinare che soffrono quelli a cui s'applicano le cantaridi, sono tante prove che la pelle di tutti gli animali sia piena di organi assorbenti. Ho detto di

sopra, che quasi tutti i Fisici credono che anche i vegetabili sieno almeno ugualmente provvisti di questi organi, quanto gli animali; ma la difficoltà in cui trovansi gli Anatomici intorno alla distinzione degli organi escretori dagli organi assorbenti degli animali sussiste ugualmente riguardo a quelli dei vegetabili. Non v'è altro adunque che le ragioni d' Analogia, che possano far ammettere i peli e gli altri organi glandulosi, come organi capaci di eseguire le accennate funzioni.

Bisogna ricordarsi che l'esperienze di M. Bonnet riportate di sopra, lo avevano indotto a credere che le superficie inferiori delle foglie attraessero comunemente più i liquori, che le superiori delle medesime foglie: quindi, essendo ordinariamente le foglie più fornite di peli nella superficie inferiore che nella superiore, se ne potrà concludere con qualche verisimiglianza, che i peli ed i corpi glandulosi delle foglie ponno essere alle volte organi d'aspirazione. A questo io ristringo la discussione di tali congetture, e credo che quanto ho qui detto bastar possa ad eccitare i Botanici a fare ogni sforzo per arrivare a conoscere, in modo più diretto e più sicuro, l'uso di queste parti. Terminerò il presente Articolo colla più ristretta esposizione delle osservazioni fatte da M. Guettard sulle diverse forme che prendono i peli ed i corpi glandulosi delle piante.

Ho poc'anzi parlato della reticella delle fibre longitudinali, la quale, per così dire, forma lo scheletro delle foglie piegate dalla tessitura cellulare. Talvolta accade, che molte fibre considerabili venendo a far capo ad un piccolo ammasso della detta cellulare tessitura, la gonfiano e l'obbligano a prendere la forma dei diversi piccoli corpi ch'io m'accingo ad esaminare. Anch'io, come M. Guettard, gli chiamerò glandule, senza per altro pretendere ch'eglino sempre facciano le funzioni di quelle. Dopo avere M. Guettard esaminato attentamente la figura di queste glandule, le ho disposte in sette classi, le

Tav. XII. fg. 119. di cui figure ponno vederfi nella Tav. XII. Fig. 119.

1.^o Le glandule miliarie (a): Sembra che queste sieno tanti piccioli punti a mucchietti, ove con molta regolarità veggonsi distribuiti due a due, tre a tre, quattro a quattro, ec. Vi sono alcune foglie di certi alberi, sulle quali appena se ne distinguono; ma in punta a tali foglie scorgonsi certe rugosità, dalle quali cola una resina molto chiara. Trovansi queste regolarmente disposte sulle foglie dei

Pi-

Pini e degli Abeti, ed irregolarmente su quelle dei Cipressi, de' *Tbuya* o sia albero della Vita, e del Cedro dalle foglie di Cipresso.

2.° Le glandule vescicolari (*b*): queste sono tante piccole vesciche, le quali sembrano formate da un sugo travasato, che potrebbe aver gonfiato una piccola porzione della tessitura cellulare: manifeste appaiono sulle foglie dell' Iperico, dell' Arancio, della Ruta, del Mirto ec.

3.° Le glandule squamose *c*: somiglian queste a tante laminette squamose, circolari, o bislunghe; non sono queste accolte dentro veruna cavità: se ne veggono sulle foglie delle Felci.

4.° Le glandule globulose *d*: tra queste ve n' ha delle meno e delle più sferiche: trovansi più comunemente sulle piante dal fior labiato.

5.° Le glandule lenticolari *e*, le quali sono della figura d' una lente, ma più o meno bislunghe: molte di queste vedonsi sui teneri rampolli degli alberi, e particolarmente sulla Betula, sull' Ontano, sul Terebinto e sull' albero della Vita.

6.° Le glandule fatte a boccia *f*: così chiamate, perchè aprendosi elleno mostrano una cavità: ve n' ha delle tonde, dell' ovali, delle impuntite, o della forma d' una doccia ritorta. Trovansi ordinariamente su i pediculi e sulle nascenti foglie dei Pesci, degli Albicocchi, dei Ciriegi, dell' Acacie o Gaggie, o in punta alle dentature di molte foglie.

7.° Le glandule otricolari *g*, le quali null' altro sono che tante vescichette che veggonfi sull' Aloe, sul Semprevivo o sul *Sedo*, sulle Ficoidi, sul Guado. Osserva M. Guettard ch' egli è difficile di decidere se queste glandole sieno produzioni naturali, o se prodotte sieno da qualche malattia delle piante.

Passa poi questo dotto Fisico all' esame dei peli o dei filetti, ed a quello delle poppine da cui essi spuntano: questo è un oggetto che presenta molte varietà. Sulle piante leguminose e col fiore fatto a rosa, si trovano dei filetti Cilindrici *b*: sulle Malvacee e le Crucifere se ne vegono di figura conica *i*: i peli, in forma di scalpello, delle Borrachinee sono scabri e conici: e pare che sieno sostenuti su d' un capezzolo composto di tessitura cellulare *k*.

Esaminando i fiori in maschera, come son quelli dell' *Anthirinum* ossia narice di Vacca, delle Linarie, vi si vedono dei peli più larghi in cima che abbasso: M. Guettard gli chiama *Peli in lacrima batava*. l'.

Scorgonsi sulle piante leguminose, come sull'*Ononis*, o sia *Restia di bue*, dei peli a capsule, cioè, che finiscono in una cupoletta, quasi simile a quella d'una ghianda *m*.

Le Rubiacee hanno dei peli, i quali sono in certa maniera infilati in un filo sottile e curvo, il quale parte dalla cima di ciaschedun pelo: M. Guettard gli ha chiamati *Peli fatti ad ago ricurvo. n*.

I peli dell' *Acrimoniose* terminano in un filetto curvo, ma che sembra essere una continuazione della parte più gonfia: M. Guettard gli chiama perciò *Peli a gruccia. o*.

Le semenze della *Cinoglossa* o sia lingua di Cane, e della Buglossa sono armate di filetti fatti a amo, terminati da quattro uncini in forma di rampini *p*.

Molte piante da mezzi-fiorellini hanno dei peli terminati da due punte più o meno ricurve: M. Guettard gli ha chiamati *Peli a uncino q*.

I Peli fatti a *y* greco, i quali vedonsi sulle Crucifere, sull'*Alyssum*, ec. hanno l'estremità loro terminata da uno, due, tre, e quattro *y* greci, talvolta posti perpendicolarmente, e talvolta orizzontalmente distesi *r s*.

Trovansi sul Corniolo, sulla Periploca, sul Luppolo, e sopra d'alcuni fiori leguminosi dei filetti fatti a rapa, i quali somigliano alquanto a quelli che terminano in *y* greci orizzontali *s s*.

Tutti i filetti ora descritti, non sono in verun conto articolati; ma quelli che dettaglierò, lo sono. Hanno l'Ortiche certi filetti fatti a lesina *u*. Sulle piante da' fiori labiati se ne vedono certi, i quali più propriamente son detti articolati *x*. I Cardi, i fiori radiati, i fiori fatti a garofolo hanno dei filetti fatti a valvole; cioè, le di cui articolazioni non formano in verun modo un rilievo al di fuori, ma compariscono solamente in forma di diaframmi o di valvole *y*.

Veggonsi nei fiori delle piante cucurbitacee certi filetti granellosi, i quali sembrano composti di molti granelli posti come gli uni sopra gli altri *z*. Sul Favagello, sul *Glaucium*, vedonsi dei filetti nodosi, i quali dai precedenti non dissomigliano se non a causa di certe prominenze poste nei punti delle articolazioni dei detti nodi.

La peluria che cuopre le foglie del Verbasco e del *Phlomis ell'* è in parte formata da grossi nodi, d'onde sottilissimi peli si partono, i quali fanno una specie d'asperforio A. Li peli lunghi della Pelosella

la sono come tante piume B. Nelle Malve, nei Cesti, negl' Eliantemi, negli alberi da Castone, i piccoli filetti sostengono dei piccioli capezzoli, e formano una specie di fiocco C.

Le osservazioni fatte da M. Guettard intorno alle glandule gli hanno dato campo di osservare, che quasi sempre tutte le piante d'un istesso genere hanno delle glandule o dei peli che anch' essi sono del medesimo genere: di maniera che potrebbesi, secondo l'osservazioni di questo dotto Botanico, formare un metodo botanico, in qualche modo ugualmente esatto al par di quello formato dai Calici e dalle foglie. Ma gettando i fondamenti di questo metodo, M. Guettard usa la cautela di avvertire che egli per altro non merita d'essere a gli altri già adottati anteposto; e gli basta d'aver fatto osservare che le piante d'un istesso genere si rassomigliano nei peli e nelle glandule. Non è già inutile questa scoperta, mentre ella procura un modo di più per formare un metodo naturale; e se giungerà mai ad essere fondato, ciò non farà se non dopo aver cumulate moltissime osservazioni sopra tutte le parti delle piante, e fin su quelle che non possono esser viste se non coll'ajuto del microscopio.

ARTICOLO II. *Delle Spine.*

Sono le Spine tante escrescenze il più delle volte stabili, terminate sempre da una acutissima punta, e che sviluppanfi insieme coll'altre produzioni delle piante, ma che non stanno rinchiusse entro bottoni particolari; dimodo che potrebbe la maggior parte di queste esser considerata come tanti peli solidi e duri: e questa ultima considerazione si è quella appunto che mi ha obbligato di qui riferire le osservazioni che la riguardano.

Trovanfi sparse le Spine sopra tutte le parti delle piante: quelle d'Arancio, che chiamasi *Salvatico*, s'incontrano una ad una, o due a due, immediatamente accanto ai bottoni, che sono in quell'angolo che fanno i gambi delle foglie col ramo (Fig. 120). Le Spine del Ro-Tav. XIII. fig. 120. saio (Fig. 121) non sono quasi mai diritte al par di quelle dell' Fig. 121. Arancio; sono uncinate per difotto; elleno spuntano da diversi punti dei rami, e molte volte di sotto ai bottoni: anche i pediculi delle foglie ne sono armati (Fig. 122). Nella Falsa-Acacia (Fig. 123), Fig. 122. e 123. sono i pediculi delle foglie ordinariamente accompagnati da due gran Spine diritte: le foglie dell'Uva Crespina (Fig. 124) e quelle dell' Fig. 124.

Uva Spina sono accompagnate da tre, e talvolta da cinque spine sottili e lunghe, che nella base loro si riuniscono. *La Gletisfa* (Fig. 125) ha sopra i bottoni e sopra i rami novelli, certe spine talvolta semplici, talvolta ramosse, tralle quali se ne trovano alcune di grandissime, avendone io vedute alcune lunghe fino a cinque pollici. Allo spuntare dei novelli rami del *Palinurus* (Fig. 126) veggonsi quelli accompagnati da due cortissime spine, ma molto acute e resistenti ed in-comode, perchè una di queste, che è tutta diritta, si slunga verso la cima, e l'altra, ordinariamente più corta e più grossa, forma un'uncino la di cui punta si rivolge abbasso; e quindi si può a gran fatica liberarsi da queste. Ora che ho riferiti questi esempj delle varie sorte di spine che sono sulla lunghezza dei rami, parlerò di quelle che stanno nella vetta di quelli.

- Fig. 127. I Prugnoli, molte specie di Prugni (Fig. 127), di Peri, di Pomi, di Nespoli, hanno li rami giovani provvisti di ramoscelli, i quali terminano in una punta o spina, alle volte assai pungente: questi acuti ramicelli non hanno talvolta alcun bottone, ma solamente delle spine; altre volte son carichi di bottoni, da cui spuntano dei fiori, delle foglie, e dei rami: in tal caso questi novelli rami vanno a terminare anch'essi in una spina. Il Pugn-topo (*Ruscus*) il quale non ha spine su i rami, ha le foglie che finiscono (Fig. 128) in una acutissima punta. Il Rusco ordinario, o sia l'Agribuglio (Fig. 129) ha tutti gli angoli del contorno delle foglie che finiscono in tante punte: Le foglie del Rusco-riccio sono, oltre a questo, armate nella superficie di moltissime punte.

S'io volessi estendere queste osservazioni sopra tutte le foglie, troverei dei *Solanum*, le di cui foglie sono nelle costole armate di spine. Le classi dei Cardi, delle Carline, de' *Cnicus*, dei Triboli, degli *Eryngium* o sia Barbe di Capra, mi somministrerebbero moltissimi esempj di spine diversamente disposte; le Ortiche mi somministrerebbero delle spine sottilissime, o dei duri peli, i quali molto dolore arrecano se vengano tocchi: ma questo sarebbe un dettaglio che troppo si estenderebbe; ed io finirò col fare osservare, che molti frutti sono eziandio provvisti di spine.

Vi sono certe specie di ghiande, la di cui Cupoletta ell'è quasi spinosa: è nota una specie di Pino le di cui pine son formate di squame le quali terminano in tante acute punte: ma dove veramen-

te le spine son manifeste, si è sopra i Castagni ordinarij (Fig. 130), sul Tav. XIII. fig. 120. Marrone d'India (Fig. 131), e sopra i frutti del Faggio (Fig. 132). Fig. 131. e 132.

Dopo aver percorse le diverse positure delle spine degli alberi e degli arbusti, ora esamineremo il di dentro di quelle, per conoscerne la loro organizzazione.

Si fa che l'unghie degli animali sono una sostanza cornea e molto dura, la quale sembra che sia una continuazione della pelle, la quale diventi granosa mediante la sostanza cornea, senza che saper si possa come segua il cambiamento della tessitura della pelle, perchè poi acquisti la consistenza del corno. Considerando la cosa sotto questo punto di vista, paragonar si possono all'unghie degli animali le spine delle foglie (Fig. 128 e 129), quelle dei frutti (Fig. 130, 131, 132) e quelle del Rovo e dei Rosai (Fig. 121), della falsa Aca- dia (Fig. 123), dell'Uva Spina, e dell'Uva Crespina (Fig. 124), del *Paliurus* (Fig. 126) e d'un'infinità d'altre piante, le di cui spine non hanno comunicazione veruna col corpo legnoso, e non hanno origine se non dagli strati corticali; le seguenti osservazioni ce lo fanno conoscere.

1.º Se dopo aver fatto bollir nell'acqua un ramo ingordo di Rosa Canina, o la spoglia della sua scorza, appena sia tratto fuori dall'acqua bollente, si vedrà che tutte le spine verranno via colla scorza, e che la più picciola impronta non ne rimane sul corpo legnoso: anche più, l'impronta della base della spina si può appena distinguere su i più interni strati corticali: ed attentissimamente esaminando, vedesi solamente una macchia bianchiccia, dove la tessitura corticale sembra più stretta che altrove.

2.º Fendendo in due il detto ramo ingordo, e spaccato in guisa che la sezione divida una spina in due parti, vedrassi (Fig. 133), *a* l'epidermide, *b* la grossezza della scorza, *c* il corpo legnoso, *d* la midolla; e vedrassi ancora che la spina *e* non ha alcuna comunicazione, nè colla midolla, nè col legno, e che anzi vi è frapposto uno strato corticale tralla base della spina ed il legno, di modo che quantunque gli strati corticali sieno in quella parte più sottili che altrove, si potrebbe quasi credere che questa spina non tragga la sua origine che dall'epidermide. Avendo per altro attentamente esaminato il taglio della spina, si scorge ch'ell'è formata da molti strati, come lo rappresenta la Fig. 133, in *e*; ma dopo che si è indurita
la

Fig. 133-

la sostanza legnosa *c*, compariscan le Spine sprovviste d' umore e l' interno di quelle diventa scuro: e quindi pare ch' elleno prendano il loro accrescimento intiero nel tempo che il ramo sviluppassi, e ch' elleno cessino di crescere allora quando si è fatto duro il corpo legnoso.

Possono queste Spine esse paragonate alle nostr' unghie: in quanto ai corni di bue, ai becchi e all' unghie degli uccelli, ec. questa cornea sostanza è estesa sopra un nucleo osseo che sta di dentro, come

Tav. XIII. fig. 134. può vederfi nella Fig. 134, dove *a* rappresenta il nucleo osseo, e *b b* la sostanza cornea. Potrebbe vedersi una memoria da me presentata all' Accademia delle Scienze nel 1751, sull' accrescimento dei corni, ove ho detto: 1.° Che il nucleo osseo *a* de' corni di bue era contiguo ed attaccato all' osso del cranio: 2.°, Che gli strati cornei *b b* erano una continuazione della pelle che ricuopre la testa. 3.°, Che il nucleo osseo cresceva in grossezza ed in lunghezza per l' addizione degli strati ossei, i quali formansi nella superficie del cono osseo, a misura che gli strati cornei si stendono: 4.°, Che gli strati cornei si formano nell' interno del corno, di modo che gli strati prima formati, immediatamente ricuoprono gli strati del nucleo osseo, che sono gli ultimi a formarsi: 5.°, Che finalmente gli strati cornei si stendevano, come le unghie, dalla parte che tocca la pelle.

Le Spine degli Aranci (Fig. 120 Tav. XII) e quelle dei Prugni Salvaticchi (Fig. 127) sono di questo genere. Hanno queste un nucleo legnoso, il quale è ricoperto da una continuazione della scorza, che s' indurisce, e diventa trasparente in alcune specie, come, per esempio, negli Aranci.

Fig. 135. La Fig. 135 rappresenta un ramo di Prugno armato d' una spina, tanto l' uno che l' altra spogli di scorza; e vedesi che le fibre legnose del ramo si slargano per lasciar spuntar fuori la spina. La

Fig. 136. Figura 136 rappresenta un taglio longitudinale dell' istesso ramo e della Spina, ambedue vestiti di scorza: *a* è la midolla; *b* gli strati legnosi, i quali stendono per tutta la lunghezza del ramo; *c* gli strati legnosi, i quali compongono il nucleo della spina; *d* la scorza che ricuopre il ramo e la spina.

Si osservi 1.° Che nell' Arancio, e nell' altre specie d' alberi spinosi, la porzione della scorza che eccede il nucleo legnoso è trasparente: 2.°, Che nei Prugni, e negli altri alberi, ha talvolta la spina dei bottoni simili a quelli della (Figura 127 Tav. XIII). In que-
sti

sti casi ordinariamente succede, che la porzione della spina compresa, cominciando dall'ultimo bottone fino alla punta, ell'è secca e morta. 3.° Pare che il legno di tali spine sia più duro del legno dei rami che le portano. 4.° Non ho mai visto midolla nel centro delle spine, e non ho potuto mai distinguere quel segno midollare, che traversa gli strati legnosi dirimpetto ai rami giovani. 5.° Quantunque sembri, che le spine dei Prugni sieno tanti veri rami terminati in una punta, la quale si secca lo stesso anno, che si è formata la spina, vi si può non ostante osservare qualche differenza; poichè oltre alla circostanza della midolla che manca quasi del tutto, le spine si piantano quasi perpendicolarmente ai rami, ed all'incontro i rami giovani fanno il più delle volte, con quelli dai quali si partono, tanti angoli più piccoli di 25 gradi. I bottoni che fanno le spine non producono altro, che foglie o rami storti, ovvero dell'altre spine; ma tutte queste produzioni presto periscono, ed all'incontro i bottoni che producono i veri rami, producono dei fiori e dei rami vigorosi. Le spine terminano in una punta, e i veri rami in un bottone. Sono, finalmente, le spine poste a piè dei rami, e sono più o meno grandi, secondo la forza dei rami, che le sostengono; al contrario poi i rami giovani nascono dall'estremità dei rami vecchi. Siccome questi dettagli sono quanto basta esposti nella Fig. 137; altro non mi resta, che di fare osservare, che vi sono eziandio dell'altre produzioni, che in qualche modo son miste, e che partecipano della natura dei rami, e di quella delle spine.

Le spine mostruose del *Gledisia* conservano qualche attaccamento al legno, anche allorquando spogliato sia della scorza, come può vedersi nella Fig. 137, quantunque per altro non siavi una perfetta continuazione tra'l legno dei rami e le spine, come vedesi nella Fig. 138, dove *a* è la midolla; *b* *b* il legno, il quale non corrisponde alla spina se non per un sottilissimo strato e qualche produzione; *c* *c* la scorza che si distende sulle spine e su i rami; *d* un ramo, il di cui legno intimamente comunica con quello del ramo; *e* la spina, il di cui interno, per molta estensione, è formato d'una sostanza midollare sprovvista di fugo, la quale si distribuisce nella spina laterale, senza avere alcuna comunicazione colla midolla del ramo, e questa sostanza midollare è coperta d'un sottilissimo strato di legno, e d'una produzione della scorza; avendo queste due sostan-

ze

ze acquistata molta durezza, ed avendo in qualche modo cambiata tessitura.

Ha creduto il Malpighi, che le spine servissero a dare al sugo una preparazione: io veramente confesso, che non conosco di qual' ufo esser possano le spine nella vegetabile economia. Mi pare, che non sieno essenziali alla vegetazione, perchè molti alberi non ne sono in verun conto provvisti. Per altro, siccome le griffe, l'unghie, i corni, e il becco servono agli animali di difesa, anche i vegetabili godono dello stesso beneficio; noi ne ricaviamo intanto un vero vantaggio, poichè si formano cogli alberi spinosi delle barriere e dei ripari sicuri al par dei muri per difendere le nostre terre dal danno dei bestiami, come pure dall'audacia dei Ladri.

ARTICOLO III. *Delle Mani, o Viscici particolari di alcune piante.*

QUASI tutti gli alberi e molte piante ancora hanno i fusti ed i rami forti abbastanza per sostenerli, senza aver bisogno d'un'appoggio straniero; ma molte piante e qualche arbusto gli ha talmente pieghevoli, che son costrette a strisciarsi per terra: tra gli arbusti striscianti può servir d'esempio una specie di Rovo, che trovasi nelle terre da formento, il quale stà sempre sdrajato per terra.

Certe altre piante del genere delle striscianti, avviticchiano il fusto ai rami degli alberi nani o a quelli a cui agevolmente arrivano, e gli ricuoprono talmente coi rami e colle foglie, che alle volte più non si vedono quegli arborescelli, che gli serviron d'appoggio senza di cui serpeggierebbero per il terreno. Ponno servir d'esempio le Clematiti, i Pruni delle siepi, il *Solanum* o *Dulcamara*, ec.

Vi sono delle piante striscianti, o fermentose (questi termini son sinonimi) i di cui fusti principali acquistano talvolta una solidità bastante per sostenerli da per se stessi, talvolta i rami loro pelosi e pieghevoli rimangono pendenti; le Caprifoglie sono d'un tal genere: ne ho vedute alcune il di cui fusto principale aveva una circonferenza di quasi 4 in 5 pollici. Alcun'altra piante fermentose s'uniscono agli alberi vicini, e più tenacemente, di quello che abbracciandoli coi propri rami. Il *Menispermum*, l'*Evonymoides*, e tralle piante il *Convolvulus*, s'avviticchiano a spirale intorno al fusto ed ai rami degli alberi e delle piante più resistenti di loro; ma se loro mancano questi solidi

pun-

punti d'appoggio, allora i rami si ravvolgono insieme, di modo che formando una specie di corda, si danno un vicendevole soccorso, così acquistando forza bastante per alzarli fino ad un certo segno.

La Vite, il Fior della passione, o Granatiglia, e tralle piante la *Brionia*, s'attaccano ai vicini corpi solidi, in modo diverso da quegli arbusti ora nominati: siccome il loro fermento non ha la proprietà di attortigliarsi intorno ai corpi solidi a lui vicini, gli ha la natura provvisti di certe produzioni, le quali ravvolgendosi a spirale, s'attortigliano intorno ai corpi solidi, che incontrano, come vedesi nella Fig. 140. in c.

Tav. XIV. Fig. 140.

Offerveremo, in proposito di quelle produzioni, che *Mani* si appellano, a cagione del loro officio, o talvolta anche *Visiccio*. 1.° Che in certe piante, come nella Vite (Fig. 140.) elleno spuntano dalla parte opposta alle foglie *d*: ed in altre piante, come nella Granatiglia (Fig. 141) esse spuntano accanto al pedicelo delle foglie. 2.° Che alcune di queste mani sono composte d'un filo solamente, ed altre di due o di tre, come nella Fig. 140. c *b*. 3.° Che i bottoni o le gemme *a* della Vite escono quasi sempre dall'ascelle delle foglie, e che rarissime volte si trovano delle mani nelle ascelle. 4.° Che alcune piante vi sono, che hanno le mani nell'estremità delle foglie. 5.° In quanto all'organizzazione di queste mani; quelle della Vite e quelle della Granatiglia sono perfettamente simili ai gambi dell'Uve; e quindi formate sono d'involuppi corticali, di fibre legnose, di vasi proprj, di trachee, e di tessitura cellulare. Non vi sarà di ciò più dubbio, quando si saprà, che talvolta si trovano due o tre granelli d'uva ben formata in cima alle dette mani.

Nella Figura 143, la quale rappresenta il taglio longitudinale d'un nocchio di vite guarnito d'una foglia *a*, e d'una mano *b*, vedesi la midolla *e* il legno *ff*, e la scorza *g g*: scorgefi in *b* come un'ammasso di tessitura cellulare, ma già indurito. La Fig. 142. rappresenta il taglio longitudinale d'un ramo di Granatiglia, da cui parte una mano *d*, ed una foglia *e*: vedesi in *a* la midolla, in *bb* la sostanza legnosa, ed in *cc* la scorza.

Le mani della vite non si ravvolgono sempre per il medesimo verso: alcune si ravvolgono a destra, altre a sinistra. Ciò molte volte si osserva sopra due diramazioni della medesima mano; e ciò che è singolare, si è che questo attortigliamento per il verso contrario succede

Fig. 141.

Fig. 142.

cede quasi sempre, quando un ramo, un paletto, o un tralcio solido trovansi a caso posti nella biforcazione d'una mano; di maniera tale che esaminando attentamente le mani della vite, pare che sieno determinate a ravvolgersi per un verso o per l'altro dal contatto del ramo su di cui si ravvolgon le mani. Questo inerita veramente tutto il riflesso dei Fisici. Aveva su di ciò cominciate alcune esperienze, che poi altre importanti cure m'han costretto a sospendere.

La *Bignonia fraxini folio*, l'Ellera, ed alcune altre piante s'attaccano alla corteccia degli alberi ed ai muri, con una certa specie di griffe: quelle della *Bignonia* sono rappresentate nella *figura 144*; *Tav. XIV. fig. 144.* e quelle dell'Ellera nella *Fig. 145*. Il taglio longitudinale (*Fig. 146*) fa vedere, oltre la situazione della midolla, della sostanza legnosa, e della scorza in *a*, le griffe nella loro situazione; ed in *b*, un pezzo di scorza staccata dal legno, e guernita di griffe: veggonsi in *b*, sotto il detto pezzo di scorza, le picciole fibre legnose, le quali entrano in una porzione delle dette griffe, lo che prova, che non sono intieramente corticali.

Esaminando alcuni rami di *Bignonia* e d'Ellera, mi ha parso, che le griffe della *Bignonia* non sieno situate, che vicine ai nocchi, e che quelle dell'Ellera occupano tutta la lunghezza del ramo dalla parte del muro, o degli alberi ai quali si attaccano. Credo finalmente, che quasi tutte le mani e tutte le griffe delle piante si secchino, e perdano il lor vigore in quell'anno medesimo in cui son prodotte; ma che durino per molto tempo in quello stato di disseccamento, senza che marcie divengano.





LIBRO TERZO.

Delle Gemme o Bottoni da Fiori e da Frutto, e degli Organi della fruttificazione; dei Frutti; dell' ufo delle parti dei fiori, e dei frutti.

CAPITOLO PRIMO.

INTRODUZIONE.

PER continuar l' esame delle parti che sparse sono su i rami, d' uopo è di passare a quello dei fiori; e siccome penso di provare nel seguito di quest' Opera che gli organi, di cui composti sono i bottoni, servono alla formazione dei frutti e dei semi, non ho difficoltà veruna di chiamargli come organi immediati della fruttificazione. Ecco l'ordine ch'io seguirò nel detto esame.

Avendo detto pochissimo nell' Articolo su i bottoni, posto sul principio del secondo Libro, di quelli che contengono i fiori, supplirò adesso alle omissioni ch'io fui costretto di commettere, con un Articolo a parte, ove riporterò ciò che spetta ai bottoni da frutto.

Le diverse parti componenti i fiori sono il più delle volte sostenute da una specie di Cupola o di sostegno, che chiamasi *Calice*: egli è vero che questa parte non può essere considerata essenziale alla fruttificazione, imperocchè molti fiori fanno delle semenze ben condizionate, quantunque sieno senza calice; nulla ostante, giacchè tutti i Botanici considerano i calici come dipendenti dai fiori, ne parlerò in un' articolo a parte.

Dopo aver trattato di queste parti, le quali si possono considerar puramente come accessorie, passerò poi all' esame di quelle che più par-

particolarmente costituiscono i fiori. Ma prima di entrare nel dettaglio delle osservazioni adattate a ciascheduna parte, credo di dover dire qualche cosa dei fiori considerati in generale.

Vi sono alcuni fiori, che si possono chiamar *completi*, perchè sono essi provvisti di tutti gli organi necessarj per la fruttificazione: altri chiamar si ponno *incompleti*, perchè non, hanno se non una parte sola dei detti organi; e tra questi, alcuni sono sterili, altri producono i frutti. Ciò che appartiene a questi diversi fiori sarà esaminato in tanti Articoli particolari. Ciò che finalmente dirassi delle varie parti componenti i fiori, disporrà il Lettore a seguirarmi nella discussione d'una molto curiosa questione dell'economia vegetabile: intendo dire del *sesto delle piante*.

ARTICOLO I. Dei Bottoni da frutto.

TUTTO ciò che ho detto nel passato Libro intorno agl'inviluppi squamosi dei bottoni da legno, è anche applicabile ai bottoni da frutto: altro non farò dunque, che richiamare succintamente ciò che ne dissi; ma la posizione dei bottoni da frutto merita qualche attenzione. In molte specie d'alberi, come nei Peri, i bottoni (*Fig. 6*) che fanno i fiori, e che i Giardinieri chiamano *bottoni da frutto*, sono situati nell'estremità dei piccioli ramoscelli particolari, i quali non si slungano mai molto, son molto vestiti di foglie, e contengono più tessitura cellulare dei rami da legno.

Fig. 1. Nei Peschi (*Fig. 1*) ed in molti alberi dell'istessa famiglia, i bottoni da fiori stanno su i medesimi rami di quelli da legno, di modo che vedesi talvolta un botton da fiore accanto ad un bottone da legno, e spesso due bottoni da fiore sono ai due lati d'un bottone da legno; di modo che i bottoni da fiore, che accompagnati non sono dai bottoni da legno, sogliono ordinariamente cadere senza produrre alcun frutto: *a b* sono i bottoni da fiore, grossi e rotondi in cima: il bottone *c*, il quale è più piccolo bislungo ed appuntato, è un bottone da legno: sono questi tre bottoni piantati su d'una prominenza del ramo, la quale fa una specie di beccatello o menfola *d d*: vedesi in *e* una specie di cicatrice, la quale è il luogo ove era attaccata la foglia dell'anno precedente.

I rami di molti alberi son terminati dai fiori, come nel *Pentaphylloides*: in altri spuntano i fiori dall'ascella delle foglie, come nel

nel Mirto : in alcuni essi partono dalla foglia medesima , come nel *Rusco*, *fructu folio innascente* : compariscono talvolta i fiori , o in forma di grappoli , provenienti dall' ascelle : talvolta rimangono pendenti , come nella *Pseudo-Acacia* , nel Citiso : ovvero in grappoli rilevati i quali terminano i rami , come nel Rovo , nel *Lilac* : o sono essi uniti a mazzetti o ciocche in punta dei rami , come nella *Coronilla* , nella *Diervilla* : o attaccati all' ascelle delle foglie , come nel *Fagara* : o formano essi delle spighe , come nell' *Amorpha* , nella *Spiraea* dalle foglie d' Ipperico , nel *Clethra* : in cui sono esse vere ombrelle , come nel *Bupleurum* ; ovvero ombrelle ramosse , come nel Sambuco , e nell' Opio. Vedasi per. il dipiù , il Trattato degli Alberi e degli Arbusti. Queste osservazioni , le quali si potrebbero maggiormente estendere , mostrano che ordinariamente la posizione dei bottoni da fiore è anch' ella sempre la stessa in tutti gli alberi d' un medesimo genere al pari di quella dei bottoni da legno. Senza di più fermarmi su questo Articolo , ora m' accingo ad esaminare l' interno dei bottoni , per far conoscere le produzioni , che nascosamente si fanno nelle stagioni dell' Autunno e dell' Inverno per la formazione dei fiori ; ma non essendo mia intenzione di estendere le mie ricerche sopra i bottoni di tutti i diversi alberi , mi ristringerò alle osservazioni , che ho fatte sopra i bottoni dei Peri , sopra quelli dei Peschi , e sopra quelli del *Mezereum* .

I fiori del *Mezereum* , che il più delle volte compariscono in Genajo , o alla più lunga in febbrajo , ponno vederli nei loro bottoni fin dal mese d' Agosto ; di modo che mediante una dissezione la quale non esige neppure molta bravura , fin d' allora distinguonli i petali , gli stami , e gl' involuppi dei novelli frutti .

Sul principio del mese di febbrajo , ho spogliato dei suoi involuppi squamosi un bottone da fiore d' un Pesco , e nell' interno vi ho trovato il bottone del fiore , come nella *Figura 4.* Ho tagliato in *Tav. I. fig. 4.* due per la sua lunghezza , un bottone provvisto dei suoi involuppi squamosi , e vi ho visto (*Fig. 2.*) , che gl' involuppi esterni erano più *Fig. 2.* corti e più grossi degl' interni . Tra questi ve n' ha di quelli , che prendono delle forme diverse : ne ho esaminato uno dei più sottili col microscopio , e mi è comparso guernito di moltissimi peli (*Fig. 3.*) *Fig. 3.* e principalmente negli orli .

Tolti tutti gl' involuppi del bottone , vedesi comparire il calice del fiore (*Fig. 4.*) e le di lui intagliature , le quali ripiegate essendo

PARTE I

M

l' una

Tav. I. fg. 5. l'una addosso all'altra, rinchiudono e nascondono l'altre parti del fiore; ma slargando queste intagliature, si scuoprono gli stami ed il pistillo (Fig. 5); vedonsi anche i petali, quantunque sieno cortissimi: tutte queste parti compariscono meno chiare nella Fig. 2, dove sono stati conservati gl'involuppi squamosi del bottone. Schiacciando le punte degli stami, ne uscì dell'umore e dei granetti di polvere.

Dichiaro di non aver potuto scorgere il nodo nella base del pistillo; ma rilevo da queste osservazioni, che sul principio di febbrajo si ponno scuoprire, e distinguere le une dall'altre, le parti principali d'un fior di Pesco. Finirò quanto mi rimane da dire intorno ai bottoni da frutto, col dettaglio delle osservazioni che ho fatte su dei Peri; mi dilungherò alquanto sopra di ciò, che ad essi appartiene.

Ho esaminati, nel mese di Gennajo, i bottoni del Pero dai quali escono i fiori, chiamati *bottoni da frutto* (Fig. 6): erano allora gonfi, e terminavano in una punta molto ottusa. Un ramo molto grosso, in confronto della sua lunghezza, formato quasi tutto di tessitura cellulare, serviva di sostegno alli detti bottoni, di modo che questo ramo pareva piuttosto un gambo di certe pere, che un vero ramo di Pero: sono questi bottoni composti di 25 in 30 squame scavate in forma di cucchiarino; con questo forte involuppo difendono i nascenti fiori dall'ingiurie del verno.

Fig. 7. Le squame più esterne (Fig. 7) son salde, talvolta anche dure, e sempre scure quanto la scorza dei rami giovani: sono poco pelose al di fuori; ma in fondo ad ogni cucchiarino scorgesi un ciuffetto di peli gialli rilucenti di color d'oro, riguardandoli per un certo verso.

Fig. 8. Le squame o foglie interne (Fig. 8) sono più grandi dell'esterne: sono verso la base verdognole; sono al di fuori coperte d'una finissima peluria, e al di dentro sono tutte guernite di peli del medesimo colore come le squame esterne. Sotto di queste foglioline altre pur se ne trovano più picciole e più sottili di quelle ora descritte; queste sono pelose e d'un color bianchiccio.

Tolti tutti questi involuppi, scorgonsi gli embrioni dei fiori, che Fig. 10. esser foglione 8, o 10 (Fig. 10): sono essi aggruppati su d'una coda comune, lunga circa due linee, e vi stanno attaccati con tante code particolari, cortissime da principio, ma che poi più o meno si slungano, secondo le diverse specie di pere.

Tra

Tra gli embrioni di questi fiori, che allora sono quasi sferici, scorgonfi molte foglioline pelose (*Fig. 9*) assai sottili, di diverse forme, e d'un verde pallido: elleno riempiono tutti i vuoti; e probabilmente contribuiscono non poco a difendere dall'ingiurie del verno i fiori novelli: e forse anche servono a rinvivare il moto del sugo in queste giovani produzioni; poichè vedrassi in appresso, che una delle proprietà delle foglie si è quella di eccitare il moto del sugo in diverse parti degli Alberi.

Ho esaminati col microscopio alcuni di questi embrioni: si rassomigliano al di fuori ad una boccia o sia bottone di rosa (*Fig. 11*) *Fig. 11.* ma avendone aperti degli altri e guardati colla lente, gli viddi tutti pieni di peli (*Fig. 13*); e nell'interno osservai molti stami le *Fig. 13.* di cui cime erano per anche bianche: non poteva distinguerli se fossero formati dalla riunione di due corpi a guisa d'oliva: i petali erano appena visibili, e li pistilli mi scapparono affatto dall'occhio: vero si è, che potevanli facilmente confondere con i pedicoli delli stami i quali erano privi delle cime loro o delle Antere.

Ho esaminati nel mese di Marzo degli altri embrioni, ed erano allora notabilmente ingrossati, sebbene per anche fossero del tutto ricoperti dagl'involuppi squamosi; poichè a misura, che gli embrioni dei fiori vanno crescendo, le squame interne si slungano, e in tal guisa clandestinamente si formano gli embrioni, non stando esposti all'aria in una stagione così poco avanzata, ed in cui talvolta sovrappiungono dei fortissimi diacci.

Mi fece allora conoscere il microscopio meglio formati i detti embrioni (*Fig. 12*): le punte delli stami erano rosse, i petali distingue- *Fig. 12.* vanfi chiaramente, e già cominciavano a comparire i pistilli.

Nell'anno delle mie osservazioni, cominciavano i bottoni ad aprirsi verso la fine di Marzo: scorgevasi allora più chiaramente la diversa forma dei filetti, o piccole foglie (*Fig. 9*), che accompagnano gli embrioni, come gli rappresenta la *Fig. 11*. Molti filetti adunque involuppano immediatamente gli embrioni, ai quali sono essi appiccicati da un'umor gommoso limpidissimo: i bottoni dei Pioppi e dei Marroni d'India sono copiosamente provvisti di questa viscosa sostanza.

Verso la fine di Marzo, si ponno distinguere i due corpi olivari i quali colla loro riunione formano la sommità degli stami; imperocchè avendo allora trasversalmente tagliati alcuni pistilli, mi par-

vero ripieni d'una sostanza cellulare, o almeno mi parve di ben conoscere, che essi non erano vuoti: vedevansi anche i petali, quantunque fossero tuttavia verdi, e più corti delli stami: principiai finalmente a vedere gli acini o granelli, i quali erano uniti due a due in uno slargamento della base dei pistilli. Io non intendo di far credere, che non si potessero questi anche più presto distinguere; anzi son già persuaso, che quelli fossero già da molto tempo formati; ma credo cosa non molto agevole l'arrivare a distinguere certe parti tanto minute, le quali rimangono confuse con molti altri organi, che allora cominciano a svilupparsi, e che oltre di ciò sono essi impastati d'una specie di vischio, che difficile ne rende la dissezione.

Chechè ne sia, l'epoca dell'esistenza degli acini può fissarsi, in una annata che sia tardiva, alla fine del mese di Marzo; ed il luogo della loro formazione trovasi determinato nella base dei pistilli, luogo che può giustamente chiamarsi *l'Ovaja della pera*. Allora ch'io gli ho osservati erano quest'acini bianchissimi e di forma molto simile a quella di alcune Ninfe, volgarmente dette *Ova di formiche*. Non erano allora visibilmente attaccati alle interne pareti della celletta, che loro dava la base dei pistilli; pareva che ricevessero l'alimento solamente da un vaso, che può chiamarsi *umbilicale*, e di cui ragionerò in appresso. E quindi può dirsi col Grewio, che i fiori che spuntano a Primavera, sieno realmente formati nell'anno avanti. Credo di aver parlato abbastanza intorno ai bottoni, ed alle parti contenute da quelli. Parlerò adesso dei fiori, allora quando sono nello stato di perfezione; e principierò da quelli che ho chiamati *Completi*, perchè questi contengono tutti gli organi della fruttificazione.

ARTICOLO II. Dei Fiori Completi.

Acciò un fiore possa dirsi completo, egli è necessario che abbia in sè 1.º dei *Filotti* terminati da certi corpi ordinariamente più gonfi del filetto che gli sostiene, diversamente formati e coloriti, e che chiamansi *Stami*: 2.º degli altri filotti diversi dai primi, e che ordinariamente sono in poco numero: questi dai Botanici vengono detti *Pistilli*: 3.º oltre a queste parti essenziali, sono la maggior parte dei fiori ornati di foglie colorite, le quali si chiamano *Petali*: 4.º alcuni fiori hanno in sè ancora certe altre parti, le quali si ponno considerare come soprannumerarie, perchè non si trovano in molti al-

ti

tri fiori. Il Signor Linneo le ha chiamate *Nectarium*: 5.º tutti questi organi sono sostenuti da una specie di scodella o tazza, la quale pare, che sia una continuazione del ramo che la sostiene; la quale vien detta *Calice*. Molti fiori anche completi sono senza *Nectarium*, senza calice, ed anche senza petali. Ora esamineremo ciascheduna di queste parti in tanti Articoli separati; ma prima d'entrare in questo dettaglio, per mezzo di cui potrò chiaramente far conoscere queste diverse parti, m'accingo, per darne una superficiale idea, a mettere sotto gli occhi del mio Lettore la forma d'un fiore, dove elleno sono rappresentate in grande ed in guisa molto sensibile. Nella Fig. 14. Tav. I. fig. 14. si ponno vedere i petali, ovvero le foglie colorite del fiore *a*, gli stami *b*, il pistillo *c*.

ARTICOLO III. *Dei Calici.*

I CALICI dei fiori sono formati da uno slargamento, o da una gonfiezza dei pediculi o dei rami, che sostengono i fiori. Non si ponno, come ho già detto, considerare i Calici come una parte essenziale dei fiori, mentre che se ne vedono alcuni come quelli della Clematita, che non hanno calice, e che non ostante producono e frutti e semi perfettamente formati; circostanza che prova, che questi fiori senza calice provvisti sono delle parti essenziali alla fruttificazione; ma i fiori di quasi tutti gli alberi ed arbusti provvisti sono d'un calice, il quale dopo avere insieme colle squame dei bottoni formato un'involuppo capace di difendere i fiori, si gonfia talvolta per formare i frutti; talvolta cade dopo aver prodotto un'appiccagnolo, ed anche dopo aver dato alimento agli stami e ai petali, i quali sono le parti più lucide del fiore. Vedasi l'Albicocco (Fig. 19) Fig. 19. e la Fig. 26, in cui vedesi il calice staccato, e che stà per anche Fig. 26. infilato nel pistillo.

Esaminando attentamente i calici dei fiori, molte differenze nelle forme loro ravvisansi. 1.º Vi sono dei calici tutti d'un pezzo; quelli dei Peri (Fig. 25), dei Cotogni, dei Peschi, degli Albicocchi Fig. 25. (Fig. 26) ponno servir d'esempio. 2.º Sono altri composti di più Fig. 26. pezzi i quali formano una specie di foglie: sei ve ne sono nel calice del Crespino, quattro in quello del Capperò (Fig. 16). 3.º Tra Fig. 16. i calici d'un pezzo solo se ne danno di quelli, la di cui base si gonfia e diventa frutto: i Pomi, i Cotogni, i Granati (Fig. 17), Fig. 17.

i Peri sono di questo genere; allora gl'intagli del calice rimangono secchi in cima al frutto; e questi calici che divengono frutti non cadono mai. 4.° In altri alberi, come nei Mandorli, nei Peschi (Fig. 15 e 18), e negli Albicocchi (Fig. 19), i calici che sono tutti d'un pezzo, servono solamente di sostegno alli stami, d'involuppi ai frutti novelli; ma cascano appena, che i frutti sono allegati. Vi sono dunque dei calici che sussistono fino alla maturità dei frutti o dei semi, ed altri che cascano contemporaneamente all'altre parti dei fiori.

- Il calice di molti frutti e della maggior parte dei fiori leguminosi sussiste fino alla maturità delle semenze, o sotto ai frutti, come nella *Bella donna* (Fig. 20), o al nascere dei baccelli, come nell'*Anagiris* (Fig. 21). In quanto ai fiori labiati, come quelli del Rosmarino (Fig. 34) non hanno i semi altro involuppo, che il calice. 5.° Tra i calici composti di più pezzi, la maggior parte, come quello del Cappero, cascano avanti la maturità del frutto, e qualcheduna, come quelli dell'Ebano, sussistono. 6.° Vi sono dei calici, che son comuni a molti fiori, di fioretti, o mezzi fioretti; Fig. 22. basta solamente dar per esempio il calice dei fiori d'Abrotano (Fig. 22) Fig. 23. e della Globularia o Margherita (Fig. 23). Questi calici comuni a molti fiori, sussistono fino alla maturità dei frutti. 7.° Alcuni fiori di questo istesso genere, come quelli della Globularia, hanno, oltre il descritto calice comune, un'altro calice particolare appartenente a ciaschedun fiorello. Vedi la Fig. 24.

Indipendentemente dalle differenze essenziali poc'anzi descritte, altre molte ve ne sono, che ponno molto contribuire alla cognizione delle piante. Ma non potendo entrare in un così vasto dettaglio, mi contenterò di solamente accennarle.

La forma dei calici varia molto; alcuni sono fatti a cornetto, altri a campana, altri a tubo, altri a focotoppa, altri a guisa di rose; alcuni sono grandissimi, altri piccolissimi; quasi tutti sono più o meno intagliati negli orli; i quali intagli sono o rotondeggianti, o appuntati, o dentati, o spinosi; formano talvolta delle considerabili appendici. Le parti componenti i calici formate di molti pezzi, sono grandi o piccole, rotonde o ovali, o appuntate, piatte o vuote a guisa di cucchiaro, unite o dentate, sottilissime o grosse o succulenti. Vi sono dei calici uniti e lisci, altri scabri, altri pelosi, altri

altri spinosi, altri squamosi. La di loro disposizione relativamente ai frutti, presenta pure delle varietà degne di riflesso: i calici, per esempio, delle Querce (*Fig. 28*), quelli dei Noccioli (*Fig. 27*) formano una coppa carnosa la quale riceve la base delle semenze. I calici dei fiori incompleti, volgarmente chiamati castoni, formano delle squame, sotto delle quali trovansi, o gli stami, o i semi: di tal natura, per esempio, sono quelli dell'Ontano (*Fig. 29*).

Tav. I. fig. 28.
e 27.

Fig. 29.

Finalmente, quantunque quasi tutti i calici sieno verdi, pure ve n'ha eziandio dei coloriti: alcuni sono pezzati di bianco e di verde, altri son verdi al di fuori e bianchi al di dentro, o del tutto bianchi, o del tutto gialli; alcuni sono orlati di rosso, di modo che talvolta si ha gran difficoltà a decidere se certi fiori sieno senza petali o senza calice. Dice il Cefalpino, che i calici son verdi, perchè essi sono un prolungamento della scorza dei rami: per altro questo color verde non è bastante a far distinguere i calici dai petali, poichè vi sono dei petali verdi, e dei calici di diverso colore.

Il Rayo stabilisce, per distinguere i calici dai petali, che questi cadono subito che è formato il frutto, ed i calici sussistono; ma vi sono molti calici, che cascano appena allegato il frutto. Soggiunge il Rayo, che i petali sono sottili; ma ve ne sono ancora dei grossi, e si veggono eziandio le foglie di certi calici esser sottilissime. Siccome non si è potuto fino ad ora trovare un carattere abbastanza distintivo, fui costretto a lasciare indecisa questa questione nel Trattato degli Alberi e degli Arbuti, agli Articoli dell'Olmo e dell'*Elegnus*. Ma cadendo una tale incertezza sopra un piccolissimo numero di piante, sembra che la forma dei calici abbia giustamente meritato l'attenzione di quei Botanici i quali hanno procurato di disporre le piante sotto un ordine metodico. Farò ancora osservar di passaggio, che non essendo i petali essenziali alla fruttificazione niente più degli stami, questa indecisione non è d'un Articolo molto importante.

Esaminando l'organizzazione dei calici, vedesi che per la maggior parte formati sono della tessitura cellulare; ma attentamente esaminandoli, vedonsi anche in quelli dei vasi linfatici, e dei vasi proprj: il tutto è coperto d'un'epidermide. Parlerò intanto dei petali, per seguitare con ordine l'esame delle parti componenti i fiori.

ARTICOLO IV. *Dei Petali.*

ALCUNI fiori, i quali chiamansi *Fiori Apetali*, non hanno alcuna foglia colorata; può servir d'esempio l'*Ephedra*, il *Cbenopodium*, il *Casia*, la *Siliqua* o Caroba; e siccome questi fiori producono dei semi ben condizionati, può concludersi, che i petali non sono assolutamente necessarij per la fruttificazione. Ma tali eccezioni sono troppo poche, perchè possa dirsi, che le foglie colorate dei fiori, dai Botanici chiamate petali, formino quasi sempre la più vistosa parte dei fiori. I loro colori quasi sempre vivissimi e infinitamente varj, si fanno guardare da ognuno. Non starò a parlare di quel colore, che nei fiori vien detto *nero* dai Fioristi, perchè egli non è altro che un scuro o un violetto affai carico; ma in alcuni i petali son verdi, in altri sono di gialli diversi, o vivaci, o di color d'arancio, o di cedro. Molti fiori sono d'un rosso più o meno carico, o purpureo, o violetto, o del fior di lino: ve ne sono molti dei celesti e dei bianchi; e dalla diversa combinazione dei colori, nasce l'infinità delle differenze e delle tinte più vaghe. Se un medesimo petalo trovasi carico di questi color diversi, ed in modo che ognuno conservi tutta la sua purità e intensità, allora i fiori che a quelli appartengono, chiamansi *Fiori piccchettati*, e ne risultano molte volte dei mirabili effetti. E per questo appunto i Fioristi impiegano tanta cura e tanti dispendj a coltivare le Orecchie d'Orso, le Primevere, i Giacinti, i Tulipani, gli Anemoni, le Semidoppie, i Garofoli o le Viole, e molte altre piante, le quali offrono infinite varietà di colori. Questa facilità appunto che hanno le piante di certi generi a cambiar colore, e che tanto pregevoli le rende ai Fioristi, si è quella che ha distolto i Botanici dallo stabilire i loro metodi su d'un fondamento che va soggetto a troppi cambiamenti.

La forma dei petali è varia del pari del loro colore, ma ella è più costante in ciaschedun genere; e per questo appunto molti Metodici, e tra gli altri il Rayo e il Turneforzio, hanno studiate le dette forme, per stabilire i loro metodi sopra una parte la quale suol'essere molto apparente, e che fissa a prima vista lo sguardo dei meno attenti Osservatori. M'ingegnerò di dare colla possibile brevità, una idea delle diverse forme che si vedono nei petali.

Tav. I. fig. 32. L'*Amorpha* (Fig. 32) non avendo per petalo altro, che una so-
la

la foglia *b*, la quale non abbraccia tutto il fiore, potrebbe dirsi che questo fiore non ha altro che un mezzo petalo. Di questo genere non conosco altro, che questo Arboscello, ed inclinerei a chiamar tali fiori, *Semipetali*.

Molti fiori vi sono, che hanno un petalo solo: i Botanici gli chiamano *Monopetali*; altri che molti ne hanno, sono chiamati *Polipetali*. Non è sempre agevol cosa il decidere se i fiori loro sieno monopetali o polipetali; poichè quando un'unico petalo è diviso quasi fino alla base, pare che in tal caso egli sia un'unione di molti petali: questa difficoltà appunto incontrasi nel fior del Lauro (*Fig. 30*), Tav. I. fig. 30. in cui vedesi, che le intagliature si estendono fino alla base. Cessa una tale difficoltà quando il petalo si stacca tutto d'un pezzo, e resta una sola apertura nel fondo del fiore, come mostra la *Fig. 31*; Fig. 31. ma talvolta anche succede, che il petalo non è forato abbasso, come vedesi nel *Thymelea* (*Fig. 35*). Fig. 35.

I fiori monopetali sono alle volte divisi regolarmente negli orli come appunto son quelli rappresentati nelle *Fig. 36* e *37*, ed allora chiamansi *Monopetali regolari*: i *Monopetali irregolari* hanno gli orli divisi inugualmente, come nel *Cersoglio* (*Fig. 33*). Fig. 33.

Qualcheduno di questi fiori monopetali irregolari sono divisi in due gran labbri, i quali si suddividono in molti altri piccoli; chiamansi *Fiori labiati*: esempio sia l'*Isopo*. Ne parlerò a parte, come pure dei fiori a *gola* o a *maschera*, allorchè avrò terminato di percorrere i fiori monopetali regolari. Quando il petalo unico forma un tubo molto corto e che molto si sarga, rappresenta talvolta una rosetta in cinque, come nel Sambuco (*Fig. 36 a*) e in quattro nel *Burcardia* (*Fig. 36 b*). Se la parte superiore del petalo forma un tubo un poco più bislungo, e che le sue intagliature sieno slargate, questo fiore chiamasi *Fiore a sottocoppa*; di un tal genere sono il Tasso (*Fig. 37*), il quale ha quattro intagliature, ed il *Kalmia* (*Fig. 38*) Tav. II. fig. 38. il quale è diviso in cinque parti. La *Gualteria* (*Fig. 39*) porta un Fig. 39. petalo a guisa di un grosso tubo diritto, e diviso in cinque. La *Dirca* (*Fig. 40*) presenta anch'ella un grosso tubo, a guisa di cor- Fig. 40. netto ricurvo; ma tanto nell'uno che nell'altro le intagliature non si slargano niente a padiglione. Il *Periclymenum* forma anch'egli un tubo, ma più lungo e terminato in cinque intagliature (*Fig. 41*). Fig. 41. Le intagliature dell'*Azalea* sono molto più grandi (*Fig. 42*); l'*Oli-* Fig. 42.

- Tav. II. fig. 43. vo (*Fig. 43*) ha il tubo molto meno lungo, e le intagliature a proporzione più grandi. Le intagliature del *Chionanthus* (*Fig. 44*) sono quasi filamentoze. Si chiamano *fiori a imbuto* quelli, il di cui petalo forma colla sua parte posteriore un tubo fortissimo; il quale va il più delle volte a terminare in cinque intagliature larghe e rovesciate al di fuori, come nel *Gelsomino* e nel *Lilac* (*Fig. 45*). Chiamansi *fiori a campana*, quelli il di cui petalo slargasi un poco cominciando dalla parte posteriore fino all'intagliature; vedasi la *Bella-donna* (*Fig. 46*). I fiori, il di cui petalo si stringe in alto, chiamansi *fiori a nacchera*; l'*Erica* (*Fig. 47*), l'*Arbuto* o *Corbezzolo* (*Fig. 48*) e il *Guajacana* (*Fig. 49*) servono di esempio. Io credo che ciò basti in quanto ai fiori monopetali regolari, per far comprendere come, relativamente alle viste del Turneforzio, si possa dare un'idea della forma loro, col paragonarli a delle cose comunemente conosciute.

Ho già detto, che chiamansi *fiori monopetali irregolari* quelli che hanno un petalo solo inegualmente intagliato, quantunque molte volte simetricamente tagliato negli orli; ne ho già addotto l'esempio nel fior del Caprifoglio (*Fig. 33*): mi basterà di aggiungere ancora questa sorta di fiori presentino anch'esse molte varietà per la profondità, per la larghezza, e per li diversi contorni delle loro intagliature; ma prima di terminare ciò che a dir mi rimane intorno ai fiori monopetali irregolari, aggiungerò qualche cosa intorno ai *labiati*, dei quali videsi l'esempio nella *Fig. 34*. I fiori labiati si distinguono dagli altri monopetali irregolari, in quanto che hanno quattro stami attaccati al petalo, due de' quali sono più corti degli altri due, e quattro semi che non hanno altro involuppo, che il calice il quale sussiste fino alla maturità del frutto. Sono formati d'un tubo per lo più un poco ricurvo, il quale divideasi in due labbri principali, i quali in molti altri pezzi si suddividono; e siccome queste suddivisioni sono costantemente le medesime in tutte le piante d'un medesimo genere, se ne sono serviti i Botanici per stabilirne i caratteri. Ne riporterò solamente alcuni esempi. Il fior dell'*Ifopo* (*Fig. 52*) ha il labbro superiore *b* di mezzana grandezza, piatto e scanalato nel mezzo; il labbro inferiore *a* è diviso in tre; la divisione di mezzo più grande dell'altre, è vuota a guisa di cucchiario, ed è suddivisa in due parti che vanno a terminare in una punta. Il petalo della

La-

Lavanda (Fig. 53) è diviso in due labbri principali: la superiore è Tav. II. fig. 53. rilevata, tonda e scanalata nel mezzo; l'inferiore è divisa in tre parti quasi uguali e rotondeggiate. Il petalo dei fiori del *Chamadrìs* e quello del *Teucrium* (Fig. 54) son divisi in due labbri principali; Fig. 54. ma il superiore è suddiviso in due per tutta la sua lunghezza, lo che ha fatto credere ch'ei non vi fosse: il labbro inferiore è diviso in tre; il pezzo di mezzo è più grande degli altri, ed è vuoto a guisa di cucchiajo. In tal modo distinguonsi i fiori labiati.

Sebbene il Turneforzio abbia posto le *Bignonie* nella serie dei fiori in maschera, con tutto ciò, siccome questi fiori non caratterizzano quanto basta la figura di quelle che si chiamano con tal nome, mi servirò, per darne una leggiera idea, del Muso di Vacca (Fig. 55), Fig. 55. e vi aggiungerò la Linaria (Fig. 56) per dare un'esempio dello Specerone o del Cappuccio, che trovasi nella parte del petalo di molti fiori. Fig. 56.

Tutti i fiori fin quì nominati son solitarj; cioè a dire, ciascheduno rinchiede separatamente un completo apparecchio di organi conosciuti necessarj per la fruttificazione, cioè gli stami, i pistilli, molte volte anche i petali ed il calice. D'uopo è adesso di dir qualche cosa dei fiori ammucchiati a guisa di testa, o formati dalla unione di molti piccoli fiorellini, ognun dei quali contiene, o tutti, o parte degli organi necessarj alla fruttificazione. Sono questi fiorellini uniti tutti in un calice comune: ma siccome rarissime volte essi trovansi sugli alberi e sugli arbuti, poche cose ne dirò di passaggio.

Io pongo quì ciò che dir doveva intorno a questa sorta di fiori; per la ragione che i piccoli fiori, di cui sono composti, hanno sempre il petalo d'un pezzo solo. Se questo petalo è regolare come nella Fig. 57, questi piccoli fiori chiamansi *fioretti* o *fiorellini*; se poi Fig. 57. il loro petalo è irregolare, come nella Fig. 58, chiamansi *femi-fiorellini*: ma per questa sorta di fiori egli è essenziale, che sieno rinchiusi in un calice comune; e questo è ciò che gli distingue dai fiori a mazzetti, o a ciocche: eccone degli esempi. Il fiore dell'Assenzio (Fig. 60) il quale è composto di fiorellini, come si è quello Fig. 60. della Fig. 59. quello del *Baccharis* (Fig. 62) il quale è formato Fig. 59. e 62. di fiorellini raccolti in un calice solo, simili a quello della Fig. 61. Fig. 61. come pure quello dell'Abrotano (Fig. 22), e quello della *Globularia* Fig. 22. (Fig. 23) chiamansi *fiori a fiorellini*. Fig. 23.

Potrebbe anche ridurre ad un tal genere il *Cephalanthus*, il di cui fiore è formato da una unione di fiorellini radunati a guisa di testa in un calice comune.

Chiamansi *fiori a semi-fiorellini* quelli, che formati sono da un certo numero di semi-fiorellini, cioè, di piccoli fiori monopetali irregolari, che vanno a terminare in un labbro, e rinchiusi in un calice comune. Non conoscendo albero alcuno nè arbutto, che abbiano una tal sorta di fiori, addurrò solamente per esempio quello della

- Tav. II. fig. 63. Cicerbita (Fig. 63). Vi sono ancora dei fiori in mezzo a cui vi stanno dei fiorellini, i quali formano delle specie di raggi, per il
Fig. 64. che vengono chiamati *fiori radiati*. L'*Otbonna* (Fig. 64) ce ne dà un'esempio. Passo adesso ai fiori *polipetali*.

I fiori composti di molte foglie possono distinguersi in *polipetali regolari*, e in *polipetali irregolari*. I fiori polipetali regolari sono,
Fig. 65. come quelli del Prugno o Sufino (Fig. 65), guerniti di molte foglie, quasi di figura simile, e disposte con molta regolarità in tondo attorno al fiore.

Le foglie dei polipetali irregolari sono molto diverse le une dall'altre per la lor forma e positura; porto per esempio la Ginestra
Fig. 66. (Fig. 66). In quanto al numero, potrebbe dirsi, che l'*Amorpha* (Fig. 32) ha un petalo solo, senza esser per questo del genere dei monopetali; perchè questo solo petalo non rinchiede affatto le parti essenziali al fiore. Il Busso ha due petali; il *Chamelea*, l'*Empetrum* hanno tre petali; il Capperò, il *Gleditsia*, la Ruta, l'*Hamamelis*, e spesso la *Clematis* hanno quattro petali. I fiori del Pesco, dell'*Hypericum*, dell'*Azedarach*, del *Ceanothus*, del Cisto, del *Clethra*, dell'*Evonymoides*, del *Grewia*, e di molte altre hanno cinque petali. I fiori dello Sparagio, del Crèspino, dell'*Anona* ne hanno sei: quelli del Granato ne hanno otto: quelli finalmente della *Magnolia*, e spesso della *Tulipifera*, ne hanno nove. Finisco adesso il dettaglio del numero dei petali, perchè per anche non trattasi dei fiori doppi. Tutti i fiori fin qui nominati potranno esaminarsi nelle Vignette del Trattato degli Alberi e degli Arbutti che ho già dato al pubblico.

In quanto alla parte a cui i petali stanno attaccati ai fiori, quelli
Fig. 67. del Capperò, della Perforata o Perfoliata (Fig. 67) dell'*Anona*, del Cisto, dell'*Evonymoides*, del *Grewia* sono attaccate in fondo al calice, o sotto all'embrione. Quelli dei *Peri*, dell'*Hydrangea*, del

Man-

Mandorlo (Fig. 68) ec. sono attaccati agli angoli di dentro formati Tav. II. fig. 68. dalle intagliature del calice. Quelli finalmente del *Ceanothus* (Fig. 69) Fig. 69. sono attaccati all'angolo che sporge in fuori, o alla punta delle intagliature del calice.

In quanto alla reciproca loro disposizione, io non so che siavi alcun fiore d'albero o d'arbusto che si possa ridurre alle *Crucifere*, nè alle *Liliacee*; così pure i petali di quasi tutti i fiori regolari degli alberi e degli arbusti sono disposti in forma di rosa: se non che, alcuni sono larghi e rotondi, come nel *Cistus*: altri ovati come nell'*Ascyrum*; altri lunghissimi a proporzione della loro larghezza, come nell'*Hamamelis*; molti son piccolissimi, come nell'*Alaterno*: ve n'ha dei piatti; molti son vuoti a guisa di cucchiajo: alcuni finalmente incavati o scanalati, ed anche dentati negli orli, come quelli della *Ruta*. Tutte queste circostanze bastano a distinguere le piante di diverso genere o di diversa specie. E per non moltiplicare soverchiamente le figure, vedasi parimente il Trattato degli Alberi e degli Arbusti.

V'è qualche fiore, come quelli del *Parvia*, i quali ponno esser considerati come irregolari, a cagione della bizzarra disposizione dei loro petali; ma il maggior numero dei polipetali irregolari sono del genere di quelli che si chiamano *leguminosi* o *papilionacei* (Fig. 66). Fig. 66. Questa sorte di fiori son composti di quattro o cinque petali, ai quali furono dati diversi nomi. Il petalo *a*, che stà nella parte superiore del fiore, e che è ordinariamente più grande degli altri, chiamasi la farfalla o *papilione*: egli è disteso e rovesciato all'indietro, come nella Falsa-Acacia, nella Ginestra, nel *Colutea*, nel *Barba-Jovis* (Fig. 79): Fig. 79. egli è ripiegato sugli altri petali, che in parte circonda, come nell'*Anagyris* (Fig. 72) talvolta egli è tutto unito; talvolta scanalato Fig. 72. nel mezzo: certi fiori hanno il detto petalo molto grande, altri molto piccolo.

La parte di sotto dei fiori leguminosi è formata dalla *navicella* b (Fig. 66): suol'essere questa parte ricurva; ella è talvolta della figura d'uno Zoccolo; e quantunque la navicella sia composta d'un pezzo solo o di due immediatamente applicati l'uno contro dell'altro; ella forma quasi sempre una convessità dalla parte di fuori, ed una concavità dalla parte di dentro. Io non starò a dettagliare le diverse forme di questa parte nei fiori di diverso genere.

Tra il *papilione* e la *navicella*, e verso i lati vedonsi le *ali* c (Fig.

- Tav. II. fig. 66. (Fig. 66), le quali sono talvolta appuntate, talvolta più o meno rotonde, e più o meno discoste dall'asse del fiore. Siccome troppo lungo sarebbe il dettagliare tutte le forme di questi petali nei generi Fig. 73, e 74. diversi, mi basta il mandare alle Fig. 73 *Emerus*, 74 *Cytisus*, la Fig. 75. di cui navicella è coperta dalle ali: nella *Coronilla* (Fig. 75) non Fig. 76. distinguesi la navicella; nell'*Anonis* (Fig. 76) il papilione e le ali son rimboccate sulla navicella.

Dopo aver parlato del colore, delle diverse forme, e delle diverse positure rispettive dei petali, è necessario dir qualche cosa della loro organizzazione; non si può fare a meno di non vedervi la tessitura cellulare. Lasciando per qualche giorno un petalo nell'acqua, scorronsi visibilmente dei fascetti di vasi, i quali dividonsi a guisa di ramificazione, come può vedersi nella Fig. 77. Si ponno separar questi vasi gli uni dagli altri, mediante una più lunga macerazione, ed allora pare che questi fasci da null'altro formati sieno, che da vasi a spirale. Questa osservazione giustifica l'opinione del Malpighi, il quale dice, che i petali traggono la loro origine dal corpo legnoso; poichè tal sorta di vasi non ritrovasi nella scorza. L'odore d'alcuni petali fa credere, che abbiano un sugo proprio: tutte queste parti in somma son coperte d'un'epidermide.

In quanto all'uso dei petali, quantunque abbiano alcuni Botanici creduto che potessero esser questi considerati come un semplice abbellimento, egli è per altro probabile, che abbiano un'uso più relativo e più utile alla pianta, e indipendente da quelle idee, che il volgo vi applica. Hanno creduto molti Autori, che questi unicamente servano d'inviluppo agli organi della fruttificazione: ciò forse può darsi; ma pure se si rifletta, che nel bottone questi petali ordinariamente non formansi se non dopo gli stami e i pistilli, forza sarà l'accordare, che non servano ad una tal funzione, poichè le squame dei bottoni possono bastare a tale officio; ma appena che s'apron le squame, i petali compariscono quasi sempre prima delli stami e dei pistilli, e non può negarsi, che allora essi servir non possano a difendere e proteggere le dette parti; ma ciò dura per brevissimo tempo, poichè presto s'aprono i petali, e le altre parti del fiore esposte rimangono ai freddi di primavera.

Siccome i petali sono le foglie dei fiori, potrebbe crederli, che essi servano, rispetto a loro, agli usi istessi, ai quali le foglie degli alberi

beri servono, rispetto agli alberi medesimi; e che quindi in queste parti, ove sono molti organi, e dove il sugo deve passare per delle grandi preparazioni, le foglie vi facciano l'ufficio d'organi secretorj, e vi operino la traspirazione la quale rianima in quella parte il moto del sugo. Non pretendo già di limitare l'uso dei petali a queste sole funzioni; anzi egli è probabile che ne facciano eziandio delle più importanti, quantunque sia ben provato, che queste parti non sieno assolutamente necessarie alla fruttificazione, imperciocchè, siccome ho detto, si vedono molti fiori i quali danno dei frutti e dei semi benissimo condizionati, quantunque non abbiano petali.

Darò fine al presente Articolo, col fare osservare insieme col Grewio che i petali sono con molta simetria piegati entro i bottoni, e che ogni genere ha la maniera sua particolare di star piegato. Ed infatti si vede nei bottoni delle rose, che i petali sono semplicemente distesi e stretti l'uno addosso all'altro. Nella *Blattaria* dal fior bianco, essi sono concavi, e posti l'uno dentro dell'altro. I petali dei fiori leguminosi sono piegati con una piega sola: il petalo del *Cyanus* o Turchinetta ha due pieghe. Nella *Caltha*, nella Margherita, ec. sono ripiegati e distesi l'uno addosso dell'altro. In una specie di *Clematita* sono rotolati: nella *Malva* sono ravvolti a spirale. Sono i petali finalmente piegati e ravvolti a spirale nella Campanella e nel *Doronico*.

ARTICOLO V. Delli Stami.

OCCUPANO ordinariamente gli Stami il disco interno dei petali dei fiori: sono questi stami tanti piccoli fili che portano in cima un bottoncino colorato. Questa essenzialissima parte alla fruttificazione merita un particolare riflesso. Ed infatti, come dice il Geoffroy, nelle Memorie dell'Accademia del 1711, vi sono in essa moltissime osservabili varietà, tanto intorno alla forma delle cime o antere, quanto intorno al modo di aprirsi, ed intorno al numero delli stami: e siccome sono essi costanti in ciaschedun genere, non devonfi trascurare nei caratteri delle piante dedotti dai fiori, poichè tra tutte le parti dei fiori questa è una delle più essenziali.

Per dare una giusta idea delli stami, comincerò dal riportare le osservazioni che ho fatte col microscopio sulli stami del Ciriegio, su di quelli del *Pesco*, del *Pero* e del *Pomo*: riporterò di poi le dif-

differenze le più sensibili che si vedono, osservando gli stami dei fiori di diversi alberi ed arbusti; differenze che dipendono dalla loro posizione, dal loro numero e dalla forma loro.

§. 1. *Esame degli Stami dei fiori del Pesco, del Ciriegio, del Pero, e del Pomo, guardati colla Lente e col Microscopio.*

SICCOME gli Stami dei fiori di questi differenti alberi molto si rassomigliano, mi basterà di descriverne uno solo, facendo osservare le piccole differenze, che ho scoperte in essi. Gli stami dei fiori di cui si tratta prendono origine dal Calice; quelli del Pero si partono dal fondo del calice, e quelli del Pesco dalle di lui interne pareti. Se esaminansi questi stami ad occhio nudo, vedesi un filetto ter-

Tav. III. fig. 80. minato da due piccioli corpi colorati (Fig. 80); ma coll'ajuto d'

Fig. 81. una lente vedesi manifestamente (Fig. 81), che essi sono formati d'un filetto, o pedicelo *a*, il quale ha in cima due capsule *b* fatte a guisa d'oliva, e divise nella loro lunghezza da un canaletto. Debbono farsi queste osservazioni allora, che il fiore non è per anche aperto, o quando egli è aperto di poco; poichè col tempo cambiasi la forma delle dette capsule. Queste capsule di forma olivare chiamansi le *cime* o i *granelletti* o *antere degli stami*; elleno sono più bislunghe nei Peri, e nei Pomi, che nei Ciriegi e nei Peschi. Sono queste cime rosse nei fiori della maggior parte dei Peschi, e dei Peri, gialle in quelli dei Ciriegi, e dei Pomi, ma esaminandole colla lente o col microscopio, vedesi che il color generale delle dette cime è solamente d'un rosso o d'un giallo pallido, ma moscato o macchiato d'un rosso o d'un giallo più carico, il quale accresce la vivacità del loro colore.

In quanto ai pediculi o filetti, ordinariamente son bianchi, picchiati di rosso in alcune specie di Peschi; ma nella maggior parte dei Ciriegi, in vece delle nominate tacche o macchiette, altro non vedesi, che alcuni segni più lucidi del resto. Nel Nespolo volgare i filetti sono del colore di rosa.

Qualche tempo dopo lo aprirsi dei fiori, s'aprono anche le cime degli stami da quella fessura o canaletto longitudinale il quale vedesi nella Fig. 81, e le capsule aperte rappresentano due piccoli scudi uni-

Fig. 82. ti l'uno contro l'altro dalla parte posteriore (Fig. 82) che sono attaccati

cati insieme per il pedicelo (*Fig. 83*). Rinchiudono queste cime una *Tav. III. fig. 83.* sottilissima polvere, la quale casca fulli scudetti quando aperte sono le capsule. Un raggio di Sole alquanto vivo sollecita l'apertura delle dette cime; ed io credo, che questa apertura si faccia per uno istantaneo ritiramento dei fili, che formano le capsule, e per una meccanica quasi simile a quella, che fa spuntare le semenze della Balfamina e del Cocomero salvatico. Quello che è certo s'è, che le dette cime sogliono aprirsi per una scossa, che fa sollevare molta polvere; essa può vederfi, come una nebbia al levar del Sole, nei campi di biade allorchè vanno in fiore; ed in tanta copia ella esce dal Cipresso, che è stata talvolta creduta fumo. Molta per altro ne rimane sulle capsule aperte, per dare a queste quel colore, che è proprio delle dette polveri. Questo colore il più delle volte è giallo, talvolta violetto, o di qualunque altro colore, secondo le varie specie delle piante. Vedesi nella (*Fig. 82*), che gli scudetti sono nel mezzo rialzati da una eminenza; e sono anche contornati da una specie d'orletto. Questi scudetti, nelle specie di cui si parla, sono ordinariamente ovali, ma nel seccarsi prendono delle forme stravaganti.

Ho detto che le cime contengono molta polvere sottilissima, ed io la chiamo *Polvere* a causa della estrema finezza dei suoi granelli; poichè il microscopio ce la fa vedere nello specie, di cui si tratta, ovale, (*Fig. 84*) e trasparente, certamente a causa della sua finezza; *Fig. 84.* e pare, che ciaschedun granello diviso sia in tanti lobi, o in una specie di ramificazione più oscura del rimanente. Io credo, che questa polvere sia attaccata nelle dette cime con alcuni filetti sottilissimi e facilmente rompibili, per il che agevolmente ella si stacca; ma non ho potuto chiaramente distinguere queste attaccature, se non su delle polveri di certe specie di fiori.

Questo è quanto mi hanno concesso i microscopj di poter iscorgere su gli stami di cui si tratta. Parlerò adesso delle differenze, che si osservano fra li stami delle piante di diversi generi.

§. II. *Del numero delli Stami.*

VARIA il numero delli Stami nei diversi generi, ma pare, che sia costantemente lo stesso in ciaschedun genere, per lo che il Linneo si è determinato a fissarne sopra di questo la base del suo metodo. Non può negarsi, che non si trovi talvolta vario il numero delli stami

PARTE I.

N

nel.

nelle piante d'un medesimo genere, ed eziandio talvolta nel medesimo individuo; ma siccome non vi è alcun metodo fin ora conosciuto, che del tutto sia libero da simili incertezze, io credo, che seguendo l'orme di un tanto Botanico, il numero delli stami debba servir di fondamento ai metodi; e molto gli dobbiamo essere obbligati per tante belle osservazioni, che egli ha fatto sopra di questo; poichè, il tutto ben considerato, ell'è cosa più sicura il fermarsi su ciò, che più frequentemente accade, senza niente abbadare a qualche raro accidente, che come un semplice scherzo della natura debbe considerarsi. Sopra questo fondamento appunto, noi diciamo, che i fiori del Lilac, del Gelsomino, del Ligustro, della *Phyllirea* hanno due stami; che il fiore della *Chamaelea*, e della *Canna* ne ha tre; che quattro sono nei fiori della *Burcardia*, dell'*Elaeagnus*, del Taffo, del Corniolo, ed in tutti i fiori labiati; cinque nei fiori del Sambuco, del *Periclymenum*, della Pervinca, del *Ramno*, o Pruno; della vite; sei in quelli dell'*Yucca*, e dell'Uva Crespina; sette nella *Pavia*, e nel Marrone d'India; otto nell'Erica, nella *Guajacana*, nella Ruta; nove nel Lauro; dieci nel *Chamerbodorodendros*, nell'Arbuto o Corbezzolo, e nei fiori leguminosi. Molti altri fiori finalmente, come quelli del Pesco, del Pero, del Rosajo, dell'Iperico, del Capparo, del Cisto, hanno un maggior numero di stami.

§. III. *Delle diverse figure dei Pediculi o Filetti delli Stami, della forma delle loro Cime; e della loro positura nei fiori.*

Non pretendo già d'intraprendere una esatta enumerazione delle diverse forme, che prendono i pediculi o filetti, come pure le cime delli Stami; ma farò soltanto rilevare le più visibili differenze.

In molte piante, come nel *Ketmia*, i filetti delli stami sono abbasso uniti insieme a mazzo; talvolta questi pediculi si uniscono solamente a fascetti, i quali formano dei corpi separati, come nell'Iperico. In quasi tutti i fiori leguminosi i pediculi sono riuniti, e formano una guaina, dentro a cui passa il pistillo, in modo tale, che una delle estremità della detta guaina sta attaccata alla base del pistillo o al fondello del fiore, e l'altra estremità sostiene le cime.

Il più delle volte ogni stame ha il suo pedicelo separato dagli altri

tri

tri per tutta la sua lunghezza: nel Capperò ed in molte altre piante gli stami attaccati sono alla base del pistillo: essi sono nel pistillo anche nell'Ebano. In molti fiori, come in quelli del Mandorlo, del Pesco, del Rosajo, ec. gli stami sono attaccati alle interne pareti del calice: e gli stami dell'Alaterno hanno la loro attaccatura nell'istesso punto dei petali. In molti fiori gli stami si partono dal petalo: nella *Bella-donna* l'attaccatura delli stami è vicinissima alla base del petalo, ed all'opposto la detta inserzione è a diverse altezze nell'interno del petalo dei fiori della *Bignonia*, del Caprifoglio, del *Cephalanthus*, del *Jasminoides*. Nel Vischio le cime stanno immediatamente attaccate ai petali (Fig. 101), senza che si possa scorgere filetto alcuno, che le sostenga. Sono i pediculi alle volte talmente corti, che gli stami non oltrepassano il petalo: serva d'esempio il *Cephalanthus* (Fig. 88) e la *Gualteria* (Fig. 94); ed al contrario Fig. 88, e 94. i fili delli stami sono alle volte talmente lunghi, che superano di molto i petali, come nel Capperò (Fig. 87): i pediculi degli stami Fig. 87. della *Diervilla* (Fig. 91), e della *Pervinca* (Fig. 98) son guerniti Fig. 91, e 98. di peli. Finalmente nei fiori della *Salvia* vedonsi due cime attaccate insieme, ed in singolar guisa, con un filetto forcutò (Fig. 99). Fig. 99.

Le cime ancora presentano molte varietà, tanto per il loro colore, il quale il più delle volte suol'essere d'un giallo rosso, come nel *Pavia*, o violetto carico, come nella *Spina-alba*, quanto rapporto al numero delle loro capsule ed alla loro configurazione: per esempio gli stami della *Mercorella* hanno una capsula sola: quelli dei *Peschi* ne hanno due: quelli dell'*Orchis* tre, e quelli della *Fritillaria* quattro. Negli alberi sono le cime il più delle volte formate di due capsule a forma d'oliva (Fig. 80): sono alcuna volta le capsule quasi Fig. 80. rotonde; talora formano colla di loro unione una massa quadrata, o son bislunghe, come nel *Periclymenum* (Fig. 97). Gli stami delle Fig. 97. *Arundinacee* (Fig. 86) pendono da un sottil filo: talvolta le cime Fig. 86. sono tenacemente sostenute dal pediculo, o fatte in figura d'un T, la di cui linea superiore sarà più da una parte, che dall'altra, come nel *Cephalanthus* (Fig. 88). Gli stami del *Clethra* (Fig. 90) Fig. 88. e 90. son composti d'una cima *a* formata di due capsule, le quali si slargano dall'alto *b*, quando gli stami son vicini alla loro maturità, ed all'incontro in alcuni altri stami (Fig. 90) le capsule si slargano abbasso *c*. Quelle della *Gualteria* (Fig. 94) sono piantate diritte sul Fig. 94.

di loro pedicelo; e siccome elleno s'aprono in alto, e terminano in una punta, elleno formano due specie di corni.

- Tav. III. fig. 92. Il fiore della Passione (Fig. 92) ha delle cime o antere grosse, le quali sembrano attaccate al pedicelo come un martello sta unito al suo manico: le cime delli stami della *Tulipifera* (Fig. 100) sono molto bislunghe: gli stami della *Magnolia* (Fig. 95) sono piatti e contornati dalle cime. Gli stami del *Nerion* (Fig. 96) sono singolari, in quanto che le loro cime si rassomigliano ad un ferro di lancia, la di cui punta finisce in un filetto guernito di denti, come la barba d'una penna: gli stami dei fiori a fiorellini ed a semifiorellini terminano il più delle volte come un tubo infilato dal pistillo.

Anche le capsule s'aprono in varj modi: molte volte si aprono per lo lungo, come vedesi in quelle del Pesco; o nella base loro, come nell'*Epimedium*: in altre piante s'aprono nella punta, come nel *Galanthus*, o da due parti, come nell'*Erica*.

- Siccome non è possibile d'entrare in un'esatto dettaglio delle differenze, che sono particolari ad ogni specie di piante, basterà, per averne una idea generale, il dare un'occhiata sulle Fig. 102 103 104 105 106. 104 105 106, nelle quali gli stami sono rappresentati molto in grande, e in diverse situazioni ad oggetto di dare una idea più esatta delle cime, delle capsule, e del loro pedicelo. Le Fig. 107 e 108 rappresentano gli stami della Piantaggine, e fanno vedere, che le capsule talvolta altro non sono che un gonfiamento del pedicelo. Le Fig. 109 e 110. Fig. 109 e 110 rappresentano gli stami dell'*Epimedium*, e fanno esse vedere, che le capsule s'aprono alle volte dal basso all'alto. Ho creduto finalmente dover rappresentare eziandio (Fig. 111) gli stami dei fiori maschi del *Melopepo* o *Popone*, nel quale le polveri son contenute in certe capsule lunghe, attaccate come un nastro su d'una testa, che ha la figura d'una mezza ellisse.

Essendo gli stami formati delle medesime parti organiche dei petali, non è maraviglia, che essi alle volte si cambino in tutto o in parte in petali, lo che in alcune circostanze fa dei fiori doppi sterili. Ne parleremo altrove.

§. IV. Della polvere contenuta nelle Cime o Antere.

ESAMINANDO col microscopio le polveri degli stami dei diversi generi delle piante, conoscesi che vi è tra di loro della differenza nel colo-

colore, nella grossezza, ed ancora nella figura loro: alcune son trasparenti, come nell'Acero, altre son bianche, altre purpuree, altre color di carne, altre turchine o brune; ma la maggior parte delle dette polveri è d'un giallo più o meno carico.

Con tutto che sembri non essere le dette polveri altro, che un vapore, il quale è stato alle volte creduto, come ho già detto, un fumo, scorgesi per altro, coll'ajuto del microscopio, che quelle delle piante di diversi generi hanno talvolta delle forme molto diverse le une dall'altre. Se ne vedono delle ovali, e tra queste ve n'ha di quelle che hanno delle scanalature; e siccome sono più o meno bislunghe, e più o meno appuntate nelle cime, si potrebbero paragonare, ora ad un granello di biada, ora ad un granello d'orzo, o ad un granello di caffè, o ad un nocciolo di dattero, o ad un'oliva: se ne trovano ancora delle cilindriche, delle prismatiche; altre sono della figura d'una palla incatenata; altre hanno la forma d'un reno; alcune finalmente son liscie ed unite, ed altre pajono sagrinatte: la Fig. 113 potrà dar l'idea di queste diverse forme. Non v'ha dubbio, che questa polvere non contenga molta sostanza sulfurea, perchè ella arde alla fiaccola d'una candela, come se fosse una resina polverizzata; ma pure non si scioglie nell'acqua, se anche fosse bollente: lo spirito di vino ne attrae alle volte una leggiera tintura, ma non la scioglie; forse il solo liquore, che ella contiene, farà quello che si mescola collo spirito di vino; e potrebbe anche darsi, che ella fosse una resina, o una sostanza mucillaginosa da cui bagnate sono alcune polveri, oppure una resina concreta ridotta in una sottilissima polvere, che si trova con quelle.

Ho detto che i granelli di queste polveri sono organizzati: può ciò riscontrarsi col microscopio, e procurarsi nel tempo stesso un piacevolissimo diletto; poichè mettendo certe polveri di stami, della Valeriana, per esempio, su d'una lastra di vetro sottoposta al raggio d'una lente acuta, se ne vedranno alcune, che scoppieranno per la punta come una piccola bomba, e si vedrà uscir fuori un liquore simile alla sciliva, in cui confusamente vedonsi dei piccoli granelli, vedi la Fig. 85. Mi ricordo, che faranno omai più di dieci anni, che il Signor Bernardo di Jussieu mi fece vedere, che mettendo dei granelli d'una certa polvere sopra l'acqua, vedevansi da quelli uscir fuori uno schizzo di liquore, che galleggiava e distendevasi sulla su-

perficie del detto fluido , come una gocciola d'olio . Esaminando il detto Botanico col microscopio le polveri dell' Acero , le vidde di forma rotonda , e le vidde aprirsi in quattro ; parevano allora tante piccole croci , lo che ha fatto credere qualche osservatore , che le polveri degl' Aceri avessero effettivamente quella figura . Volendo appoggiarsi alle osservazioni microscopiche del Malpighi , del Grewio , del Marilano , e del Geoffroy , s'inchinerà a credere , che le polveri presentino tante figure diverse , quante nelle semenze se ne osservano .

ARTICOLO VI. *Dei Pistilli.*

VEDESI nel centro dei fiori uno o più filetti , che per la forma loro agevolmente distinguonfi dagli stami: non sono questi filetti terminati da capsule ripiene di polvere; e di più sono sempre piantati sopra l'embrione , o almeno vi si accostano facendo un piccolo uncino . Hanno i Botanici chiamata questa parte il *Pistillo* . Questi organi sono molto differenti nelle piante di diverso genere ; ma prima d'entrare in questi dettagli , per dare una idea de' pistilli considerati in generale , riporterò le particolari osservazioni fatte sopra i pistilli d'alcuni alberi: prendo per esempio il Mandorlo ed il Pero .

§. I. *Esame del Pistillo del Mandorlo e del Pero.*

- Tav. III. fig. 114. Il Pistillo del fior del Mandorlo (*Fig. 114*) si slarga nella sua estremità superiore *a* , e rappresenta l'estremità d'un corno da caccia ; in quella parte sembra granoso , e come formato di corpi glandulosi , o di vesciche ripiene d'un sugo viscoso : chiamasi questa parte la *Stimata* . Dice il Malpighi di avere osservato , che questa parte è inverniciata d'una sottilissima trementina . Da *a* fino verso *b* vi è un filetto dai Botanici chiamato *Stilo* : fa capo questo filetto ad un gonfiamento *c* , il quale è l'embrione in cui vedesi il nocciolo e la mandorla , la quale è la parte utile dei frutti , relativamente alla moltiplicazione delle specie . Vi sono alcuni pistilli (*Fig. 116*) la di cui stimata , in vece d'essere glandulosa , sembra esser pelosa ; ell'è talvolta ricoperta di finissimi peli , e par vellutata (*Fig. 123*) ; talvolta i piccoli filamenti son disposti a guisa di pennacchio o ciuffo (*Fig. 124. e 125.*) (*Fig. 124 e 125*) : pare che talvolta i detti peli sieno fistolosi . Si pretende , che l'epidermide non si estenda sulle stimate , e ch'ella sia rimpiazzata da un'umore viscoso ; sopra di che non saprei cosa dire .

Nel-

Nelle Pesche vellutate, come ancor nelle mandorle, una parte dello stilo, e la totalità dell'embrione son guerniti di peli; ma pochissimi se ne vedono su i pistilli delle brugnote, delle pesche violette, e delle albicocche: e (Fig. 114 Tav. III.) rappresenta la coda o gambo del frutto, il quale sostiene nel tempo del fiore, oltre il pistillo, il calice *g* carico dei petali, e delli stami *f*. Tav. III. fig. 114.

Il Pero, ed il Pomo, i di cui frutti cinque cellette rinferano, hanno il pistillo formato di cinque filetti terminati in altrettante stimate, o cinque pistilli, come può vederfi nella Fig. 115. Tav. III. Fig. 115. I Rosaj, i Cisti, i Mori, i quali hanno i frutti ripieni di molti semi ammuccati a guisa di testa, hanno tanti pistilli quanti hanno embrioni; non deve però prenderfi come una regola generale, che il numero dei pistilli sia uguale a quello dei semi, nè a quello delle capsule ripiene di semi. Il fior d'Arancio ha un pistillo solo; eppure vi sono delle Arancie, che hanno più di quindici granelli: il Pero, che non ha altro che cinque stili, deve contener nel suo frutto dieci granelli: il Granato, o mela granata, che tanti granelli contiene, ha un solo pistillo: il *Chamberbodorodendros* il di cui frutto è una capsula con cinque cellette, dentro a cui stanno moltissimi semi, ha un solo pistillo. In molti fiori la stimata si divide in tante parti quante sono le cellette dell'embrione; la stimata, per esempio, del Tulipano, e di quasi tutte le *Liliacee* si divide in tre parti, e l'embrione contiene altrettante cellule. Le *Ombellifere*, che fanno due semi, hanno la stimata doppia; e potrebbonsi nominare alcune piante i di cui frutti hanno quattro cellette, le quali hanno quattro stimate; altre, sei cellette e sei stimate; altre, dieci cellette e dieci stimate. Se queste osservazioni si estendessero sopra tutte le piante, potrebbesi credere, che le *Liliacee*, per esempio, abbiano tre pistilli, i di cui stili si riuniscono in uno, a somiglianza delle tre capsule, che non fanno altro che un frutto. Mi si presenterà l'occasione di continuare questa idea; ma si ritorni al Pero.

Veggonsi nel mezzo del fiore (Fig. 115) cinque stili terminati dalle stimate, le quali si slargano presso a poco, come quello del Mandorlo: pare che questi cinque stili sieno piantati sopra d'un solo embrione; ma colla dissezione si vede, che essi passano per un buco o canale glanduloso, senza essere in verun conto aderenti al detto canale; e nell'interno della pera avvi una cavità contornata da cin-

que reste, le quali sono una prolungazione dei pistilli: ciascheduna delle dette reste o spine corrisponde ad una capsula, nella quale vi devono essere due acini o granelli. Se vogliasi considerare ogni capsula come un embrione separato, può dirsi, che il fiore del pero ha cinque pistilli; ma se si abbada solamente alla semplice apparenza, senza penetrare nell'interno del frutto, contentandosi di considerare la piccola pera come un'unico embrione, potrà dirsi, che il pistillo del fior del Pero è formato d'un'embrione di cinque stili, e d'altretante stimmate.

I fiori del Mandorlo e quelli del Pero, da me scelti per dare un'idea dettagliata dei pistilli, mi mettono in istato di fare osservare la diversa positura degli embrioni, alcuni dei quali, sostenuti da un pedicelo, sono solamente contenuti nel calice (Fig. 114), e gli altri Fig. 115. fanno parte del calice istesso (Fig. 115).

§. II. Dei Pistilli in generale.

SEBBENE io abbia detto, che i pistilli sieno formati di tre diverse parti; cioè dell'embrione, dello stilo, e delle stimmate: vi sono non ostante dei pistilli bene organizzati, in cui altro non vedesi che l'embrione e la stimma: quello della *Thymelaea* è piatto, ed immediatamente posto sopra l'embrione. Poca differenza vi è nel *Toxicodendron*: nella *Ptelea* si vedono solamente tre stimmate appuntate senza stilo: egli è quasi la stessa cosa nel Sumacco; lo stesso può dirsi del *Molle*, del *Nerion* e del Noce; dal che può inferirsi, o che lo stilo non sia una parte essenziale per rendere un pistillo perfetto, o che negli esempj ora citati, lo stilo è talmente corto, che può dubitarsi della sua esistenza.

Vi sono alcuni pistilli, come quelli del Capperò (Fig. 16 Tav. I.) il di cui stilo par che si parta dal fondo del fiore; ha nella sua estremità l'embrione sopra di cui è immediatamente posta la stimma. Alcuni altri stili, come quello della *Bella-donna*, e del Gelsomino (Fig. 118), sono semplici e diritti: gli stili di molti fiori, specialmente dei fiori a gola, come pure quelli di quasi tutti i fiori leguminosi, sono curvi; altri sono forcuti, come nell'Abrotano, nell' Fig. 119. Acero, nel *Baccharis*, nel Lilac (Fig. 119). Lo stilo della *Guajana* Fig. 120. *cana* si divide in quattro; quello del *Ketmia* in cinque (Fig. 120): nel fior della *Passione*, si partono dall'embrione tre stili, i quali

li vanno a terminare in tre grosse stimate, e son simili a tanti chiodi.

Vi sono nei fiori delle Clematite cinque in sei pistilli, i quali corrispondono ad altrettanti embrioni. Questa molteplicità di pistilli osservasi in molti fiori, i di cui semi sono uniti a guisa di testa; ma nella clematita vi è questo di singolare, che gli stili si slungano, e son guerniti di peli simili alla barba d'una penna. Se si esaminassero i pistilli di tutte le piante, se ne troverebbero dei filamentosi, dei tondi, dei quadri, de' triangolari, degli ovali, dei simili ad un fuso, ad un pestello, ad una colonna.

Anche le stimate presentano molti argomenti d'osservazione. La stimata finisce alle volte lo stilo con uno slargamento che può paragonarsi all'estremità d'un corno da caccia, come ho già fatto osservare (Fig. 114); oppure lo stilo s'ingrossa verso quella estremità, che porta la stimata *b* (Fig. 122). Molte altre piante hanno lo stilo terminato da un piccolissimo bottone come un Gelsomino (Fig. 118). Gli stili forcuti (Fig. 119) sono spesso volte terminati da alcune stimate poco apparenti, le quali guerniscono i corni dello stilo: sono queste stimate talvolta ornate di frangie; talvolta gli stili forcuti son terminati da grosse stimate, come nel *Ketmia* (Fig. 120).

Tav. IV. fig. 122.

Vi sono dei stili che hanno le stimate pelose: si ponno dar per esempio lo Smilace, il Terebinto, il Lentischio: la *Grewia*, e la *Clethra* hanno la stimata divisa in quattro (Fig. 121). La stimata del Tiglio è pentagona. Gli embrioni del Nocciuolo, della Quercia ec. hanno in cima molti filetti, i quali formano una specie di nappa o fiocco: la stimata della Pervinca ha una forma particolare; ella termina lo stilo a guisa d'una mazza fasciata d'una lamina piatta: nel Lauro-Timo l'embrione porta in cima una specie di ghian-da, la quale forma tre stimate: lo stilo del *Phaseoloides* è ravvolto a spirale.

Fig. 121.

Gli embrioni ancora hanno molte forme particolari: alcuni sono rotondi, altri ovali, altri cilindrici, altri sottili e lunghi, altri son fatti a piramide, altri poi al contrario sono compressi e stacciati: ma siccome le varie lor forme hanno qualche rapporto con quelle dei frutti loro, dei quali ho stabilito di parlare nel seguito dell'Opera, per ora mi ristringo a quelle generalità che ho adesso accennate.

Temo già d'essermi troppo esteso sulle diverse forme dei pistilli, e so-

e sopra quelle delle loro parti; avrei per altro molte altre forme da esporre, quando volessi estendere le mie viste sopra tutte le piante; e quindi, per brevità, pregherò il Lettore, che riscontri le

Tav. IV. fig. 122 Fig. 122 123 124 125 e 128.
123 124 125 e 128.

Qualunque forma abbianfi li stili, chiaramente vedesi in alcuni, che hanno per di dentro una apertura, la quale innoltrasi fino alla base, o fino agli embrioni dei semi. Vedesi (Fig. 127) il taglio dello stilo della Fig. 122 per la linea *d e*; e nella Fig. 129 il taglio d'un' altro stilo vuoto della Fig. 128. In moltissimi pistilli non ho potuto distinguere la detta apertura; ed in quelli ove chiaramente vedesi, potrebbero, per esempio, come nella Fig. 122, che vi fosse un fascetto di vasi, il quale si stendesse cominciando da ogni divisione della stimata *b* fino a ciascheduna celletta dell'embrione, e che ciascuno dei detti fascetti lasciasse tra di loro un vuoto, quantunque fossero tutti rinchiusi dagl' involucri comuni, lo che mostrerebbe uno stilo solo, sebbene in fatti ve ne fossero tre: questa idea combinerebbe a maraviglia con quanto si osserva nel Pomo e nella Pera (Fig. 130): poichè per via della dissezione esaminando uno delli stili dei detti frutti, si scorgerà, che facilmente si divide in due per di sotto, e che ciascheduna porzione, come nelle lettere *g, b*, corrisponde ad un' acino o granello: e quindi potrebbe darfi, che uno stilo unico si dividesse nell' interno dell' embrione, per somministrare delle porzioni di sè stesso ad ogni frutto, o ad ogni celletta.

Quando i frutti sono annodati, si secca la maggior parte delli stili, e delle stimate, come pure gli stami, e sussistono i soli embrioni.

Qui non parlo dell' uso dei pistilli; bisogna per altro, che essi sieno una parte molto essenziale alla formazione dei frutti, poichè appena son danneggiati gli stili, o dal freddo, o dagl' insetti, o da qualunque altra causa, i frutti indispensabilmente periscono, anche allora quando non comparisca, che alcuna di dette cause nocevole sia stata agli embrioni.

Ho una specie particolare di Ciriegio, i di cui fiori sono quasi tutti provvisti di 3, e 4, 5, 6, 7 pistilli; producono un' egual numero di frutti ammassati a guisa di testa nell' estremità d' un' unico gambo: ho un' altra specie di Ciriegio, ogni di cui fiore contiene due pistilli: quasi tutti i suoi frutti son doppi; ma spesso alla detta specie

accade, che i pistilli, invece d'essere organizzati, come ho di sopra spiegato, si slargano, e formano due piccole foglie; i fiori allora rimangono sterili, e non producono frutti. Provano questi fatti di quanta importanza sieno i pistilli per la formazione dei frutti: parlerò in appresso degli usi loro; ma prima voglio dir qualche cosa dei fiori incompleti.

ARTICOLO VII. *Dei fiori incompleti.*

I fiori, di cui ho parlato nei precedenti Articoli, provvisti essendo per la maggior parte delli stami e del pistillo, i quali dai Botanici creduti sono come tante parti necessarie alla fruttificazione, ponno essere considerati come fiori completi.

Ve n'ha di due specie, ch'io chiamo *incomplete*: alcuni rinfermano delli stami ben formati, provvisti di cime o antere, e di polvere, ma sono senza pistillo; e siccome tali fiori non producono frutti, perciò vennero chiamati *fiori sterili* o *fiori falsi*, non solamente dai Giardinieri, ma ancora dai Botanici più celebri, i quali gli hanno chiamati eziandio *fiori da stami*.

L'altra specie di fiori incompleti, quantunque provvisti di pistilli ben condizionati, è mancante di stami: questi sono atti a produrre i frutti: e perciò vengon detti *fiori veri*, o *fiori legati*. Qui non parlasi nè dei calici loro, nè dei lor petali, perchè quando queste parti, che non possono esser considerate come assolutamente necessarie alla formazione dei frutti, si trovano nei fiori incompleti, elleno sono simili a quelle, che trovansi nei fiori completi.

Il Noce, il Nocciuolo, il Carpine, la Quercia, il Faggio, il Pino, l'Abete, l'Ontano, il Cipresso, il *Thuja*, la Betulla, il Tasso, il Moro, il Platano, alcune specie di Ginepro, una specie di Lentisco, tutti questi alberi portano sul medesimo individuo, ma separatamente, dei fiori da stami e dei fiori da pistillo. Lo stesso egli è di molte piante, come le *Cucurbitacee*, il Grano Turco, la Lacrima di Giobbe ec. Alcune specie di Palme, i Salci, i Pioppi, il Lentisco, il Terebinto, l'Albero di Ciro; alcune specie di Ginepri, la Sabina; e tralle Pianta, lo Spinace, la Canapa, l'Ortica ec. hanno dei piedi o fusti, i quali non producono se non fiori da stami, e che non producono mai frutti, ed all'incontro certi altri fusti, i quali altro non hanno che fiori da pistillo, producono il frutto.

Vi

Vi sono ancora certi alberi, i quali sull'istesso pedale producono dei fiori completi, provvisti cioè di stami e di pistilli; e dei fiori incompleti, alcuni dei quali sono con degli stami, ed altri con dei pistilli. Finalmente alcuni fiori, come quelli dell'*Opulus flore globuloso*, sprovvisti sono di stami e di pistilli, ed a ragione chiamar si ponno *fiori falsi*, perchè ad altro non son buoni, che a formare col loro petalo un oggetto grato all'occhio, inabili affatto alla fruttificazione.

Per terminare quanto spetta ai fiori incompleti, riporterò alcune osservazioni da me fatte sopra i fiori da stami, e sopra i fiori da pistillo del Nocciuolo.

Tav. V. fig. 148. La Fig. 148. Tav. V. rappresenta il bottone d'un fiore da stami, tale e quale vedesi in Autunno: verso il fondo vedonsi alcune squame fatte a cucchiaro, ed il resto altro non par che sia, fuorchè una massa erbacea e confusa.

Fig. 149. La Fig. 149 rappresenta lo stesso bottone in quello stato, in cui è nel mese di Gennaro: vedonsi nella sua base le squame del bottone suddetto, il resto incomincia a mostrarsi squamoso; ma le squame son molto diversamente sensibili a primavera, come può vedersi nella

Fig. 134 e 150. Tav. IV. Fig. 134. Vien rappresentata (Fig. 150) una delle dette squame staccata dal filetto, e vista col microscopio dalla parte ester-

Fig. 151. na: ella par coperta di finissima peluria. La Fig. 151 mostra la medesima squama vista dalla faccia interna: è questa parte fornita di

Fig. 152 molti peli, e vi si veggono li stami; uno di questi stami è la Fig. 152;

e 153. e la Fig. 153 dimostra il medesimo stame scoppiato al fuoco d'un microscopio, e dalla di cui cima vedesi uscir molta polvere unita ad un liquore viscoso.

Fig. 154. La Fig. 154 rappresenta il bottone d'uno dei fiori d'onde escono i frutti, il qual bottone è grosso, rotondo, e ricoperto di squame incavate a guisa di cucchiarino.

Fig. 155. La Fig. 155 ell'è una delle squame esterne, bruna al di fuori, e piena di peli al di dentro.

Fig. 156. La Fig. 156 rappresenta una squama interna più grande e meno grossa delle precedenti: ell'è parimente pelosa al di dentro.

Fig. 157. La Fig. 157 ell'è un'altra squama ancora più interna: questa è grossa, e dura a distaccarsi.

Fig. 158. La Fig. 158 fa vedere un corpo, il qual trovasi nel centro del bot-

bottone: egli è il calice del fiore, dalle di cui scanalature escono dei filetti; io non saprei decidere se essi sieno petali o pistilli.

Queste osservazioni dei fiori da pistillo sono state fatte tutte nel mese di Gennajo, e ho creduto bene di riportarle, per dare un'idea della struttura dei fiori incompleti.

In quanto alla distinzione degli alberi, che portano queste diverse specie di fiori, si ponno consultare le Tavole metodiche, che trovansi dopo la Prefazione del *Trattato degli Arborei e degli Arbusci* da me pubblicato nel 1755.

Poco mi rimane a soggiungere a quanto ho detto delli stami; e quindi mi tratterò solamente a parlare del modo con cui i fiori da stami sono aggruppati sopra degli alberi che gli portano.

Il più delle volte un numero di squame simili ad *a*, *b*, *c*, *d*, (Fig. 136) sono tutte attaccate su d'un ramo pieghevole e filamentoso, e queste squame ricuoprono gli stami *e*, radunati, come si vede in *d*. Il Nocciuolo (Fig. 133), la Betula (Fig. 134), il Castagno (Fig. 135) sono di questo genere. Vengono chiamati *Castoni* quei ramicelli sottili carichi di fiori da stami. Fig. 136. Fig. 133. 134. e 135.

Questi Castoni sono alle volte più corti, ed allora non son pendenti, tali appunto son quelli dell' Abeto (Fig. 136), del Larice (Fig. 138). Vedonsi sul Pino molti castoni similissimi a quelli dell' Abeto, e che aggruppati sono all'intorno d'un ramo, il quale seguita a germogliare, ed a fornirli di foglie sopra dei castoni, come in *a* (Fig. 137). Quelli del Ginepro (Fig. 139) sono piccolissimi. Il Terebinto, il Lentisco (Fig. 140) hanno i fiori da stami radunati a mazzetti, a guisa di grappolo. Molti alberi ed arbusci, come l' *Alaterno*, e la *Fagara* portano i loro fiori da stami, solitarij o separati gli uni dagli altri. Tav. V. fig. 137. e 139. Fig. 140.

Anche i fiori da pistillo sono talvolta attaccati ad un ramo filamentoso che gli sostiene, e formano tutti insieme una specie di castone, come nel Carpine (Fig. 141): il qual ramo carico di pistilli si stende in seguito, e forma delle specie di ghirlande (Fig. 142). I fiori da pistillo del Salcio, del Pioppo e della Betula (Fig. 143) formano delle specie di castoni più regolari. Quelli d' Abeto (Fig. 144) non diversificano molto da questa forma; ma sono tenacemente attaccati, e rappresentano un piccolo cono squamoso. I fiori d' Ontano (Fig. 145) sono anch' essi aggruppati di tal

tal maniera , che rappresentano un cono squamoso. I fiori da pistillo del Platano formano colla loro unione delle tondissime pallottole. Nel Noce finalmente (Fig. 146) e nel Castagno (Fig. 147) questi fiori, che hanno delle forme singolari, sono separati gli uni dagli altri, e ciascheduno non contiene ordinariamente altro che due o tre pistilli, ed altrettanti frutti.

Ogni albero adunque nella disposizione dei suoi fiori, tanto da stami che da pistilli, assume delle forme particolari. Il dilungarsi di più sopra d'un tale argomento noiosa opra sarebbe; gl' esempj fin qui riportati bastano per aiutare a discernere a prima vista i fiori incompleti dai fiori completi, e i fiori da stami dai fiori da pistilli.

ARTICOLO VIII. Di alcune parti soprannumerarie che si trovano nell'interno, o nell'esterno d'alcuni fiori.

TROVASI nel fondo di molti fiori un liquore inzuccherato, che le Api con tanta industria raccolgono. Nel fondo di certi fiori vedonsi dei corpi che sembrano glandulosi; ed essendo essi stati riputati sufficienti alla separazione del detto sugo melato, da alcuni Botanici chiamato *Nectar*, furono perciò detti *Nectarium*. Scorgesi, per esempio, nei fiori del Lauro, vicino all'embrione, tre tubercoli colorati, e due piccioli corpi tondi, i quali sono attaccati alla base delli stami. I fiori della Pervinca parimente rinferano due corpi glandulosi.

Queste osservazioni hanno indotto i Botanici a chiamar *Nectarium* tutte le parti ancora dei fiori, le quali non sono, nè il pistillo, nè gli stami, nè i petali. Nel fiore della Passione ell'è una triplice corona di filetti, i quali partono dalla base del pistillo. Vedesi nel fondo del fiore della *Gualteria* dieci corpi appuntati, sostenuti da sottilissimi pediculi. Veggonfi nel fiore dell' *Hamamelis* quattro piccole unghiette: in ogni divisione del petalo del fiore del *Nerion*, vedesi un' appendice frangiata: nel *Periploca* vi sono dei filetti, che partono dalla base del petalo: nell' *Azeradach*, vi è un cornetto.

Oltre a tutte queste parti, che si descrivono col nome generico di *Nectarium*, scorgonsi nel di fuori d'alcuni fiori certe parti, il più delle volte colorate, le quali mancano agli altri fiori. Vi è, per esempio, una specie di Corniolo, il quale chiamasi *Cornus mas*, involucre

ma.

maximo, perchè i bottoni da fiore di quest' albero son contenuti in certe foglie colorate, le quali si rassomigliano a un tulipano: il *Cornus herbacea* ha un *involucrum*, che potrebbe prenderfi per un petalo bianco: La Noce bianca della Verginia ha i suoi bottoni rinchiusi nell' *involucrum*, come quelli del Corniolo: i fiori di molte specie di Titimalo sono accompagnati da due foglie colorate le quali formano un *involucrum*: i fiori finalmente del Carpano sono accompagnati da molte foglie; e quelli del Tiglio partono da una foglia la quale è d'una forma, ed ha una organizzazione singolarissima.

Questi *involucrum* servono probabilmente, o a formare degl' involucri, i quali difendono le giovani produzioni da essi coperte, o a rianimare colla traspirazione il moto del fugo nelle dette parti.

Rispetto al liquore melato di cui ho già parlato, ha creduto il Pontedera (*), che servire ci potesse a intonacare i granelli con una specie di vernice, atta a mantenerli in istato di germogliare, fin tanto che la detta vernice conservavasi senza guastarsi. Ci riuscirebbe difficile di fare l'applicazione di questa idea a tutte le semenze; e si vedono altre cause d'alterazione.

Hanno creduto alcuni Fisici, che gl'insetti invitati dal detto liquore, causassero colla loro puntura la disperfione della polvere dalle cime delli stami. Ne parleremo in appresso.

Quello che sembra più certo si è, che non pare che le piante si risentano punto dei furti che tanti insetti fanno loro; potrebbe anch' essere che il detto miele o nettare altro non sia che un efcremento dei vegetabili.

C A P I T O L O II.

D E I F R U T T I.

I Petali, gli stami, i pistilli, e molte volte i calici si seccano e cadono: gli embrioni sono la sola parte del fiore che rimanga; e quando i frutti hanno legato, come dicono i Giardinieri, vedonsi ingrossarsi gli embrioni, prendere quella forma che aver devono i frutti.

(*) Pontederæ Anthologia, & Dissertationes.

frutti, e giungere a poco a poco allo stato di maturità, il quale è il termine della loro esistenza: passato il qual tempo, alcuni si seccano, altri cascano marci. Ha talmente la natura variata la forma dei frutti, ch' io farò costretto a non presentare qui se non che idee generali, le quali per altro potranno condurci anche più lungi di quello noi ci figuriamo.

Molti alberi ed arbuti producono dei frutti secchi, i quali sotto le squame contengono un certo numero di semi: si chiamano *Coni*, Fig. 159. o Pine nel Pino, nel Larice, nell' Abete (Fig. 159): potrebbero dar Fig. 160. questo nome ancora ai frutti dell' Ontano e della Betula (Fig. 160). Fig. 161. Siccome i frutti del Cipresso son rotondi, chiamansi Noci (Fig. 161). I frutti del Lauro-Tulipano son formati di capsule, talmente ferrate, che imitano perfettamente la forma d'un cono: i frutti della Liquidambra sono sferici, ed i semi stanno entro degli alveoli: i semi del Tulipano sono nudi; ma stanno talmente accomodati attorno ad uno spuntone comune, che molto si assomigliano ad un Fig. 162. cono squamoso. Il Platano ed il *Cephalanthus* (Fig. 162) hanno anch' essi le lor semenze nude, ma colla loro unione formano delle regolari pallottole. In tutti questi frutti lo spuntone di mezzo, le squame, gli alveoli, o le foglioline che trovansi tra i semi, essendo necessariamente obbligate a trasmettere loro l'alimento, e forse ancora a dare a questo sugo alcune preparazioni; si ponno riguardar tutte queste parti come una *Placenta* comune a tutti i semi.

Certi altri alberi ed arbuti portano dei frutti più o meno carnosì, i quali contengono dei semi, ricoperti da un involuppo coriaceo: chiamansi acini o granelli. Le Pere, i Pomi, i Cotogni Tav. VI. fig. 163. (Fig. 163 e 164 Tav. VI) hanno gli acini *a* (Fig. 164) rin- Fig. 164. chiusi nel centro di una gran grossezza di carne succulenta: gli acini del Castagno, del Faggio, del *Pavia*, del Marrone d' India (Fig. Fig. 165. 165) sono ricoperti d'un involuppo carnosò poco succulento, e quasi secco, che chiamasi *Guscio*. L' involuppo del granello delle Querce Fig. 168. e dei Lecci (Fig. 168) è ancor egli un guscio, ma forma solamente una coppa o scodellino *a*, dentro a cui sta incaffato il granello, come una pietra sta dentro il castone.

Per dar fine a quanto spetta ai frutti da granelli, ve n' ha alcuni Fig. 169. ni, come il Fico, la Mela granata, e la Granatiglia (Fig. 169), i Fig. 170. quali hanno i granelli rinchiusi entro una carne (Fig. 170) più o me-

meno succulenta. La qual carne, come ancora il guscio dei frutti, di cui ho parlato, sono l'aggregato d'un gran numero d'organî. Averò l'incontro di fare osservare in essi dei grossi tronchi di vasi, un'immensa quantità d'altri vasi sottilissimi, delle glandule, delle membrane, ec.

Molti alberi ed arbuti hanno le mandorle contenute entro una scatola legnosa: questi chiamansi *frutti da noccioli*. Il Pesco, l'Albicocco, il Prugno, ed il Ciriogio (Fig. 171) portano dei frutti *a*, il Tav. VI. fig. 171. di cui nocciolo (Fig. 172) è ricoperto d'una carne succulenta. L' Fig. 172. Olivo, l'*Elaeagnus*, il Giuggiolo, il Corniolo, il Loto, il Lauro, ed il *Lauro-Ciriogio* (Fig. 173) hanno il nocciolo anch'essi involto Fig. 173. entro una carne succulenta; ma il nocciolo *a* (Fig. 174) contiene, Fig. 174. o contener deve, due mandorle: i noccioli dei Noci e dei Mandorli (Fig. 175) son coperti dal guscio; e quello della Nocciola (Fig. 176) Fig. 175 e 176. è solamente incassato nel guscio.

Producono molti alberi ed arbuti dei piccoli frutti carnosî, succulenti o non succulenti, che chiamansi *bacche* o *coccole*. Quelle del *Chionanthus*, dello Scotano, o Cotino, dell'*Oxyacantha*, del *Menispermum*, dell'Oppio, del *Phyllinea*, del *Rhamnoides*, del *Syderoxylon*, del *Daphne*, del Timo, del Viburno, del Visco quercino, e del *Thymelæa* (Fig. 177) sono succulenti, e rinchiudono un solo seme Fig. 177. (Fig. 178). Nel Tasso il nocciolo non è tutto ricoperto di carne: Fig. 178. la bacca dell'*Azedarach* (Fig. 179), la quale è succulenta, rinchiude un nocciolo, e cinque mandorle (Fig. 180 181). Le bacche del Fig. 180 e 181. *Dica*, della *Gale*, del *Molle*, del *Somacco*, del *Toxicodendron*, della *Passerina*, del Lentisco, e del Terebinto (Fig. 182) sono poco car- Fig. 182. nose, e rinchiudono un seme solamente (Fig. 183 184). Fig. 183 e 184.

Certi altri alberi o arbuti fanno le coccole succulenti o non succulenti, le quali rinferano due semi: tali appunto sono le bacche del Caprifoglio, del *Periclymenum*, dell'Alifo, del Gelsomino, dello *Smilacè*, dello *Storace*, del *Xylosteon*, dello Sparagio, dell'*Ephedra* (Fig. 185), dell'Uva crespina (Fig. 186), e della Bordana (Fig. 187). Fig. 185 186 187. Tre semi trovansi nelle bacche del Sambuco, del Gasso piccolo, del Ginepro, della Sabina, del Cedro, del *Ramno* del Cedro (Fig. 188) Fig. 188. e dell'Alaterno (Fig. 189), nella quale non sono rappresentati se Fig. 189. non se i noccioli.

Quattro semi vi sono nelle bacche della *Burcardia*, del Ligustro,

PARTE I. O del

Tav. VII.

Fig. 190 e 191. del *Vitex*, del Tasso (Fig. 190 191): cinque ordinariamente se ne trovano nelle Uve, nelle bacche dell'*Uva-Ursi*, del Mirtillo; di mol-
 Fig. 192 e 193. te specie di Nespole, ed in quelle dell'Ellera (Fig. 192 193). Se ne vede finalmente una maggior quantità nelle bacche della *Bella-donna*, del *Jasminoides*, del Mirto, del *Solanum*, della *Vitis-Idaea*, del-
 Fig. 194 e 195. la Rosa, del *Busneria*, dell'Arbuto (Fig. 194 195) del *Guajacana*
 Fig. 196 197 198 (Fig. 196) del Ribes (Fig. 197 198) e del Capperò (Fig. 199 199 e 200. e 200). Esaminando attentamente tutte queste bacche, vedrassi ch'elleno formano delle diverse *placente*, le quali somministrano l'alimento ai semi.

Sono talvolta queste ultime parti contenute entro una specie di scatole, le quali si seccano giunte che sieno alla loro maturità: ven-
 Fig. 201. gono chiamate *Capsule*. I frutti Capsulari del Carpine (Fig. 201) hanno una sola cavità, ed hanno un solo seme. L'olmo, il *Ptelea*,
 Fig. 202. il *Polygonum*, l'*Atriplex* (Fig. 202) hanno uno o due semi rinchiusi entro una cavità formata di due membrane sottili. Le capsule dell'*Itea* hanno una sola cavità, ma contiene molti semi.
 Fig. 203 e 204. La *Fagara* (Fig. 203) e l'Acero (Fig. 204) hanno i frutti composti di due capsule, ognuna delle quali ha una cavità, in cui rinchiudesi un seme. Il Salcio, il Pioppo, il Tamarisco hanno anch'eglino due capsule, ciascuna delle quali ha una cavità, ma conten-
 Fig. 205. nente più semi. L'*Hamamelis* ed il Lilac (Fig. 205.) hanno due capsule che anno ciascheduna due cavità, ciascuna delle quali con-
 Fig. 206. tiene un seme. Il *Palurus*, il *Ceanothus*, ed il *Chamaelæa* (Fig. 206) hanno tre cavità, ciascuna delle quali contiene un seme. Il *Clethra*, l'*Evonymoides*, il Titimale, l'*Yucca*, l'*Androsæmum*, e l'*Hypericum*
 Fig. 207. (Fig. 207) hanno anch'eglino i frutti composti di tre cavità, i quali contengono molti semi: la *Stewartia*, la *Grewia*, e l'*Evonymus*
 Fig. 208. (Fig. 208) hanno il frutto composto di quattro o cinque cavità, in ciascheduna delle quali sta un seme: la capsula del Tiglio ha parimente cinque cavità, e dovrebbe aver cinque semi; ma tra questi un solo ordinariamente viene avanti: la Ruta, la *Syringa*, la *Erica*,
 Fig. 209. e la *Diervilla* (Fig. 209) hanno egualmente quattro o cinque cavità, le quali per altro contengono molti semi: i frutti dell'*Ascyrum*, dell'*Azalea*, della *Gualteria*, del *Kalmia*, della *Spiræa*, della *Ketmia*
 Fig. 210 e 211. (Fig. 210), e del *Chamaerhododendros* (Fig. 211) sono anch'essi capsule da cinque cellette, nelle quali per altro vedonsi molti semi: le capsule

capsule finalmente, le quali formano i frutti dei *Cisti* (Fig. 212) Tav. VII. fig. 212. hanno un numero indeterminato di celle, le quali contengono molti semi.

Senza volere entrare in un troppo vasto dettaglio anatomico delle dette capsule, osserverò solamente, che fino alla perfetta formazione dei semi loro, elleno son succulenti molto, e composte di un gran numero di vasi, i principali dei quali formano delle coste o spine, a cui stanno attaccati i semi per via d'un vaso, che loro porge il nutrimento: di più, la maggior parte delle dette capsule, che trovansi vuote dopo il loro disseccamento, erano nel tempo della loro verdura ripiene d'una polpa succulenta, la quale deve essere certamente utilissima ai semi. Per ora m'appiglierò solamente a queste idee generali; e sebbene io non intenda di continuare esattamente l'anatomia di tutti i frutti, mi si presenterà in avvenire l'incontro di entrare in un più vasto dettaglio rapporto a questo argomento.

I frutti che succedono ai fiori leguminosi sono tante capsule biflunghe, alle quali dato fu il nome di silique, o baccelli, quando abbiano una certa estensione; e chiamansi *Silicule*, quando sien piccole. Farò osservare le principali differenze, che passano tra quelle che producono i diversi alberi o arbusti. I frutti dello *Spartium*, dell' *Amorpha* (Fig. 213), e del *Barba-Jovis* (Fig. 214) non sono Fig. 213 e 214. che silicule senza tramezzi o cellette, e contengono un solo seme. Le silicule del *Tragacantha*, del *Genista-Spartium*, e dell' *Anonis* (Fig. 215) sono anch'esse molto piccole: ma più semi contengono: Fig. 215. altre lunghe e senza tramezzi, sono compresse tra seme e seme, come nella *Coronilla* (Fig. 216) quelle della *Pervinca*, dell' *Anagallis*, Fig. 216. del *Silicastrum*, della *Gleditsia*, della *Falsa-Acacia*, del *Cytiso-Genista*, del *Citiso* (Fig. 217) e della *Ginestra* (Fig. 218) sono molto Fig. 217 e 218. grandi, senza tramezzi, e non hanno niente di polpa. Le silique della *Caroba*, del *Bonduc*, e dell' *Acacia* o *Gaggia* (Fig. 219) non Fig. 219. son divise da tramezzi; ma sono i semi per ogni parte circondati da una polpa.

Molte piante hanno i baccelli divisi in due da un tramezzo che si estende per tutta la loro lunghezza: osservasi questo tramezzo nelle silique del *Phaseoloides* e nei frutti della *Bignonia*: i frutti del *Nerion*, della *Periploca* si accostano alla forma delle silique, senza per altro averne il carattere: l' *Anona* produce dei frutti carnosì, in cui

trovanfi dei semi molto grossi, accomodati come nelle filique: lo *Staphylodendron* e la *Colutea* fanno delle vesciche membranose, ripiene d'aria, e nelle quali vedonsi i semi attaccati ad un principale nervetto il quale estendesi per tutta la lunghezza delle dette vesciche. Siccome le filique son tante vere capsule, si può applicare ad esse quanto già detto abbiamo delle capsule ordinarie; faremo solamente osservare, che un lato della filiqua è sempre fornito per tutta la sua lunghezza di grossi vasi, i quali arrecano alimento ai semi in quella attaccati, ognuno in particolare, mediante un vaso che è loro proprio.

I semi d'ogni pianta ad ombrella, come appunto il *Bupleurum* (Fig. 220), sono nudi; e quindi d'uopo è che necessariamente attraggano il nutrimento dal filetto che gli sostiene. Può dirsi lo stesso

Fig. 221. della *Clematite* (Fig. 221) i di cui semi non hanno involuppo alcuno, ed ancora del *Chenopodium*, il di cui unico seme è ricoperto dal calice, senza per altro avere aderenza alcuna con quello: lo stesso egli è parimente di tutti i fiori labiati, i quali hanno quattro semi ricoperti dal calice; cioè l'Isopo, la Lavanda, lo *Stachas*, il *Philomis*, il Rosmarino, la Salvia, il Timo, il *Chamadris*, il *Teucrium*

Fig. 222. (Fig. 222). La *Coriaria* ha ancor essa cinque semi rinchiusi nel calice. Bisogna credere, che i semi di tutte queste piante attraggano il nutrimento loro dalla parte che è aderente al calice, e lo stesso può dirsi dei semi dei fiori a fiorellini, a semifiorellini, o dei fiori radiati che ammassati sono in un calice comune; tali sono l'Abrotano, l'Assenzio, la Santolina, il *Baccharis*, l'*Othanna*, la *Globularia* e la *Pentaptilloides*.

Le infinite diversità che si vedono nella forma dei frutti, dei quali ho voluto dare solamente una semplice idea, sono state utilmente adoperate dai Botanici Metodici per fissarne i caratteri. Penetriamo adesso nell'interno dei frutti, e dicasi qualche cosa della loro organizzazione.

ARTICOLO I. Ricapitolazione Sommaria dei cambiamenti, che succedono ai fiori del Pero e del Mandorlo, da quando si incominciano a vedere nei bottoni, o gemme fino a che le frusta sono allegate.

ALLOR che fatto abbiamo l'efame dei bottoni, si è detto, che le parti dei fiori formansi nell'interpo dei bottoni nell'Autunno e nell'

nell'Inverno. Siccome gli embrioni fanno una parte dei pistilli, e che i pistilli fanno parte dei fiori, può dirsi che gli embrioni, ovvero, lo che è lo stesso, che le novelle frutta cominciano a formarsi nei bottoni, come fanno le altre parti dei fiori: abbiamo detto eziandio, che prima che aperti sieno i bottoni, vedonsi i granelli delle pere, i noccioli delle Mandorle, ec. Ma tutti questi organi divengono molto più sensibili allorchè aperti sono i bottoni. I gambi che sostengono i fiori, notabilmente si slungano; i bottoni dei fiori s'ingrossano, allontanano le squame che formano i bottoni degli alberi; i petali si manifestano fralle intagliature del calice; in breve tempo questi petali, che stavano piegati entro i bottoni, si distendono. Ho detto di sopra, che i Petali del fior del Pero attaccati sono all'angolo, che va in dentro, formato dalle intagliature del calice, e che essendo disposti in giro, rassomigliano, allora che è aperto il fiore, a delle piccole rose.

Allora gli stami si raddrizzano, e mostrano le cime ben formate. Da lì a poco, le capsule delle cime si aprono; e le polveri in quelle contenute da ogni banda si spandono. In proposito di questi stami devo far osservare, che quelli del Pesco (*Tav. IX. Fig. 247*) prendono l'origine da una granellosa sostanza *d*, che riveste le interne pareti del calice; e che quelli del Pero (*Tav. III. Fig. 115*), i quali partonsi dal fondo del fiore, essendo ordinariamente quattro trall'attaccatura di ciaschedun petalo, sono piantati sopra d'una sostanza particolare, la quale sembra granellosa, in qualche modo glandulosa, e posta nell'occhio della pera tralle intagliature del calice. Questa sostanza granellosa appoco appoco si affoda, e forma quel mucchio di pietre, il quale trovasi verso la testa di quasi tutte le pere: ne discorrerò in appresso. Pare che i pistilli, che occupano il centro del fiore escano da un canale a cui non sono in verun modo attaccati. Dopo brevissimo tempo cadono i petali, gli stami si seccano, e perdono le cime loro; gli stili non stanno guari anch'essi a perdere la loro verdura.

Nella Mandorla s'ingrossa l'embrione e distacca il calice il quale cade: nella pera il calice sussiste; le sue intagliature si disseccano in parte; ma vi si forma per di sotto una gonfiezza, ed allora è che diceasi che le pera sono allegate, ed a poco a poco queste frutta alla loro grossezza giungono. Ma per poter meglio conoscere la loro

organizzazione interna, aprir bisogna queste frutta in ogni età diversa, da che sono allegate fino alla loro maturità, come appunto ho fatto con ogni possibile attenzione. Ecco le mie osservazioni, e principierò dalla Pera.

ARTICOLO II. *Esame anatomico della Pera.*

Tav. VIII. 6g. 233. La Pera (Fig. 233) è un frutto carnosò, più sottile ordinariamente dalla parte del gambo *b*, che verso l'altra estremità *a*, la quale è fornita d'un ombelico formato dalle intagliature del calice: trovansi nell'interno del detto frutto cinque cellulette, ciascuna delle quali contiene due granelli o semi (Fig. 237) ricoperti d'una pelle coriacea: e quindi si ponno distinguere in questa pera la sua testa, o ombellico *a*, il suo gambo o coda *b*, finalmente i corpi *c c*; ma quando si vuole esaminare gli organi per via della dissezione, devesi separatamente considerare, 1.º li tegumenti: 2.º li vasi principali: 3.º la sostanza carnosà.

Esaminando attentamente le pere marcie, allora specialmente, che state sono per qualche tempo nell'acqua, vedesi facilmente, che ciò che si leva con il coltello, quando si monda una pera, può dividersi in quattro distinte sostanze; cioè, 1.º l'epidermide: 2.º il corpo mucoso: 3.º la tessitura pietrosa o glandulosa: 4.º un'intrecciatura di vasi ch'io chiamo la *Pelle*; poichè per distinguere queste sostanze, ho creduto bene di servirmi degl'istessi termini di cui servono gli Anatomici riguardo agli animali; perchè avvi realmente qualche somiglianza tralle parti corrispondenti del regno animale, e quelle del regno vegetabile.

La prima che si leva è l'epidermide; ell'è molto simile a quella che ricuopre i rami giovani e le foglie: ed avendone già parlato in un' Articolo a parte, a quello potrà rivolgersi il Leggitore. Quando si arriva a levare un pezzetto della sola epidermide, vedesi prima di tutto una sottilissima e delicata membrana, la quale resta attaccata alla tessitura pietrosa, che ella immediatamente ricuopre, e per tutta la estensione della pera: toccando leggermente col dito la detta membrana, si sente una certa untuosità, ed una viscosità, che ci fa chiamarla *Corpo Mucoso*; nome che pure le conviene per il posto che ella occupa tra l'epidermide e quell'intrecciamento di vasi, da me chiamato la *Pelle*.

To-

Togliendo l'epidermide, il corpo mucoso vi rimane alle volte attaccato, e le pietre restano nude, oppure questo corpo lascia l'epidermide, e rimane attaccato alle pietre da lui coperte. Questo fatto prova l'esistenza del corpo mucoso e il suo carattere di membrana. Un pezzetto del detto corpo mucoso presentato alla luce del microscopio, m'ha parso trasparente, e vi ho veduti alcuni punti più trasparenti del resto. Lo stesso osservasi nell'epidermide; ciò non ostante io credo, che ella si potrebbe paragonare all'inviluppo cellulare di cui ho già parlato nel primo Libro; e quantunque non abbia io fissato niente di certo intorno alla natura di questa membrana mucosa, io credo che ella sia formata da un'intrecciamento di minutissimi vasi, inzuppati d'un umor mucillaginoso, il quale comunica loro il suo carattere. Per quanto spetta al di lei ufficio; il modo, con cui ella abbraccia le pietre o le glandule, indica ch'ella possa agir d'accordo con quegli organi, per produrre qualche effetto relativo all'economia vegetabile: per esempio, alla traspirazione dei frutti, alla rigenerazione dell'epidermide, ec. Molti insetti si pascono di questo corpo mucoso; ed allora veggonsi le pietre scoperte, secche, ed annerite formar sul frutto una superficie fagrinata. Egli è anche talvolta ammaccato dalla grandine, o bruciato dal Sole; lo che altera il suo colore.

Dopo che tolti sono i due suddetti inviluppi, trovasi una gran quantità di piccioli corpi solidi, disposti per tutta la superficie delle pere, come può vederfi nella Fig. 224. la qual disposizione m'induce a dire, che questi piccioli corpi formano un'inviluppo generale, ch'io chiamo l'*inviluppo pietroso*, perchè ci è l'uso di considerarli come vere pietre. Non suggirano già queste sostanze dal sagacissimo occhio del Malpighi e del Grewio. Il Ruischio gli chiamò *Corpi aciniformi*. Trovanfi ancora delle pietre simili in altre parti, oltrechè nel corpo mucoso: m'ingegnerò di dare un'idea della loro continuazione, cioè, della situazione che elleno hanno le une rispetto all'altre. Queste pietre, che sparse sono per tutta la sostanza della pera, non vi son già poste a caso: elleno stanno ammucciate vicine all'ombelico, ove formano una specie di rocca *b* (Fig. 224): sono disposte regolarmente sotto il corpo mucoso, vicine le une all'altre *a a*. Ell'è, com'io l'ho già detto, questa disposizione, che m'induce a chiamare una tale unione di pietre la *teffitura*, o l'*in-*

Tav.VIII.fig.224.

viluppo pietrofo: lungo l'asse del frutto, suorchè verso il centro, colla loro disposizione esse formano una specie di canale ch'io chiamerò il *canal pietrofo* (*c*). Non v'è altro luogo nella parte carnosà delle pera, ove le pietre sieno tanto grosse quanto intorno ai granelli o semi: esse ivi sono un poco distanti tra di loro, ed unite da una sostanza, la quale distingue dal resto della carne della pera cogli occhi, e specialmente col gusto; ma ella è molto simile a quella che unisce le pietre della tessitura pietrofa. Siccome queste pietre circondano i granelli, le considererò tutte insieme, come formanti una capsula, o scatola pietrofa *d*, la quale equivale al legno dei noccioli. Bisogna dunque sapere, che la rocca *b* scemando in grossezza, forma il canal pietrofo *c*, il quale slargandosi fa una specie d'inviluppo ai granelli *d*: io la chiamerò la capsula pietrofa. Queste pietre si accostan per di sotto ai granelli, e formano una guaina *e*, per cui passano i vasi del gambo; e perciò la chiamerò la *guaina pietrofa*.

Vedesi ora la continuazione che vi è trall'inviluppo pietrofo vicino all'ombelico, la rocca, il canal pietrofo, la capsula pietrofa, la guaina pietrofa, che va ad unirsi all'inviluppo pietrofo, vicino alla coda o gambo. Se intanto comprendesi, che dalla capsula pietrofa *d* fino all'inviluppo pietrofo *a*, quà e là si trovino delle pietre sparse nella sostanza della pera, le quali diminuiscono in quantità ed in grossezza cominciando dal centro *d* fino alla circonferenza *a*, verressi ad avere un'idea abbastanza chiara della disposizione delle pietre nel frutto di cui si tratta, allorchè egli è giunto alla sua grossezza.

Ho detto che il canal pietrofo va a terminare all'ombelico; come pure in questo luogo viene a terminare l'inviluppo pietrofo, e la riunione d'ambidue viene a formare ciò che nominato abbiamo la *rocca* (*Fig. 226*). Questa rocca ha la figura d'un cono a rovescio, di modo che la base corrisponde all'ombelico, e la punta che è tronca riguarda i granelli: ella da principio pare che sia solamente composta d'un'ammasso di pietre saldate irregolarmente insieme; ciò non ostante ella divide in chiarissimo modo in due parti. L'inter-
terna (*Fig. 228*) ha anch'essa la figura d'un cono tronco, ed è la
 continuazione del canale pietrofo (*Fig. 230*) il quale slargandosi nella sua estremità a guisa d'una tromba, forma nella situazione dell'ombelico la base del cono. In quanto poi alla parte esterna della

roc-

Tav.VIII.fig.226.

Fig. 228.

Fig. 230.

rocca (*Fig. 226*), ell'è un prolungamento dell'involuppo pietroso, *Tav. VIII. fig. 226.* il quale, accompagnando il canal pietroso, comunica colla capsula pietrosa (*Fig. 225*): la *Fig. 229 b* è la *Fig. 228 a* tagliata in *Fig. 225 229 228.* due, per far vedere, che quel canale è vuoto; lo che vedesi ezian-
dio dalli filetti che attraversano le *Fig. 226, 228, 230.*

Dopo avere acquistata un'idea della situazione delle pietre nelle pere, d'uopo è di esaminarle in particolare per conoscere la loro organizzazione. Il quale esame ci farà forse strada a scuoprirne gli usi loro.

Secondo le mie osservazioni sarebbe inutile di cercare delle pietre nei frutti allegati di poco. Questa parte del frutto, che deve indurirsi, in quei primi tempi null'altro parvemi, che una massa bianca, compatta per verità, ma senza quella durezza che acquistar dovrà in appresso. Pare che questa sostanza si divida in tanti granelli bianchi, per anche pochissimo solidi, e che formano quasi tutta l'interna sostanza del frutto. Finalmente questi grani s'ingrossano ed a poco a poco s'induriscono; di maniera che i frutti, per anche piccolissimi, sono tutti ripieni di queste pietre, le quali per altro non sono ancora tanto dure come lo sono nei frutti già maturi, ed esse conservano una lieve trasparenza, la quale lascia vedere alcuni vasi, che vanno a ramificare nella loro sostanza. A misura che le pere alla maturità s'avvicinano, spariscono le pietre, e pare che la maggior parte sia affatto distrutta: vedremo per altro in appresso che esse non diminuiscono nè in numero, nè in grossezza, e che anzi diventano più dure e più opache, e specialmente quelle della capsula pietrosa.

Avendo prima del perfetto loro indurimento esaminato col microscopio molte di queste pietre, non mi è sembrato vederle formate a strati, o dall'unione di molte laminette pietrose, ma solamente dall'unione di molti granelli, o pure dalla riunione di molte piccolissime pietre, le quali comunicano tra di loro per mezzo di certi vasi, molti dei quali pare che acquistata abbiano anch'essi la consistenza delle pietre. Gettando queste pietre nel fuoco si bruciano, e mandano un'odore di pane bruciato: quelle non molto indurite si ponno sciogliere per mezzo d'una gagliarda bollitura.

Per osservare la connessione dei vasi colle pietre, si espongono al microscopio delle grosse pietre galleggianti in una catinella fatta di
cri-

cristallo foderata di cera, e piena d'acqua. In tal maniera, e scegliendo per le mie osservazioni delle pietre ch'io aveva tenute lungamente in macerazione, ho scoperto un'infinito numero di fibre *a* Tav. VIII. fig. 227. (*Fig 227*) disposte a guisa di chioma intorno ad ogni pietra. Facevano talvolta capo in quelle alcuni vasi più grossi *b*, o andavano a perdersi, per dir così, in un'altra pietra; talvolta essi ne uscivano, o senza dividerli, e quasi nella medesima grossezza con cui erano entrati, o dopo essersi divisi in tre o quattro rami. La *Fig. 231* la quale rappresenta una fettina di pera esposta al microscopio, serve per dare un'idea della positura dei vasi capillari, e dei vasi grossi, i quali formano la carne delle pere. Queste osservazioni non ponno farsi sopra dei frutti giovani, perchè allora le pietre sono troppo tra di loro vicine; ma a misura che le pere maturansi, i vasi si riempiono d'umore, si fanno men c, si slungano, s'inteneriscono e s'imbianchiscono: le pietre al contrario induriscono, vengono rosse, ed opache; e queste diverse parti si distinguono più facilmente tra di loro.

Nè credasi già, che quanto dissi intorno a queste pietre, trovasi soltanto in alcune specie di pere, in cui elleno sono ordinariamente più grosse e più dure che nell'altre specie, la di cui carne è delicata e tendente al liquido. Ed infatti sebbene le dette pietre sieno men grosse e dure nella Pera Maddalena d'estate, nella Vergolosa, e nella Burrone, che nella Pera San Germana, nella Pera Bergamotta, nella *Cresana*, nella Messire-Jean, io le ho vedute sempre chiaramente tanto nell'une che nell'altre. Consiglio per altro tutti quelli, che far volessero delle osservazioni sopra di ciò, di scegliere quelle specie ove più sensibili sono le dette pietre, per esempio la San Germana.

Ho già premesso ch'io non chiamo *pietre* quei piccoli corpi duri, i quali si trovano nei frutti, se non per uniformarmi all'uso generalmente ricevuto. Non bisogna confonderle colle pietre minerali e fossili, e neppure con le concrezioni pietrose che trovansi nei reni, nella vescica, nella vescichetta del fiele, ec. degli animali.

Le pietre minerali non sono corpi organizzati, non ricevono il nutrimento per la via di nessun vaso che lor sia proprio. Un sugo pietrificante, della natura forse delle pietre trasparenti del cristallo di rocca, della Selenite, o della Stelactite, penetra nelle terre argillose, bolari, ed altre, nel legno, nelle conchiglie; e questi corpi di-

ven-

ventano pietre, per dir così, per impregnazione. Quegli sughi pietrificanti menano con loro diverse sostanze, di cui ricuoprono le già formate pietre, e queste pietre s'ingrossano per incrostazione. Ecco in pieno l'istoria delle pietre soffili.

Certe materie viscose capaci d'indurimento, ricuoprono d'una specie di sedimento alcune sostanze già dure, le quali trovansi nei reni e nella vescica: vi si formano delli strati di questo sedimento indurito, i quali crescono in proporzione del numero delli strati. Ecco a un dipresso come si formano le pietre delli reni, della vescica, ec. le quali per altro differiscono molto dalle pietre minerali e calcari, perchè bruciano e si risolvono quasi tutte in olio empireumatico, in sal volatile, e carbone.

Per poco che si rifletta alle già dette osservazioni intorno alle pietre dei vegetabili, si vedrà facilmente ch'elleno non s'ingrossano per incrostazione, ma per mezzo di certi sughi, che in quelle conduce l'infinito numero dei vasi che in quelle fan capo, tanto più, che costantemente osservasi, che un vaso grosso va sempre a far capo in una grossa pietra: non ho mai potuto distinguere le laminette che le compongono: ma ho distinto una aggregazione sensibile di molti granelli o di piccole pietre: mi sembra in somma probabile, che queste pietre vegetabili risultino dall'indurimento d'un corpo organizzato.

Mi rimane ancora da rispondere a due questioni, ambedue ugualmente curiose e difficili. In qual maniera son' elleno state formate queste pietre? E per qual fine mai lo son' elleno state? Abbiamo osservato, che appena che allegate sono le pere, non hanno pietre; che da lì a poco ne sono ripiene; e che finalmente giunte alla loro grossezza ed alla maturità loro, pare che queste pietre spariscano. Queste circostanze rendono difficile la prima questione: poichè, infatti d'onde mai ne vengono le dette pietre allorchè a comparire cominciano? e cosa mai diventano allorchè pare che diminuito siane il numero? E poi, in quanto all'uso loro relativo all'economia vegetabile, un corpo che cangia così visibilmente di consistenza e di natura, deve egli produrre i medesimi effetti?

Per vedere in qualche guisa di dir qualche cosa sopra tuttadue le dette questioni, io comincio dall'esaminare le pietre fino dalla loro origine, ed allora che esse non hanno per anche acquistata quella soli-

solidità che le rende sensibili e facili ad esser vedute, allora quando non si ponno distinguere ancora, se non perchè sono d'una sostanza compatta e d'una stretta tessitura e fissa; in quella guisa insomma con cui compariscono nei frutti appena allegati. Io allora le considero come tanti gomitolì di vasi, o come glandule: pare che la disposizione e la tessitura loro sieno dei caratteri distinti, così pure la loro situazione, rapporto agli altri vasi. Ma più, i diversi umori, che servir debbono alla formazione del seme, pare che esigano degli organi atti alla loro preparazione, e ciò suol'essere generalmente riferbato alle glandule: Soggiungerò in oltre, se pure è lecito di servirsi dell' Anatomia comparata, che la viscera, ove i feti degli animali prendono l' aumento loro, è tutta seminata di glandule.

Egli è dunque probabile, che questa granellosa sostanza la quale forma la massima porzione dei frutti novellamente allegati, sia glandulosa e formata di minutissimi vasi, nei quali devono i fughi ricevere delle preparazioni necessarie alla formazione dei semi, i quali fanno allora i maggiori progressi; poichè questa è quella parte dei frutti che è la prima a formarfi: la carne d'una pera la quale diventa deve molto grossa, non è ancora niente, quando i semi o granelli son quasi giunti alla di loro grossezza.

Sono questi fughi forse viscosi e tartarosi, ed i vasi nei quali devono essi passare, ponno essere d'una finezza tale, e talmente ripiegati, che un sedimento analogo al tartaro, coll' attaccarsi a poco a poco alle pareti interne di questi piccoli vasi, ne diminuisca il diametro, e cominci a produrre quella solidità che si vede nei novelli frutti, allorchè diciamo che sono tutti ripieni di pietre: in allora quegli umori, i quali non ponno filtrarsi in tanta abbondanza come avanti l' indurimento delle glandule, rifluiscono in qualche maniera su di loro stessi; dilatano i vasi i quali sono tra i gomitolì glandulosi, e si formano delle nuove strade per dei vasi laterali che essi distendono, col dar loro maggior volume in lunghezza e in diametro; lo che fa, che questi piccioli corpi duri si discostino tra di loro, che si frapponga tra di loro una sostanza succulenta, e che la carne della pera faccia quindi dei progressi. A misura che i frutti s'ingrossano, queste pietre che tra di loro discostansi, diventano meno sensibili, quantunque sieno all' istessa quantità, e durezza come lo erano avanti.

Le pietre dei frutti non acquistano tutte una durezza uguale, nè un'uguale grossezza: in alcune specie di pere elleno sono, e molto più grosse, e molto più dure che in certe altre. Nel medesimo frutto si può vedere una tal differenza: anzi tanto nell'uno che nell'altro caso vi sono delle pietre, le quali conservano la loro morbidezza fino alla maturità dei frutti: oltre di ciò il medesimo frutto, per esempio una pera San Germana, diventa sempre più pietrosa sopra d'un'albero piantato in un terreno magro ed asciutto, che in un'altro, che molto grasso ed umido sia; ma egli è vero altresì, che in questa posizione hanno i frutti meno di sapore, lo che par che confermi, che l'indurimento delle pietre nasce da un fugo concreto, il quale deve tanto più tendere all'indurimento, quanto più sarà concentrato.

Le pere d'estate sono meno pietrose di quelle d'inverno, perchè certamente i sughi sono in quelle in un moto troppo gagliardo perchè lascino i sughi in stato di potersi fissare. Le percosse della grandine fanno sulle pere delle macchie negre, sotto delle quali ordinariamente trovanfi delle grosse pietre; perchè essendo una volta incominciata l'ostruzione, il tartaro più facilmente vi si ferma.

Ho considerate queste pere in due stati, cioè, quando sono pur anche tenere; ed in questo stato vi è luogo da credere, che elle facciano l'ufficio di glandule: l'altro stato si è quando cominciano a indurirsi; e ho detto che allora egli è probabile, che esse producano un riflusso che molto serve ad aumentare il volume dei frutti. Averò l'incontro, allorchè parlerò dell'uso dei vasi, di confermare quanto ho detto intorno alle pietre considerate nell'uno stato e nell'altro, ma si ponno ancora ravvivare in un terzo stato, cioè allora quando esse son dure. Non credo che sieno allora del tutto inutili ai frutti; e mi pare, che dopo che hanno esse fatto l'ufficio di glandule nei frutti novelli, esse diventino, coll'indurirsi, tanti piccoli ossolini, e che somministrino allora dei punti d'appoggio alle fibre, le quali senza di queste non avrebbero avuto sostegno alcuno a causa della loro lunghezza. Ed è forse questa la ragione, che la carne delle pesche e delle albicocche non ha tanta resistenza quanto quella delle pere, anche morbidissime; e queste pure, la di cui carne talvolta è tenerissima, non hanno le pietre nè tanto grosse, nè tanto dure quanto le pere che si rompono. Ecco un'altra osservazione che

me-

merita qualche riflesso; ed è, che nel tempo in cui l'albero è occupato nella formazione del granello e del seme, da lì a poco che allegati sono i frutti, sono i detti frutti quasi del tutto ripieni di glandule tenere, le quali a poco a poco indurendosi, non acquistano la perfetta durezza se non quando il granello è giunto alla sua naturale grossezza: ed è allora, che il sugo nutritivo è impiegato nella formazione della carne, e che i frutti notabilmente s'ingrossano. Non intendo già di dire che gli umori più non passino nelle pietre, qualora sieno esse indurite; poichè essi penetrano anche gli ossi, i quali sono di gran lunga più duri: mi servirò ancora di questa introduzione dei sughi nelle pietre indurite, per ispiegare la formazione d'alcune grosse pietre, le quali ponno esser considerate come tante specie d'*exostosi*, i quali nascono forse da una troppa affluenza del sugo tartaroso, a cui io attribuisco l'indurimento delle pietre. Se i corpi di cui si parla sono glandulosi, devono produrre delle secrezioni particolari, secondo il posto che essi occupano nella pera. L'inviluppo pietroso può separare l'umore della traspirazione; e le glandule della capsula pietrosa, gli umori che servono alla formazione dei granelli: ma credo più a proposito di trattar di ciò quando passerò all'efame delle parti alle quali esse sono più immediatamente congiunte.

ARTICOLO III. *Delle Incurvature o Scanalature del Calice.*

IL Calice del fiore del Pero ha, come dissi, nella circonferenza del suo contorno, cinque scanalature o intagliature, le quali ordinariamente durano quanto dura il frutto: esse formano nella sua estremità (Fig. 223) opposta al gambo una specie di corona all'antica, la quale circonda ed orla in una certa maniera quella parte del frutto, che ho chiamata *Umbilico*. Molte volte vedesi nella parte più grossa e più larga di queste appendici molte pietre le quali sono ricoperte dai corpi mucosi e dall'epidermide: le raddoppiature di queste membrane formano la punta dell'appendici di cui ragiono.

Quando si ammetta che le pietre dei frutti possano essere state in loro origine tante glandule, la gran quantità di pietre che trovasi nell'umbilico delle pere giunte alla loro maturità, mostra dunque, che vi era una gran quantità di glandule in quella parte quando erano i frutti per anche molto giovani: ciò non farà maraviglia, quan-

do riflettasi che nel tempo del fiore, gli stami, e i petali i quali sono tanti organi della fruttificazione, attaccati erano a quella parte; ma passato che sia il fiore, le glandule diventate essendo più dure, sono come tanti ossi, i quali comunicano la solidità alle appendici: talvolta ancora i tegumenti divengono molto attaccati alle pietre; e siccome essi sono in qualche modo callosi, si possono in un senso paragonare all' unghie degli animali. Talvolta questo indurimento si comunica al pedicelo delli stami, il quale allora sussiste fino alla distruzione del frutto.

ARTICOLO IV. *Della Tessitura fibrosa della Pelle.*

TOSTO che sia da una pera mezza e tenuta in macerazione levata l'epidermide, e che si abbia separato il corpo mucoso e l'involuppo pietroso; la sostanza che indi presentasi, pare che sia più solida della carne più interna della pera. Ho potuto ottener l'intento di riconoscere la struttura di questa sostanza, col siringare dell'acqua sopra di una di quelle pere ch'io teneva immersa in altra acqua, in guisa tale che ella ricoperta non fosse che da un sottilissimo pelo d'acqua: il fluido lanciato con impeto distaccava la parte parenchimatosa, o sieno i vasi i più capillari; e quando si operi con tanta diligenza da non rompere i vasi grossi, si scuopre una reticella composta di vasi alquanto grossi, i quali s'abbrancano a vicenda (Fig. 233), lo che Tav. VIII. fig. 233, impedisce di separarli per poi seguire distintamente tutte le ramificazioni d'un' istesso tronco, come vedrassi in appresso che ciò si può fare nella carne della pera.

Col modo ora indicato, si conosce dunque in questa sostanza una struttura abbastanza particolare per essere distinta dal resto della pera. Ho creduto di poterla paragonare alla pelle propriamente detta degli animali, la quale si vuol che sia un finissimo intrecciamento di vasi, con questa differenza, che non essendo le pere formate d'un sì gran numero di vasi di diverse specie come lo sono quegli degli animali, la tessitura fibrosa della pelle dei frutti non può essere nè abbastanza forte, nè abbastanza distinta quanto quella degli animali: E quindi senza stare troppo attaccati alla comparazione che adesso ho fatta, basti il sapere che l'estremità dei vasi della pera forma sotto l'involuppo pietroso una specie di reticella o tessitura reticolare, ch'io chiamo la *Pelle*. Avrò l'incontro di parlarne anche altrove. Ma prima

ma ch'io dia fine al presente Articolo, devo prevenire che quando ho detto che queste pietre potevano essere chiamate glandule, non ho preteso di adoperar questo termine in tutta la sua estensione, ma indicar solamente che queste pietre, prima del loro indurimento, possono fare in qualche guisa il ministero delle glandule.

ARTICOLO V. *Dei Vasi.*

QUANDO null'altro si bramasse che di provare che la sostanza della pera è formata d'un numero infinito di vasi, i quali insieme intrecciandosi si abbrancano o s'imboccano e vanno a far capo alle già descritte pietre le quali ponno essere considerate come specie di gomme, basterebbe il prendere una pera molto sugosa, vicina a venir vizza; per esempio una Pera Maddalena, e dopo averla mondata alquanto grossa per tirar via l'epidermide, l'inviluppo pietroso, e la tessitura fibrosa, si verrebbero a tagliar deltramente i vasi grossi, i quali fan capo alla rocca, la quale si verrebbe a levare con una porzione del canal pietroso: mettendo poi a macerar nell'acqua la pera, e introducendo il dito *indice* nel luogo della rocca, leggermente premendo col pollice, dimenando adagio adagio nell'acqua, per diffinire e staccare i vasi più piccoli, ajutando questa separazione colla punta d'uno stuzzicadenti, cambiando l'acqua, e interrompendo di tanto in tanto il lavoro, per lasciare operare la macerazione, si arriverebbe a distruggere una copiosissima espansione di vasi, dei quali

Tav.VIII.fig.134.

la Fig. 134 può darne una leggiera idea. Vi si vede che il gambo della pera è composto d'un' aggregato di vasi, i quali a misura che si affondano nel corpo del frutto, si dividono e sempre più si spandono, e diventano nel tempo medesimo sempre più teneri, fino a che si convertano in una umida polpa, la quale contiene quel dolce e grato umore, che nelle buone pere si gusta; lo che fa sì, che si può benissimo paragonar questa polpa al parenchimo di certe viscere degli animali, come, per esempio, al fegato o alla milza. Ma siccome le nostre cognizioni vanno più in là di queste cose generali, così d'uopo è di far vedere l'ordine costante e regolare, secondo il quale i vasi della pera disposti sono in questo frutto.

Tagliando trasversalmente una pera, in guisa tale, che in due dividansi i granelli, o li tramezzi o cellette che gli rinserrano, vedesi

Tav.VIII.fig.137.

nel centro (Fig. 137) i tramezzi e i granelli, intorno ai quali po-

poste sono le pietre che formano la capsula pietrosa, al di fuori della quale vedonsi dieci puntini di color diverso da quello della carne della pera, e che sono la fezione d'altrettanti grossi tronchi di vasi; ma per darne una giusta idea, d'uopo è il cominciare l'efame dei vasi dal gambo del detto frutto.

Facil cosa è lo scorgere nei gambi delle pere un copioso numero di fascetti di vasi, i quali si distendono per tutta la lunghezza di questa parte, senza che formino delle sensibili ramificazioni (*Fig. 232*). Tav. VIII. fig. 232. Questi vasi nelle novelle frutta sono teneri e flessibili, ma a misura che i frutti crescono essi s'indurano, e nelle frutta mature sono fissi e legnosi. Formano in detta parte una specie di tubo, in cui trovansi, allorchè le frutta son giovani, una tenera e succulenta sostanza, ma che per altro anch'essa, come i vasi, a poco a poco s'indurisce. Questa sostanza si prolunga coi vasi, secondo la direzione dell'asse del frutto nella guaina pietrosa, fin di sotto alla capsula pietrosa nella quale stanno i granelli, che in quella strada quasi niente si dividono; vedesi solamente qualche minimo ramicello che si dilata nella sostanza carnosa che li circonda. Ben vedesi per altro che per formar la carne delle pere, la quale vien considerata come la principal parte del frutto, perchè ell'è la più grata al gusto, bisogna che una porzione dei vasi del gambo *Fig. 232* dall'una e dall'altra parte si spanda per somministrarle alimento: ~~ma dall'altro~~ ma dall'altro canto non si può fare a meno di non accordare, che le pere sien formate per rinchiudere i granelli, che servir debbono a moltiplicarne la specie; e da un tal riflesso si concluderà, che vi devono essere alcuni vasi destinati a somministrar loro il necessario nutrimento.

Tutto ciò adempiesi, ma in guisa molto singolare: poichè 1.° Alcuni vasi *b*, ch'io nomino *vaganti*, si spandono per la carne appena che lasciato hanno il fascetto dell'asse (*Fig. 235*); e siccome mi Fig. 235. è sembrato, che detti vasi non offrano niente di regolare, nè per il numero, nè per la loro distribuzione, gli credo unicamente destinati a recare alimento alla carnosa parte delle frutta. 2.° Oltre a questi vasi, altri dieci più grossi costantemente se ne vedono *a* (*Fig. 235* Fig. 235 e 236. e *236*) i quali dopo avere abbandonato il fascetto dell'asse un poco al di sotto della capsula pietrosa, col serpeggiare, e delineare un'arco intorno alla detta capsula, vanno a far capo alla rocca, come ad un punto comune. La *Fig. 235* rappresenta da un lato uno di

PARTE I.

P

que-

questi vasi separato dalla carne, e si vede il medesimo vaso da un'altro lato impegnato pur anco in parte nella detta carne. La Fig. 236 fa sensibilmente vedere, come i petali *d*, e li stami *e*, si fissino sulle glandule che formano la rocca. Vi si distingue il canale per cui passano i pistilli: vi si vedono eziandio cinque di quei vasi grossi poc' anzi nominati, i quali vanno a far capo nella rocca.

Conosciuta che siasi una volta questa disposizione degli organi, facil cosa ell'è l'indagare le mire dell'Autore della natura: poichè quando la rocca era una sostanza glandulosa, in cui piantavansi i petali e gli stami, i dieci grossi vasi di cui parlammo, somministravano al fiore il nutrimento necessario; ma, appassiti i fiori, venendo le glandule ad ostruirsi e indurirsi tosto che i petali e gli stami non hanno più bisogno di alimento, gli umori introdotti dai dieci grossi vasi non essendo altrimenti accolti nelle glandule, sono allora costretti a rigurgitare sopra se stessi in un modo molto vantaggioso all'accrescimento del frutto, poichè per aprirsi nuove strade, costretti sono a regurgitare per le branche laterali nella carnosa sostanza dei medesimi frutti. E quindi, secondo una tale idea, accade in questa occasione qualche cosa di somigliante a ciò che succede dopo l'operazione dell'aneurisma, dove il sangue è costretto a dilatare i vasi laterali per aprirsi dei nuovi passaggi: del resto, quantunque io creda, che vi sieno alcune parti della pera le quali cambino organizzazione ed uso, ciò nulla ostante io giudico, che questo cambiamento sia molto più semplice di quello, che accade negli organi degli animali che si trasformano. Ma siccome questo raziocinio su null'altro è fondato che sulla congettura, non riuscirà inutile di aggiungerne un'altro che mi sembra più convincente: lo deduco da alcune osservazioni che ho fatte su i progressi e sull'accrescimento delle frutta.

Pare che nel tempo del fiore di null'altro s'occupi la natura, che della formazione dei granelli. Il calice allora, che deve diventare frutto, non cresce quasi se non a proporzione dell'aumento del volume dei granelli. Passato appena il fiore, ed allegati i frutti, rimangono ancora per qualche tempo senza crescere sensibilmente di volume, e ciò dura fin tanto che i granelli giunti sieno quasi alla loro naturale grossezza; in allora la sostanza carnosa delle pere manca quasi affatto, e li dieci vasi grandi serpeggiano tra i tegumenti e la capsula pietrosa o glandulosa, la quale tocca quasi i detti integumen-

ti;

ti; poichè allora questo intrecciamento, ch'io chiamo la *pelle*, non può distinguersi; ma quando i granelli giunti sono quasi alla loro grossezza, e che ad indurirsi principian le glandule, la sostanza carnosa allora sensibilmente si forma, e le pere crescono a vista d'occhio.

Sarà stato osservato ancora, che nelle pere più belle non stanno i granelli più belli: nella Pera Bona cristiana d'Auch sono essi quasi tutti abortiti o stentati, e nelle Pere selvatiche sono ordinariamente ben condizionati e formati. Egli è probabile, che la differenza che vedesi nelle pere d'Auch, nasca perchè i granelli non tirando veruno nutrimento, tutta la sostanza s'impieghi nella formazione della carne. Ciò può essere confermato da un accidente assai noto, il quale fa calcare molte pere. Allorchè i Peri sono in fiore, spesso succede, che una mosca faccia il suo nido nei fiori sbocciati o aperti, e vi depositi le ova, d'onde nasce un picciol verme il quale ha sei zampe sulla testa: questo verme entra nella pera per il canal pietroso, e vi si pasce di ciò che più gli aggrada: quindi scompone l'organizzazione delle glandule, e vi precipita il reflusso del sugo: ed ecco che le pere in tal guisa danneggiate molto prima dell'altre s'ingrossano; ma un tal precipitato accrescimento essendo fuori dell'ordine della natura, almeno in quanto alle frutta, divenute queste pere mostruose cascano da lì a poco.

Le prove che ho addotte del reflusso degli umori, e l'osservazione da me fatta circa i cambiamenti che ne risultano, mi hanno tenuto dal continuare l'efame dei vasi, e di seguitare la loro divisione, la di loro espansione, e la strada che essi tengono. E siccome questi son punti importanti molto per conoscere l'economia della pera, eccomi dunque di nuovo all'argomento.

Per poter dunque formarli un'idea chiara della distribuzione dei vasi, bisogna ricordarsi, che ve n'è un grosso fascio il quale senza separarsi si estende dall'estremità del gambo fino alla capsula pietrosa: ivi appunto detti vasi dividonsi, per poi compiere nel frutto diverse funzioni: alcuni da me già detti *vaganti*, si slargano in un tratto nella sostanza carnosa; altri, ch'io chiamo *Spermatici* per le ragioni che spiegherò in appresso, vanno circolarmente alla rocca, per somministrare nel tempo del fiore il nutrimento adattato alli stami ed ai petali, e poi servire, d'accordo coi vasi vaganti, alla formazione della carne. Questo certamente si è il motivo, per cui le

principali ramificazioni dei detti vasi vanno dalla parte della pelle sotto di cui essi si spandono, s'abbrancano, e coll' intrecciamento loro formano ciò che ho chiamato la *pelle* della pera. Debbo parimente fare osservare, che da ciaschedun vaso spermatico si distacca un ramo considerabile, il quale scende verso il gambo per nutrire quella carne che ivi ritrovasi, come può vederfi nelle *Fig. 235 e 236*, alla lettera *c*: altri finalmente ch'io nomino *Vasi nutritivi*, perchè mi sembrano particolarmente destinati ad alimentare i semi, si slargano attorno ai granelli, come lo diremo dopo d'aver parlato del parenchimo, il quale costituisce la parte principale della carne del nostro frutto.

A tenore di quanto detto abbiamo della distribuzione dei vasi vaganti e dei vasi spermatici, si può, per formarfi un'idea della fabbrica o ossatura della pera, immaginarsi un Pomo o Melo da mezzo fusto, spogliato di foglie, e pieno di frutta. Il fusto di questo Pomo rappresenta il fascio grosso dei vasi il quale forma il gambo o la coda, e che si stende fino alla capsula pietrosa: immaginiamoci poscia che il detto fusto divida in dieci branche, le quali rappresenteranno i dieci vasi che ho chiamati spermatici; serviranno i frutti a dare un'idea della posizione delle glandule: supponghiamo adesso, che si intreccino tra di loro i rami dell'estremità; supponghiamo parimente che essi si sieno scambievolmente innestati, e verraſſi a un di presso ad aver l'idea dell'intrecciamento che formano i vasi sotto i tegumenti. Col mezzo di questa comparazione, quantunque imperfetta, si potrà ravvisare l'ossatura d'una pera: ma vi rimangono ancora molti vuoti da riempire; questi vuoti son ripieni da una sostanza utricolare o cellulare, ovvero, da un parenchimo il quale cinge all'intorno i tronchi grossi e tutte le glandule, in forma di pe-

Fig. 233, 234, 235.

Fig. 227 231.

luria. (Vedi le *Fig. 233, 234, e 235*). Quelle fibre radiate, che veggonſi nella *Fig. 231* e quella peluria, che apparisce nelle *Fig. 227 e 231*; formano un' innumerabile quantità d'intrecciamenti e di annodature. Certe lenti del mio microscopio molto acute, m'hanno fatto distinguere, che queste fibre erano anch' elleno fasciate di piumino o peluria; e chi sa mai che anche questa peluria non sia fasciata d'un'altra peluria più fina? Checchè ne sia, io non asserisco, che questi filamenti sieno vascolari: come pure non nego che essi non formino degli utricoli, dei quali non ho potuto col microscopio vedere altro che la loro figura; insomma in quan-

to

to a ciò , e per tutto quello riguarda il parenchimo della pera ; vedasi. ciò che ho detto di queste parti medesime nel primo Capitolo , all' Articolo della tessitura cellulare .

ARTICOLO VI. *Dei Granelli e degli organi
inservienti alla formazione loro .*

AVENDO già esaminato i bottoni da frutto dei Peri , mi basta ora di qui rammentare , che i granelli si vedono nella base del pistillo , molto prima che sieno sbocciati i fiori . Quando i fiori sono aperti vedesi nel centro loro (*Fig. 115 Tav. III.*) cinque stili terminati dalla loro stimata: ciascun stilo corrisponde ad una capsula di granelli , che ne contiene due. Partendosi dalla stimata , ciaschedun stilo discende fino alla parte superiore di quella sostanza glandulosa , la quale da la nascita alli stami ; e vi conserva fin là una quasi uniforme grossezza ; dopo di che diminuisce un poco di grossezza , ed attraversa la rocca ed il canal pietroso , con cui non contrae aderenza alcuna . Pare che una buona parte del detto stilo seguiti la sua strada secondo l'asse della pera fino alla base dei granelli , ma questa porzione facilmente si separa in due , secondo la sua lunghezza , di modo che ciascuna di queste parti appartiene a ciaschedun dei granelli (*Fig. 238 Tav. IX. fig. 238 e 241*) un'altra porzione dello stilo si slarga sopra la parte esterna e 241. delle capsule dei granelli , come in *b Fig. 239* . Avrò tempo di parlare altrove di questi organi ; ma l'ordine che mi sono prescritto esige ch'io passi all'esame dell'altre parti .

Allorchè si taglia una pera per lungo (*Fig. 238*) , vi si vede *Fig. 238*. dalla parte del gambo un grosso fascio di vasi , il quale prolungasi , per l'asse del frutto , nella guaina pietrosa , la quale rinferra nel mezzo una sostanza tenera e delicata , che va a far capo , ugualmente che il fascio , in un'ammasso d'una sostanza particolare situata alla base dei granelli . Questa sostanza *a* (*Fig. 238*) ch'io giudico poterli chiamar la *Placenta* , per quelle ragioni che dirò in appresso , ell'è molto facile a discernersi dal resto in alcune specie di pere ; poichè ella è d'una tessitura più fina e più fissa dell'altra carne , e talvolta ella va a terminare a guisa d'un grosso capezzolo , o come un piccolo fiocco , in una cavità più o meno grande , la quale è tralle cellette o tramezzi dei granelli , e da me chiamata *seno centrale b* (*Fig. 238*) . I lati di questo seno formati sono dalle cellette

PARTE I.

P 3

te

te dei granelli: la di lui estremità, che è dalla parte della coda o gambo, è terminata dalla *Placenta*: quella che corrisponde all'ombelico è aperta, e le sue interne pareti sono ordinariamente rilevate da cinque spine principali le quali si distendono per la sua lunghezza, e terminano da una delle loro estremità allo stilo *e*, di cui esse sono una continuazione, e dall'altra estremità alla *Placenta a*.

Tav. IX. fig. 237. Trovanfi in ogni pera cinque capsule da granelli (Fig. 237), e ciascheduna capsula rinchiude due granelli i quali son situati in modo, che la parte grossa è dalla parte dell'ombelico, e la parte sot-

Fig. 241. tile dalla banda della coda (Fig. 241). Le pareti interne di ciasche-

Fig. 240. duna capsula formate sono da una membrana (Fig. 240), la quale è d'una tessitura molto fissa; questa membrana è molto liscia, e similissima alla cartapeccora: io le conserverò questo nome sotto del quale comunemente vien conosciuta. Vedesi ancora, che le fibre componenti la detta membrana hanno una direzione obliqua: può osservarsi una picciola unghietta *e* (Fig. 240) della medesima sostanza, a guisa di falce, la quale separa li due granelli solamente dalla parte grossa; e di più, che i granelli non sono quasi mai attaccati alla detta membrana: dico *quasi mai*, perchè vi ho trovato alle volte qualche poca d'aderenza, ma ciò è rarissimo; e questo caso pare che sia la conseguenza d'una malattia particolare. E quindi i granelli non
Fig. 240 e 241. ponno ricevere alimento, che da un vaso *d* (Fig. 240 e 241) il quale io chiamerò *umbilicale* come lo chiamarono molti Autori.

Ciaschedun granello ha il suo vaso umbilicale particolare, il quale
Fig. 238. le prende l'origine dalla *Placenta a* (Fig. 238), o da una sostanza un poco compatta la quale è formata dalla riunione dei vasi del pistillo, e di quelli di cui parleremo in appresso: l'altra estremità del vaso umbilicale attraversa la pergamena o cartapeccora, come pure l'inviluppo nero del granello, per portarsi a ciò che chiamasi propria-

Fig. 246. mente la Mandorla (Fig. 246), come spiegherò in appresso. Le capsule dei granelli lasciano ordinariamente tra di loro uno spazio più

Fig. 243. o meno grande, il quale è pieno d'una sostanza particolare (Fig. 243) il quale unitamente al Grevio io chiamerò *sostanza acidula*: ella è bianca, succulenta, d'una tessitura fina e fissa, d'un sapore squisito e ordinariamente agretto; ed ei mi par simile, giudicandolo col palato, ad una sostanza la quale trovasi in tutte le glandule, tanto della tessitura della pelle, quanto della capsula pietrosa; lo che potrebb-

be

be far credere, che ella sia in gran parte formata da sottilissimi vasi escretorj: questa acidula sostanza finalmente è in qualche modo rinchiusa dalla capsula pietrosa (Fig. 239).

Tav. IX. fig. 239.

Tralla sostanza acidula e la pergamena la quale forma le cellette dei semi o granelli, si scuopre il *plexus* reticolare (Fig. 242). E Fig. 242. per formarvene una giusta idea è d'uopo l'osservare esattamente la figura delle cellette (Fig. 244): elle terminano da una parte in una Fig. 244. specie di trinciante, come uno spicchio di mela; e dalla parte opposta, ove è maggior grossezza, elleno sono rotonde, ed orlate (Fig. 239) tanto sul lato rotondo, quanto sulla parte tagliente da due fascetti di vasi, i quali si stendono dalla estremità di ciaschedun pistillo fino alla *placenta* c. Per distinguere questi fascetti, io chiamerò quello a, la *porzione interna* dello stilo, e l'altro b, la *porzione esterna*. Questa fa un semicerchio intorno i granelli, e spande qualcheduno dei suoi rami nella sostanza pietrosa d: l'altra va dritta dritta dalla placenta c allo stilo e; in guisa, che le due porzioni si riuniscono per di sopra alle capsule. Ciò bene inteso, ritorno alla proposizione del *plexus* (Fig. 239 e 242) il qual prende l'origine dalla placenta c, Fig. 239 e 242. con tre o quattro tronchi di vasi; i quali dopo di essersi divisi in molti rami, ed essersi più volte insieme abbrancati e congiunti, vanno a perdersi nella parte superiore della capsula, non vi avendo, per quanto m'ha parso, che alcuni rami i quali si uniscono alla esterna porzione dello stilo; ma tutti i rami gettano una quantità di branche nella sostanza acidula. La Fig. 242 rappresenta da un lato il plesso del tutto staccato dalla pergamena, e dall'altra la pergamena, sull'esterno della quale vedonsi alcuni vasi della reticella.

Resta solo a parlare d'alcuni vasi (Fig. 239) i quali pure partono dalla *placenta*, e vanno immediatamente a slargarsi nella capsula pietrosa; la quale, come abbiám detto, è una specie di scatola glandulosa ed ellittica che rinchiude tutte le parti di cui ho già parlato. Sarebbe certamente desiderabile di conoscere quale sia l'uso immediato di tali organi; ma mi ristringerò adesso solamente a dire in generale, che devono essere relativi alla formazione dei granelli, perchè ne riserverò il dettaglio dopo quell'Articolo, in cui mi propongo di esaminare la importante questione del sesso delle Pianta. Credo però di dovere frattanto dir qualche cosa dei frutti capsulari e di quelli da nocciolo, lo che mi darà anche l'adito a parlare della for-

mazione dei semi. Siccome queste parti sono più sensibili nei frutti da nocciolo, che in quelli da semi o granelli, più facile saranno l'esposizione: oltre di che, dopo di aver dato, coll'Anatomia della pera, un'esemplare dell'organizzazione dei frutti carnosì i quali in loro origine fanno parte del calice, convienfi adesso di dare una idea dei frutti carnosì, i di cui embrioni sono semplicemente rinchiusi nel calice; le Mandorle, le Pesche, le Albicocche, le Prugne sono di questo genere.

ARTICOLO VII. *Anatomia dei frutti da nocciolo.*

D'uopo è il ricordarsi, che nei fiori dei Peschi, degli Albicocchi, dei Prugni, ec. gli stami ed i petali stanno attaccati ai calici, i quali cadono, passati che sieno i fiori: questi calici adunque non diventano mai carnosì come nelle pere; d'onde ne segue, che gli organi inservienti a formare la carne dei detti frutti, non hanno relazione alcuna col calice; e siccome i calici devono cadere appena che allegati sieno i frutti, pare che l'Autore della Natura non gli abbia provvisti, che di quegli organi che sono indispensabilmente necessari ai petali ed alli stami.

Tav. IX. fig. 247. Dando un'occhiata alla Fig. 247, vedrassi che i petali *a* sono attaccati da una sottilissima appendice agli angoli in dentro *b* i quali formano le scanalature del calice, e che i pediculi delli stami *c* prendono origine dall'interne pareti del detto calice. Egli è vero, che l'interno del calice è foderato, là dove si attaccano gli stami, d'una sostanza succulenta *d* la quale è d'un giallo vivo nella maggior parte delle specie di Peschi, e spessissimo carico d'un umor mielato, il quale pare travasato. Questa sostanza gialla, sarebbe mai glandulosa? Sarebb'ella mai equivalente a quelle glandule del calice della pera, le quali sostengono gli stami? Questo è ciò ch'io non avrei il coraggio di decidere.

Il fondo del pistillo *e*, quella parte più rilevata di tutto il resto che chiamasi l'embrione, essendo isolato nel calice dei frutti da nocciolo, non deve d'altro esser provvisto, che degli organi inservienti alla formazione del granello, ed alla produzione della carne. M'ingegnerò di darne una idea giusta, quantunque concisa.

Ho già detto, che ogni granello della pera aveva presso la sua Fig. 245. parte impuntita un vaso umbilicale *a* (Fig. 245); ho anche soggiun-

giunto, che il detto vaso attraversava la pelle scura del granello, e che andava a perdersi verso la parte grossa sotto gl' involuppi (Fig. 246). Tav. IX. fig. 246.
 Si offerva qualche cosa di quasi simile nei noccioli delle Mandorle, dell' Albicocche, delle Prugne, delle Pesche (Fig. 248). Fig. 248.

I noccioli dell' Albicocche, e delle Prugne sono rilevati da un lato da una spina o costola tagliante, e dall' altro sono incavati da un picciol solco. I noccioli delle pesche (Fig. 249) in vece di questa costola, hanno un solco poco regolare; e dall' altro lato hanno una fessura più fonda e più regolare (Fig. 250) la quale è orlata da due labbra rilevate. Introducendo in questa fessura il taglio d' un coltello, si spacca il nocciolo in due, e vi si vede un canaletto (Fig. 251) vuoto nel legno; e sembra ragionevole il credere ch' egli fosse destinato a ricevere il vaso umbilicale. Fig. 249. Fig. 250. Fig. 251.

Ho detto eziandio, in parlando dei granelli delle pere, che questo vaso penetrava entro la loro bruna scorza, e che tralla detta scorza e gl' interni involuppi della Mandorla, egli andava ad investire la parte grossa, ove poi univasi agli detti involuppi. Egli è presso a poco lo stesso nei frutti da nocciolo, i quali indipendentemente dalla scatola legnosa, hanno ancora le mandorle ricoperte di molti involuppi, dei quali prometto di parlare in appresso. Per altro vi è, se non m' inganno, una notabilissima differenza dal cammino che tiene il detto vaso umbilicale nei frutti da nocciolo, da quello ch' egli conserva nei frutti da granello. E per intenderlo, bisogna esser avvertiti, che vi è luogo a credere, che la scatola legnosa dei frutti da nocciolo abbia cominciato dall' essere glandulosa; lo che mi fa pensare, ch' ella possa far le veci, in quelle specie di frutti, di quel corpo che ho chiamato la *Capsula pietrosa* nelle pere. Riporterò tra poco quelle ragioni che m' hanno indotto a formare una tal congettura; ma se ella trovasi ben fondata, perchè dunque il vaso umbilicale, il quale nella pera non traversa per la capsula pietrosa, seguita egli nella scatola legnosa il cammino, che vedesi accennato nella Fig. 251?

Fa d' uopo osservare, che i granelli delle pere sono situati in maniera, che la punta, dov' è la pianticella, è rivolta verso il lato del gambo, cosicchè il vaso umbilicale al sortire dalla placenta s' infinua immediatamente fra gli involuppi, e va ad occupare l' estremità più gonfia del granello.

Al contrario poi nei frutti da nocciolo, la parte appuntata delle Mandorle è rivolta dalla parte dello stilo, e la parte rilevata, dal lato della coda o gambo; di modo che mi ha parso, che il vaso
 Tav. IX. fig. 251. che passa per la scanalatura segnata sulla Fig. 251, entri nella cavità del nocciolo, e s'insinuì negl' involuppi della mandorla, nel punto segnato *a* (Fig. 255). Confesso sinceramente, ch'io non ho con troppa esattezza seguitata la strada del detto vaso sotto i detti involuppi. Ma egli è probabile, ch'egli vada, come nel granello, ad investire la parte grossa verso *b* (Fig. 255). Ritorno al paragone della scatola legnosa colla capsula pietrosa della pera.

L'interno dei noccioli è formato d'uno strato di sottilissimo legno, e d'una tessitura fina e serrata: egli è liscio, lucido; contiene immediatamente la mandorla, senza aver con essa adesione veruna: tutte queste circostanze m'inducono a paragonarlo colla cartapeccora delle cellette in cui rinchiusi stanno i granelli delle pere, con questa differenza, che questa membrana ha acquistata una maggior consistenza nei frutti da nocciolo, che in quelli da granello. Sopra la cartapeccora delle pere si scorge ciò che nominai il *plezzo* reticolare
 Fig. 242. (Fig. 242): un *plezzo* simile vedesi pure nell'interno delle mandorle dal
 Fig. 253. guscio tenero (Fig. 253); e si vede sensibilmente, quantunque quella reticella sia converfa in legno, ch'ella sponde dei rami, tanto verso quella laminetta legnosa e liscia poc' anzi nominata, quanto nella parte legnosa, ch'io credo che sia stata prima glandulosa nei frutti novelli.

Ciò che mi fa credere, che il corpo del nocciolo sia stato in sua origine glanduloso, si è, che avendo posto a macerare nell'acqua dei frutti da nocciolo di qualunque età, ne ho veduti alcuni il di cui nocciolo dividevasi affatto in grani simili presso a poco a quelli delle pietre delle pere. Questa osservazione mi ha ancora fatto osservare, che si trovano alcune specie di prugne, il di cui nocciolo è tenero abbastanza per essere agevolmente diviso in grani, senza essere stato posto in macerazione. Vero si è, che nei noccioli duri non vi si può distinguere nè il *plezzo* reticolare, nè i suddetti grani: ma pure, siccome tutti i noccioli sono probabilmente organizzati gli uni come gli altri, ho creduto bene di non omettere le congetture poc' anzi dette, se non altro per indurre i Fisici ad esaminare i detti organi sotto di quel medesimo punto di vista, che ha fatto impressione anche a me.

Nei

Nei frutti da nocciolo, come pure nei frutti da granello, la parte carnosa non fa un gran progresso se non dopo che si è formata la mandorla; e quando vogliasi acquistare una giusta idea della distribuzione dei vasi i quali formano la detta carne, aspettar conviene, che i frutti giunti sieno ad una perfetta maturità, e che sieno in certo modo cotti sull'albero; allora appunto sono abbastanza sensibili in certe Albicocche; e farà anche bene l'esaminare alcune specie che non lasciano il nocciolo. Con queste avvertenze, e dopo aver mondato col coltello le Albicocche per togliere i tegumenti e l'intrecciatura dei vasi i quali sono nella circonferenza del frutto, e che facilmente vedonsi nelle Ciriegie spellate, come nella Fig. 254 ho pos-
 Tav. IX. fig. 254.
 te le Albicocche, ch'io voleva aprire, entro l'acqua, e dopo di avere usate quelle cautele medesime, che tanto felicemente mi erano riuscite per la dissezione delle pere, ho distinto. (Fig. 252), che i Fig. 252.
 vasi grossi partono dalla coda e vanno a spandersi per la carne; uno grosso tra gli altri ne ho visto, che stava obbligato entro la scanalatura del nocciolo, e che somministrava molti rami alla parte carnosa. Questi fasci o tronchi principali si dividono in una infinità di rami i quali guerniti sono d'una sottilissima peluria. In quelle Albicocche che non si spiccano, cioè non lasciano il nocciolo, una quantità di vasi, come pure una parte della detta peluria, pare che si partano da tutti i punti della ~~scatola legnosa, e nelle~~ Albicocche che si spiccano, pare che i detti vasi sieno stati tagliati dal nocciolo istesso il quale ha acquistata una durissima consistenza, e che la carne, avendo continuato ad acquistare dell'estensione dopo che il nocciolo aveva cessato di crescere, siasi discostata dalla detta scatola legnosa. Nelle Pesche, frequentemente vedonsi dei vasi grossi i quali escono dai solchi del nocciolo. Certe specie di pesche d'Autunno sono buonissime a far vedere questa distribuzione di vasi i quali chiaramente appariscono sulla superficie del taglio d'uno spicchio di pesca. E quindi dunque, per avere una chiara idea della distribuzione de' vasi in una pesca, bisogna sapere: 1.º Che la coda o gambo di questo frutto, la quale è molto corta, è formata dall'unione di molti vasi, alcuni fascetti dei quali vanno, contornando il nocciolo, a portarsi alla punta del frutto opposto alla coda, là dove nel tempo del fiore è situato lo stilo: 2.º Che un gran numero dei detti vasi vanno subito a spandersi nel legno del nocciolo; e pare che il pri-
 mo

mo officio della detta scatola legnosa destinato sia alla preparazione dei fughj necessarj alla formazione delle mandorle: 3.^o Che esce dalla superficie della detta scatola legnosa un numero infinito di vasi: 4.^o Che tutti i vasi formano col di loro spandimento la carnosità sostanza della pesca, e che quindi la maggior parte dei vasi, i quali formano la detta carne, non prendono immediatamente l'origine della coda, ma dal corpo legnoso che rinchiude la mandorla, mentrèchè il corpo legnoso riceve immediatamente dalla coda i vasi che gli son proprj. Così almeno compariscono le cose quando il nocciolo è duro; poichè io credo, che quando il nocciolo è peranche tenero, la distribuzione dei vasi della pesca non differisca molto da quella dei vasi corrispondenti alla sostanza acidula, ed all'involuppo pietroso della pera. Mi resterebbero ancora a dir molte cose intorno alla distribuzione dei detti vasi, ma siccome io temo d'essermi troppo dilungato sopra tale materia, passerò a parlare di ciò che riguarda la formazione delle mandorle nella scatola legnosa che le rinchiude.

ARTICOLO VIII. *Della formazione delle Mandorle.*

Ho già detto, che i Noccioli giungono quasi alla loro naturale grossezza prima che la carne sia sensibilmente formata; egli è lo stesso di quei noccioli che hanno acquistata quasi tutta la loro grandezza, molto prima che le frutta arrivate sieno alla loro naturale grossezza; e non è cosa rara il trovar delle pesche la di cui carne è appena formata, ed il di cui nocciolo, il quale è già molto grande, rinchiude una Mandorla ben condizionata. Se si apre un nocciolo arrivato alla sua grossezza, ma in un frutto peranche verde, si trova ripieno d'una sostanza viscosa (Fig. 256), la quale io credo che sia organizzata e tramezzata da molte membrane (*). Nelle frutta giovani la scorza della mandorla è bianca; in queste medesime frutta diventate più grosse l'interno della membrana, che immediatamente ricuopre la mandorla, è bianco ancor egli: l'esterno della detta membrana è del color di marrone nei granelli delle pere arrivate

Tav. IX. fig. 256.

(*) Il Grewio, il quale ha fatto moltissime ricerche intorno alle semenze, dice che dopo aver fatto bollire delle fave ripiene d'umor viscoso, era il detto umore diventato sfilo.

vate alla di loro maturità, e giallo nelle mandorle propriamente dette; e questa scorza gialla è in qualche modo granellosa e molto grossa. Quando le mandorle sono arrivate alla loro maturità, la detta scorza diventa più sottile e si annerisce; e se si mettono per qualche giorno delle mandorle secche nell'acqua, si vede che quell'involuppo scuro è attraversato da molti vasi (Fig. 255). Ritorno alla mandorla verde piena d'umore viscoso. Tav. IX. fig. 255.

Si comincia a vedere in punta della detta mandorla un picciolo punto bianco: da lì a qualche poco il detto punto diventa più sensibile (Fig. 257), e si vede ch'egli è abbasso incastrato in una piccola vescica trasparente, molto diversa dal restante dell'umor viscoso, con cui ella comunica solamente per il filetto *a* (Fig. 259). Il corpo bianco, che è la mandorla, s'ingrossa, ed in proporzione dell'aumento di grossezza della mandorla, anche la vescica acquista estensione (Fig. 258): la mandorla seguita a crescere di volume, come pure la vescica, la quale a poco a poco usurpa tutta la viscosa sostanza che stava entro il guscio, di modo tale, che null'altro resta che le membrane: la mandorla allora s'ingrossa a spese della vescica, di cui consuma tutta la sostanza, e viene a riempire tutta la capacità del guscio. Fig. 257. Fig. 259. Fig. 258.

Ciò che mi ha sempre molto sorpreso si è il non aver mai potuto distinguere una comunicazione ~~molto sensibile della mandorla con~~ la vescica; ho solamente veduto alle volte una specie di vaso, il quale passando tra li due lobi della mandorla, mi pareva che andasse fino al germe; ma o fosse questo realmente un vaso, o sia che la mandorla si nutrisca per la radica femminile, di cui parleremo in appresso, la quale faccia l'offizio di una radice ordinaria, egli è costante, che la mandorla si alimenta a spese della vescica, come pure la vescica si alimenta a spese dell'umor viscoso. Importa di ricordarsi di tali osservazioni, perchè me ne servirò nel seguente Libro, dove parlerò della mandorla allorchè è perfetta. La Fig. 259 rappresenta la mandorla *b*; la vescichetta *c*; la sostanza viscosa *d*; il vaso di comunicazione *e*.

ARTICOLO IX. *Dei Frutti Capsulari.*

ABBIAMO veduto, che la pera, la quale formasi dell'istesso calice del fiore, rinchiude, oltre gli organi appartenenti ai petali ed alli
sta-

stami, ancora quelli immediatamente inservienti alla formazione ed al nutrimento dei semi e della carne. Nelle Pefche, nelle Albicocche ec. i di cui calici cascano, allegati che sieno i frutti; i frutti che stanno isolati entro il calice non contengono se non gli organi appartenenti immediatamente ai semi, e quelli inservienti alla formazione della carne. Vi sono eziandio dei frutti più semplici, come appunto i *Capsulari*; poichè essendo gli stami e i petali nutriti dal calice, i frutti poco o niente carnosì hanno i soli organi necessarj alla nutrizione dei semi. Ho scelto per esemplare le Carobe o Sili-

Tav. IX.

Fig. 260 e 261. que (Fig. 260) i quali son veri frutti *Capsulari*. Vedesi (Fig. 261) che gli stami prendono la loro origine alla base del pistillo, il qua-

Fig. 262. le è formato (Fig. 262) d'una stimata o di due, d'uno stile che si ripiega allo spuntar dall'embrione il quale è bislungo; che in vicinanza dell'embrione, lo stile divide in due fascetti, uno dei quali più grande dell'altro, orla il baccello, o la Caroba, dalla parte di *a* (Fig. 260) e l'altro dalla parte di *b*. Il fascetto più grande somministra alcuni rami a un poco di carne la quale ricuopre i gusci verdi; e questa distribuzione di vasi forma un *plezzo* reticolare, il quale è molto simile a quello che abbiamo descritto, parlando delle pere e delle mandorle. L'interno dei gusci è formato d'una pergamena composta di fibre la di cui direzione è obliqua (Fig. 261) ma i grossi *navi* o *costole* ricevono i vasi umbilicali, i quali somministrano il nutrimento ai semi che non sono in verun modo at-

Fig. 265. taccati alle capsule. La Fig. 265 è particolarmente destinata a far

Fig. 264. vedere il detto vaso umbilicale: si vede (Fig. 264) una semenza verde, spoglia della sua scorza *a*, la quale è grossa nei frutti per anche verdi; e diventa sempre più sottile, a misura che si maturano i semi: i lobi *b* sono per di dentro.

Non è possibile ch'io percorra, nemmeno succintamente, le organizzazioni diverse, che si vedono nei frutti *Capsulari*; mi contenterò di dire, che i semi che in quelli rinchiodonsi, sono attaccati da un vaso umbilicale qualche volta ad una placenta posta nell'asse

Fig. 267. della capsula (Fig. 267); qualche volta la detta placenta divide in

Fig. 266. due o in più porzioni, come nella Fig. 266; o pure ella forma

Fig. 268. delle costole nella parte interna dei frutti, come nella Fig. 268.

C A P I T O L O III.

DELL'USO DELLE PARTI DEI FIORI e DEI FRUTTI.

ABBIAMO veduto nel precedente Capitolo , che i fiori ed i frutti formati sono da un grande apparecchio d'organi ; e tutti i Fisici son persuasi , che i detti organi sien destinati alla formazione dei semi , i quali servono alla moltiplicazione delle specie : questo generale ministero non soffre dunque veruna alterazione ; ma son ben divise le opinioni intorno alle diverse funzioni che attribuir si debbono a ciascuno di quegli organi di cui abbiamo ora dato una superficiale idea .

I fiori completi sono , come ho già detto , formati del calice , di petali , di stami , o d'uno o di più pistilli . Ho parimente detto , che non si devono considerare i calici come indispensabilmente necessarij alla fruttificazione , mentre molti fiori somministrano ottimi semi , quantunque non abbiano calice . Si vede bene , che in certi fiori il calice che sostiene i petali e gli stami , è provveduto d'organi i quali sono certamente necessarij alle dette parti ; ma quando mancano loro i calici , la Natura gli ha probabilmente risarciti col dar loro alcuni altri organi equivalenti .

Checchè ne sia . si accordano i Fisici a credere , che i calici , i quali allorchè gli organi della fruttificazione erano tenerissimi , servissero a difenderli dall'ingiurie dell'aria , e poi somministrassero alle aderenti parti la nutrizione .

Non ponno nemmeno i petali essere reputati come organi assolutamente necessarij alla fruttificazione : ne ho già addotte le ragioni , ed ho detto che potevano essi proteggere li stami ed i pistilli , far l'ufficio delle foglie per rianimare il moto degli umori negli organi della fruttificazione , e forse ancora dare ai detti umori alcune importanti preparazioni , specialmente in quei casi in cui gli stami si partono dai petali , poichè allora hanno probabilmente una disposizione organica convenevole alle parti dei fiori .

Gli organi adunque sicuramente necessarij alla fruttificazione si riducono alli stami ed ai pistilli : sopra di ciò non può cader dubbio alcuno , imperocchè tutte le osservazioni si accordano a stabilire :
1.º Che non vi è pianta veruna atta a dare buoni semi senza esser prov-

provvista di pistilli e di stami riuniti in un medesimo fiore, o separati: 2.^o Che allorquando, come per un mostruoso accidente, che vedesi nei fiori doppj, tutti gli stami si trovano cangiati in petali, questi fiori non producono semi perfetti: 3.^o Che alcuni fiori, il di cui pistillo apresi in picciole foglie, non fanno semenza veruna: 4.^o Che se si tagliano apposta gli stami prima che le cime loro si aprano, i frutti abortiscono, oppure non fanno i semi secondi: 5.^o Che gli embrioni parimente abortiscono quando, appena che i fiori sono aperti, si leva lo stilo e la stigmata.

Tutti questi fatti, di cui non v'ha chi dubiti, provano unicamente, che gli stami ed i pistilli sono necessarj per la formazione dei semi; ma non mettono in stato di decidere la questione principale, la quale divide i Naturalisti intorno all'uso delle dette parti. Ecco a che ella riducesi, poichè sarebbe inutile di discutere quelle opinioni che al presente sono generalmente abbandonate.

Alcuni, e tra questi il Turnesforzio, hanno considerato gli stami ed i pistilli come organi escretorj, la di cui funzione riducesi a sollevare le piante d'un'escremento, presso a poco come i reni degli animali separano l'orina dalla massa del sangue. Altri, come il Pontadera, hanno preteso, che i detti visceri formati fossero d'una quantità d'otricoli nei quali ricevesse il sugo una preparazione, che lo rendesse atto a nutrire le frutte novelle. M. Alston considera, come il Turnesforzio, la polvere degli stami come un'escremento; e paragonando gli embrioni dei fiori ai bottoni ed ai calici, dice francamente, che nell'istessa maniera che queste parti dei vegetabili fanno delle produzioni senza il soccorso delle polveri, possono eziandio gli embrioni, senza un tale soccorso, divenir frutti ben condizionati. Siccome M. Alston egli è uno degli ultimi Autori, che abbia scritto sopra questa materia, egli ha opposto alla quì detta opinione molte obiezioni di cui non si può comprenderne il valore, se non dopo che avrò esposta l'opinione ora generalmente tenuta da tutti i Botanici, ed i Fisici: Eccola.

Avvi per molti rapporti tanta conformità tra i vegetabili e gli animali, che in forza di una tale analogia, ha bisognato ammettere nelle piante la differenza dei sessi. Nè credasi già ch'io intenda quì di dire di quella male intesa usanza, che ha stabilito una distinzione delle piante maschie e femmine; questa distinzione non è fondata so-

sopra nessuna disposizione organica relativa ai sessi, ed ella si ristringe a considerare come piante femmine quelle che sono più delicate e di statura più piccola, e come piante maschie, quelle che hanno un robusto temperamento: questa si è quella abusiva distinzione che ha fatto dividere gli Olmi, i Cipressi, le Querce in maschi ed in femmine. Non si tratta già nell'opinione, che ora espongo, di descrivere diversi individui, ma piuttosto gli organi presi in un medesimo individuo, alcuni dei quali servono a produrre la semenza, ed a nutrirli fino al suo stato di perfezione, e gli altri a renderla feconda.

Quantunque abbia Teofrasto distinte le Palme in maschi, ed in femmine, perchè alcune fanno i frutti, ed altre sono sterili, e pare che a null'altro sieno destinate, che alla fecondazione degli embrioni che sono i primi ch'esse portano, e quantunque egli dica espressamente, che i frutti della Palma si perdono, qualor non abbiasi l'attenzione di scuotere fugli embrioni le polveri degli stami, soggiungendo, che vi è in tale occasione *quasi coitus*; nulla di meno questo Scrittore ricade nella distinzione abusiva già nominata, e chiama maschi o femmine certi alberi, che sono certamente ermafroditi, e nelle classi in cui vi sono degli individui, i quali non fanno che fiori maschi, e degli individui che non fanno, che i fiori femmine: senza niente abbattere agli organi del sesso, egli stabilisce questa definizione sul vigore, sulla grandezza, e sulla forza degli Alberi. Alcuni seguaci di Teofrasto hanno inoltrato la cosa fino a chiamar femmine quegli alberi, che producono i frutti più belli; e questa denominazione si è estesa a degli oggetti, che non ne sono in verun conto suscettibili: ed in conseguenza appunto di un tale abuso chiamasi nelle botteghe l'*Incenso maschio*, il *Mastic maschio*, ec.

Dioscoride e Galeno distinguono veramente la maggior parte delle piante in maschi ed in femmine, ma senza un rapporto molto distinto tra questa denominazione e le parti sessuali. Plinio dice espressamente, che tutte le piante hanno due sessi. Ed ancor egli, e Jonston dopo di lui, adduce l'esempio della Palma prodotto da Teofrasto (1).

PARTE I.

Q

Pur

(1) *Veneris intellectum, mareque afflatu quodam & pulvere etiam feminas maritare*. Jonston dice ancora, *Maritare quasdam necesse est; hinc maris & femina confusa in illis principia sunt*.

Pur non ostante questi Scrittori ricadono nelle distinzioni abusive sopradette. Questa confusione ha durato fino al Cefalpino, il quale ha parlato più positivamente sopra la fecondazione dei frutti colla polvere delli stami: egli chiama femmine quegli alberi che producono dei frutti; e chiama maschi quelli dello stesso genere, che sono sterili; e soggiunge, che i frutti vengono migliori quando gli alberi che gli fanno sono vicini ai maschi (1).

Il Grewio nella sua *Anatomia delle Pianta* determina anche più questa materia, dicendo positivamente, che quando le capsule delle cime o punte si aprono, le polveri che esse contengono cadono sugli embrioni, e sui pistilli, e che esse fecondano i frutti, non già coll'introdursi nei semi, ma in virtù della comunicazione d'una sottile e vivificante esalazione. Il Rayo adottò questa opinione nella Prefazione della sua *Istoria delle Pianta*. Il Camerario Professor di Botanica a Tubinga, ha fatto un trattato per provare, che la generazione delle Pianta è simile a quella degli animali, ed espressamente egli osserva, che ogni qual volta le cime delli stami, o i pistilli mancano al Formentone, o Grano Turco, i semi sdrucchiolano, e non producono più granelli capaci di germogliare. Egli per altro si fa sopra di ciò alcuni obietti di cui parleremo in appresso. Morlant, nelle *Trasazioni Filosofiche*, accorda anch'egli che gli embrioni son fecondati dalle polveri delli stami; ma non vuole per altro accordare, che ciò succede in virtù d'un vapore, come dice il Grewio; egli pretende che vi sia nelle polveri un mucchio di piante femminali le quali s'introducono nell'embrione per via de' pistilli. Heister è così tenacemente attaccato all'opinione del Camerario, ch'egli pretende, che questo Autore abbia quasi dilucidata questa materia.

Il Geoffroy, il quale adotta l'esistenza dei due sessi nelle piante, dice nella sua *Dissertazione intorno all'uso delle parti principali dei fiori*: 1.° Che non si distingue il germe nei semi, se non quando le cime o antere hanno gettato le polveri: 2.° Che quando si tagliano gli stami prima della jaculazione delle polveri, i semi abortiscono o rimangono sterili. E ne adduce per esempio il Formentone già citato dal Camerario e la Mercorella. Accordava per altro anche il Ca-

mera-

(1) *Quasi balitus quidam e mare effusus, debitum feminis calorem explet ad fructificationem.*

merario, che alcuni semi giungono a maturità; ma attribuisce questo al vento, che da lontano le polveri trasporti.

Il Vaillant sostiene con tutto l'impegno il sesso delle piante nel suo *Discorso su la Struttura dei Fiori*, ma osserva: 1.° Che nella Parietaria gli stami hanno sparso già la polvere prima che aperti sieno i pistilli: 2.° Che la polvere non può giungere fino all'embrione per il pistillo, il quale il più delle volte non è vuoto: 3.° Che quando i pistilli son vuoti, non si vede apertura alcuna per cui la polvere insinuar si possa nelle piante: 4.° Finalmente che uno spirito volatile e sottile può esser comunicato dal pistillo al vaso umbilicale, e per questa strada arrivare alla fecondazione. Ben vedesi, che il Vaillant qui combatte l'opinione del Morlant, e del Geoffroy, e ch'egli adotta quella del Grewio. Il Signor Linneo ha fatta una dissertazione a posta, in cui stabilisce la necessità del concorso dei due sessi, per avere dei semi atti a produrre i loro simili. Ho finalmente adottato ancor io l'esistenza dei due sessi nelle piante, parlando della Canapa, nella mia Opera delle *Manovre* delle Navi, e nelle ricerche che ho fatte intorno alla causa delle nuove specie dei frutti, e intorno all'Anatomia della Pera. Ed intanto, per determinare le idee su d'un oggetto tanto piacevole, anderò brevemente esponendo ciò che è stato creduto intorno alla generazione degli animali; poscia mi diffonderò alquanto sulle osservazioni che sono state fatte intorno ai vegetabili. Più d'ogn'altro addurrò per esempio la Pera, poichè di questa ho più maturamente esaminate le parti organiche relative al sesso.

Gli Antichi hanno ammesso due sorte di generazione: l'una che era il risultato della corruzione, in conseguenza di cui credevano, che la maggior parte degl'insetti da questa ne nascesse; l'altra come dipendente da un germe, che risultava dal concorso dei due sessi: questo concorso era troppo sensibile negli animali grandi, per poterlo porre in dubbio.

La bravura dei Naturalisti gli ha condotti ad alcune osservazioni, le quali non lasciano altrimenti ammettere altra causa di generazione se non quella dei germi. L'invenzione delle Lenti di cristallo, e dei Microscopj ha potuto concederci di vedere e d'essere testimonj della riproduzione di molti insetti, i quali erano per lo avanti creduti prodotti della corruzione. Egli è vero, che questi istrumenti, i qua-

li ci permettono di vedere certi corpi di cui ne ignoravamo per fino l'esistenza, non sono per anche giunti a quel grado di perfezione che ci possa mettere in istato di osservarne la loro riproduzione. Ma da che siamo stati testimonj dell'accoppiamento dei minutissimi insetti; da che si è scoperta l'industria con cui alcuni insetti depongono gli uovi loro dentro quelle carni, le quali dopo la lor corruzione somministrano un convenevole alimento a quei vermi, che ne debbono nascere; da che si è veduto alcuni altri insetti penetrare fin dentro al corpo degli animali per ivi depositar l'ova; in qual modo traforano alcuni il cuojo dei Bovi, la corteccia degli alberi, perfino il legno, e sempre per collocare i vermi, che sbucar devono dall'ova loro in un luogo ove trovar possano un adattato alimento? Si è parimente scoperto con l'affiduo esame, e col soccorso dei microscopj delle semenze in molte piante per lo avanti tenute per sterili ed infeconde.

Dopo tutte queste scoperte, di cui debitori ne siamo al Redi, al Reamur, al Micheli, a Linneo, ec. non siamo noi forzati a credere, che mai scomposta sia l'uniformità della natura, eziandio in quegli esseri, che appena coll'occhio discernere possiamo? Sembra almeno, che prudente sia l'astenersi dal pronunziar sentenza sopra tali origini, fin tanto che nuove scoperte ci pongano in stato di meglio esaminarle. Se in qualche circostanza la osservazione non è pienamente compiuta, se ci troviamo imbrogliati nel provare quale siasi l'origine d'alcuni insetti, di certe mosche, quei lumi spanti dalle osservazioni sopra tanti esseri del medesimo genere, e dei quali ascosa ci era l'origine, devon piuttosto farci pendere a credere, che nulla v'è che dalla regola generale traligni, che non v'è essere alcuno, che debba al puro caso il suo principio, che tutti sono prodotti da una simile generazione, la quale dal concorso dei due sessi dipende: il più picciolo mosciolino nasce come il Rinoceronte, e la più piccola erbetta, come lo altissimo Rovere.

Fatte queste osservazioni, d'uopo farebbe abbandonarsi ad altre idee più meditate e riflettute, per ammettere l'equivoche generazioni; e certamente colui che fassi una legge di sottomettere all'esperienza le proprie idee, colui che esiger vuole da se medesimo, che i raziocinj suoi coll'osservazioni s'accordino, questi finalmente sarà ben lungi dal sostenere, che un corpo che con sì bell'arte vede organizzato, con tanta simetria e precisione composto, sia il risultato del caso, d'un
con-

confuso moto, d'un fortuito accozzamento delle parti della materia. Se qualcuno vi fosse che si ponesse in mente di porre di nuovo in campo queste antiche idee, io gli domanderei in qual modo ei pretendesse di combinarle con quella perpetuità ed uniformità che gli osservatori vedono trà tutte le produzioni della natura. Le specie, per dire il vero, sono infinitamente variate, poichè la vita d'un instancabile naturalista appena è bastante per conoscerne una porzione; ma fanno bene gli osservatori che ogni specie si moltiplica all'infinito, senza sofferrne un notabile cangiamento. Fino dai più remoti tempi, hanno gli Elefanti prodotto sempre Elefanti; le Querce delle Querce; i Muschi il Musco.

La natura suole ordinariamente seguitare le leggi generali, che imposte le furono dal di lei divino Autore; e questa riflessione obbliga a concludere per analogia, che dato che un numero di esseri viventi nasca dall'uova, le piante che sono anch'elleno esseri viventi, debbano avere parimente una poco dissimile origine. Non dico già, che le piante non possano essere in altra guisa prodotte, poichè quasi tutte si moltiplicano dal germe, dalle barbatelle, o da propaggini, o da marze; ma chi investigar volesse l'origine di queste barbatelle, e di queste propaggini, troverebbe ch'elleno prodotte furono da un'albero, il quale è stato prima di tutto formato da un seme, oppure, da un'uovo. Paragonando i semi dette piante coll'ovà degli Animali, non pretendo già di stabilire che somigliante sia d'ambidue l'organica disposizione; ma mi prevalgo di questo termine, perchè tanto l'uno che l'altro prodotti sono per il medesimo oggetto: potrei anche dire che vi è maggior somiglianza tra un nocciolo, ed un'uovo d'uccello, che tra quest'uovo e quello d'un viviparo. Non spingerò più oltre questo paragone, perchè dovrò farlo in appresso.

Può una gallina far l'uovo senza che un gallo la secondi, ma non potrà quell'uovo produrre il pulcino; e siccome la costante esperienza ci assicura che la femmina sola può produrre un germe infecundo, bene a ragione può tenerci come regola generale, che il concorso dei due sessi sia necessario per la moltiplicazione delle specie. Vedremo in appresso che questa legge può estendersi eziandio ai vegetabili; e dopo l'esempio dell'uova degli uccelli, non vi sarà più da maravigliarsi in vedere un frutto, ed anche un seme non fecondato, giungere alla sua naturale grandezza, senza che sia seguita fecondazione.

ne veruna. Bisogna adesso esaminare se questi semi atti sieno a germogliare ed a produrre il loro simile.

Egli è noto che la fecondazione segue diversamente nelle diverse specie degli animali: e quantunque distinguasi nei pesci la differenza dei sessi, e che alcun non vi sia che ponga in dubbio che l'ova loro sieno fecondate, pure non sappiamo per anche abbastanza in qual maniera questa fecondazione si faccia; non deve parer dunque singolare che la fecondazione delle piante si faccia diversamente da quella degli Animali. Oltre di chè, se resta ancora incerto il modo con cui succede la fecondazione d'alcune piante, siamo noi forse più informati della maniera con cui la fecondante sostanza agisce sull'ova degli Animali? Molti discorsi sono stati fatti sopra di ciò, molti sistemi si sono inventati; ma siccome questa interna azione non era in verun modo suscettibile d'esperienza e d'osservazioni, sempre duran le tenebre: e perciò il fatto è certo, ma sono ignoti i modi.

Subentrarono alle fermentazioni, ed alle precipitazioni degli Antichi, trall'altre, due ipotesi, che degne parvero più di molte altre d'attenzione e riflesso. Credeva l'Arvey che la cicatricula rinserasse l'embrione, o sieno gli abbozzi dell'intero Animale, i quali stavano aspettando dal maschio le impressioni dei primi moti, o la vita. Non potendo i seguaci di questo celebre Autore comprendere, come una macchina cotanto sorprendente come si è il corpo dell'Animale potesse essere da un'altro formata, hanno sostenuto che tutti i germi preesistessero fin dalla prima creazione. Si dimostra geometricamente che la materia è divisibile all'infinito; ma non si può comprendere come i germi di tutte le successioni d'una specie d'Animale abbiano potuto stare nell'ovaja del primo, che uscì dalle mani del Creatore.

Avendo il Lewenhoechio, coll'ajuto del microscopio, veduti alcuni corpi che si movevano nel liquor femminile, ne ha dedotto che ognuno di questi corpi, che egli considerava come tante specie particolari di vermi, si annicchiassero dentro la cicatricula dell'uovo, che ivi andasse crescendo, che si trasformasse a guisa degli insetti, e che finalmente diventasse un'animale simile a quello che lo aveva prodotto. Quest'opinione si guadagnò i voti della maggior parte; ed il germe osservato dal Malpighi nell'ova covate, e ch'egli teneva come il primo abbozzo del feto, poco dissimile parve dal verme femminile del

del Lewenhoechio. Questo sistema, quantunque ingegnossissimo, è per altro soggetto a delle grandi difficoltà.

1.° Se, secondo il Lewenhoechio, i vermi feminali si trasformano nell'ova, dovrebbero i piccoli animalletti, nel momento che nascono, essere involuppati nelle membrane del feto, simili al *Corion* ed all'*Amnios*, ma si vede, che un pulcino, per esempio, è fasciato negl' involuppi dell'ovo, e che non ne ha veruno che sia di lui proprio: dovrebbero dunque trovare almeno le spoglie dell'Animale che si è trasformato.

2.° Siccome questi vermi emanano da un padre, dovrebbero dunque i figliuoli esser sempre a lui somiglianti; eppure mostra l'esperienza che partecipano del padre e della madre. Un Levriero ed una Cagna barbona fanno i figliuoli, che dell'uno e dell'altro partecipano.

3.° Qual'è l'origine di questi pretesi vermi? Si dirà forse che questi son prodotti da altri vermi, questi pure da altri vermi, e così fino all'infinito? Questa è una supposizione difficile ad ammetterfi, e che altro non fa che trasportare sui vermi quella difficoltà medesima che incontravasi per gli animali.

Alcuni finalmente pretendono, che i corpusculi osservati dal Lewenhoechio, non sieno certamente veri animalletti viventi, ma solamente parti organiche, i quali coll'aggregarsi formar possano dei corpi organizzati. Questo nuovo parere, *in-voco* di illuminarci intorno ad una tal materia, tanto più ci confonde e ci rigetta nel bujo. Tralascio mille sogni che ha fatti nascere questa ricerca. Quel poco che ho riferito basta a farci conoscere in quali errori si perda la mente umana, qualora voglia inalzarsi ad oggetti impercettibili, e calcar quelle strade per cui non può essere guidata nè dall'osservazione nè dall'esperienza. Non recherà dunque maraviglia se in ciò, ch'io mi propongo di dire intorno i vegetabili, io mi fermo a quel segno ove l'esperienza e l'osservazione m'abbandona. Ciò detto, ritorno al mio proposito.

Sono i semi delle piante tante vere ova: e come tali hanno esse bisogno d'essere fecondate per diventar capaci di produrre una pianta simile a quelle che le hanno formate. Hanno dunque necessariamente le piante gli organi dei due sessi: ma quali sono questi organi, e dove stann'eglino?

Egli è chiaro che cercar bisogna gli organi della generazione del-

le piante in quelle parti ove formansi i semi, ove esse ricevono la fecondazione, e dove esse prendono il loro accrescimento: queste parti sono i fiori e le frutta. E quindi devono i Fiori esser definiti, come disse il Linneo: *Gli organi della generazione delle piante le quali servono alla fecondazione dei semi*: ed i Frutti: *gli organi della generazione delle piante i quali servono per il nutrimento del feto*. Quindi tutte le piante che fanno seme, hanno gli stami ed i pistilli: Gli stami sono le parti maschiline, ed i pistilli le femminine. Se dunque, come nel Pero, nel Pesco, nell' Albicocco, trovansi nei medesimi fiori uniti gli stami ed i pistilli, questi fiori, che ho chiamati *completi*, sono ermafroditi, o androgini. Se, come vedesi nel Pino, vi sono alcuni fiori i quali altro non hanno che i soli stami, questi sono i *fiori maschi*, e quelli che hanno solamente i pistilli, chiamansi *fiori femmine*.

Ci ricorderemo di aver già detto, che molti alberi, come il Pero, il Pomo, il Pero ec. fanno i fiori provvisti di stami e di pistilli, o ermafroditi; che altri, come il Noce, facevano sull' istesso albero, ma separatamente, dei fiori da stami, o fiori maschi, e dei fiori da pistilli o femmine; Che finalmente ven' ha di quelli che fanno queste due specie di fiori sopra diversi individui; di modo tale che alcuni altro non fanno che fiori maschi, ed altri sole femmine: Le Palme, i Terebinti sono di questo genere. Questa separazione e questa riunione d'organi appartenente ai due sessi, non mostra niente di contrario a quanto osservasi negli animali; poichè quantunque non abbia la maggior parte che un sesso solo, alcuno ven' ha, come il Lombrico, e la Lumaca, i quali hanno gli organi dei due sessi riuniti nel medesimo individuo. Entriamo adesso nell' interno dei frutti, ed esaminiamo separatamente gli organi appartenenti a ciaschedun sesso. Comincerò dai Maschi.

Tav. VIII. fig. 236. I dieci vasi grandi *aaa* (Fig. 236. Tav. VIII.) portano il sugo alle glandule della rocca *b*, la quale dà loro una preparazione prima che passi per i pediculi delli stami *d*, e da lì alle cime *e*, le quali fanno nel medesimo tempo la funzione degli organi i quali servono immediatamente alla secrezione ed alla preparazione della materia fecondante, e di serbatoio o ricettacolo per contenere la detta materia. Le cime delli stami si aprono; la polvere in quelle contenute è lanciata da tutte le parti, ed in tal guisa apporta la fecondazione.

Non

Non pretendo già di dire che sia questa polvere quella che secondar i semi; poichè, siccome abbiamo veduto ch'ella è formata di piccole vesciche che spontaneamente crepano: e che spandono un'umore preguo di piccioli granellini d'una finezza tale, che quasi gli rende impercettibili, saranno perciò o questi granelli, o forse l'istesso umore, quelli che operano la fecondazione; oppure sarà anche, l'*balitus* del Grevio; poichè eccoci giunti a quei segni cotanto astrusi, che sfuggono alle nostre ricerche.

Gli organi femmine sono in molto maggior numero; Vedi le Fig. 239, 240, 241, 242, 243, 244. Le capsule dei granelli, le quali paragonar si possono alla matrice degli animali, si piantano sopra una specie di *placenta*, a cui vengono a far capo le divisioni dei pistilli, d'onde partonsi i vasi umbilicali i quali appartengono a ciascun seme, come ancora il *plexus reticulare*, e molti altri vasi grandi. Sono queste capsule circondate dalla sostanza acidula e la capsula pietrosa, o vero glandulosa. Tutti questi organi che stanno rinchiusi nel frutto, ed ai quali non ho coraggio d'assegnare un particolare officio, non sono certamente indifferenti all' formazione dei semi. Gli stili eccedono i frutti, e sono terminati dalla loro stigmata, la quale probabilmente è la parte, per mezzo di cui si opera la fecondazione, senza che noi sappiamo in qual maniera ella si operi.

Se intanto ci richiamiamo alla *memoria*, ciò che di sopra abbiamo detto, si comprenderà, che tutte le parti dei fiori, senza eccettuarne i granelli, si formano segretamente entro i bottoni nell' Autunno e nell' Inverno. A Primavera tutte queste parti si distendono; costringono i bottoni ad aprirsi, ed i fiori sbocciano. Allora apronsi le stimate come pure le cime degli stami; la polvere loro schizza da ogni parte, e rimangono fecondati i semi. Sono dunque fecondati i semi nell' interno delle pere? Ora vedremo, che in questa parte medesima elle acquistano il loro accrescimento; ma per finire il mio discorso, ora bisogna dire ciò che succede all' ova tanto degli ovipari, che dei vivipari.

L' opinione più comune si è, che negli animali vivipari l' ova fecondasi nell' *ovaja*; che di là passi per le tube nell' *utero*, col quale contragga una intima unione per mezzo della *placenta*, e si crede che si faccia allora una circolazione dal feto alla *placenta*, e della *placenta* al feto; ma oltre a questa circolazione, il feto riceve continua-

tinuamente del soccorfo dalla madre per mezzo della *placenta*, la quale serve di mediatrice; (questo punto solo ci basta): così nei vivipari il feto riceve continuamente soccorfo dalla madre mentre ch'egli va formandosi. Ma negli Ovipari, la cosa è molto diversa: l'uovo degli uccelli, che è stato formato e fecondato nell'ovaja, cresce in volume per tutto quel tempo ch'egli impiega a passare per un lungo canale, il quale chiamasi l'*Oviductus*; e ne esce fuori provveduto d'una bastante quantità d'alimento per nutrire il feto, finchè formato rompa la sua prigione. E quindi l'incubazione del detto ovo non comincia se non dopo ch'egli è uscito fuori; ed il feto si forma senza ricevere alimento alcuno dalla madre; null'altro allora abbisognandoli, che un conveniente calore.

Rispetto al granello della pera, egli occupa in qualche modo il mezzo tra i vivipari, e gli Ovipari; perchè egli s'incuba nel luogo ove è stato formato, cioè nell'interno della pera. Vi è per altro luogo da credere, che la sua mandorla si formi senza ricevere quasi nessun soccorfo dalla pera, quando non lo ritraesse da quegli umori che erano contenuti nel granello, prima che a formarli cominciasse la mandorla; poichè quando la mandorla comincia a comparire, pare, che le secrezioni rimangano sospese dall'indurimento delle glandule. Così pure nei frutti da nocciolo la mandorla non si forma, se non allora che la nicchia o scatola legnosa è considerabilmente indurita; ed in questa qualità di frutti il vaso umbilicale è allora quasi seccato.

Soggiungo ancora, che se i granelli ricevessero, quando la mandorla si forma, dei soccorsi grandi dai frutti loro, sarebbe per quelli inutile il contenere una provvisione d'alimento simile a quella, che vedesi nell'ova dei vivipari, e che tutti conoscono sotto del nome di *Torlo* e di *Chiara* d'ovo. Ho colte varie noci appena che cominciarono a formarli gli spicchi: in tale stato non contenevano gl'inviluppi, che il solo umore viscoso; ma fatte avendole ammucchiare in cantina, lo spicchio si è quasi formato come se rimasto fosse sull'albero. Ho osservato, che tenendole in luogo asciutto gli spicchi rimanevano molto più piccoli di quello esser dovevano; e ciò sicuramente accadeva, perchè una porzione degli umori, che dovevano nutrirli, s'evaporava per traspirazione.

Ora è d'uopo avere qualche idea della *formazione* dei semi, giusta l'ipotesi del concorso dei due sessi. Non ometteremo di dire per altro,

tro, che questa ipotesi è stata combattuta da molte fortissime opposizioni che ora riporteremo, per mettere i Leggitori a portata di giudicare, se esse sieno bastanti a fare abbandonare un'opinione, la quale sembra appoggiata a fortissime prove, e molto conforme alle leggi generali della natura.

Le Palme entrano tra quegli alberi, che fanno i fiori maschi e femmine sopra diversi individui. Quindi fino ai tempi d'Alessandro, gli Abitatori della Campagna, i quali coltivavano le Palme, conobbero, che molto era importante per la fruttificazione, che questi due individui stassero insieme. Narra Erodoto, che in Oriente ove siasi grand'uso dei loro frutti, i Contadini attaccano i rami delle Palme maschie ai rami delle femmine. Trovasi questo fatto confermato dalle osservazioni del Turneforzio, quantunque questo celebre Botanico non ammetta nei vegetabili l'esistenza dei due sessi.

Prospero Alpino dice, che l'abbondanza delle raccolte dei Datteri, che nascono nei Deserti dell'Arabia, non dipende da veruna particolar coltura; ma ch'ell'è prodotta dalle polveri delli stami trasportate dal vento dai fiori maschi del Dattero sopra dei fiori femmine.

Teofrasto finalmente, Plinio, Prospero Alpino, il Turneforzio, il Kempfero, tutti credono, che senza il soccorso dei fiori maschi avrebbero i Datteri un cattivo sapore, ed i loro noccioli non farebbero atti a generare. Il P. Labat racconta per altro nel suo viaggio d'America, d'aver veduto in un convento del suo Ordine nella Martinica, una Palma isolata e lontanissima da tutte l'altre della sua specie, la quale produceva null'ostante i frutti. Questo fatto non è per altro niente contrario al sentimento dei qui citati Autori, poichè ei soggiunge, che i noccioli di quest'albero non nascevano, e che i frutti non erano buoni come quelli del Levante. Così è parimente di ciò che racconta Giovanni Bacchino, d'aver veduto, cioè, a Montpellier un'antichissima Palma, la quale non aveva fruttato, che all'età di 50, o 60 anni, poichè egli non dice, se i noccioli capaci fossero di germogliare, nè se i suoi frutti fossero buoni.

Le reiterate esperienze dei contadini, non prevenuti certamente a favore di verun sistema, hanno invitata l'attenzione dei Fisici, ed hanno fatto loro conoscere l'esistenza dei due sessi nei vegetabili. Ed altre osservazioni hanno confermato quelle che ho accennate.

Racconta il Geoffroy nella sua *Materia Medicinale*, che nella Sicilia

cilia attaccano i fiori dei Pistacchi maschi sopra i Pistacchi femmine per fecondarne i frutti.

Il Signor Peyssonel, Console a Smirne, ed il Signor Cusineri, Cancelliere a Chio, m'hanno scritto, che in Levante si distinguono i Terebinti, ed i Lentischi in maschi e femmine; che questi ultimi solamente fanno i frutti, e che vien creduto, che gli altri servano a fecondarli. Il Signor Cusineri soggiunge per altro d'aver trovato una specie di Lentisco, che sul medesimo individuo aveva dei fiori maschi e femmine. Io non posso dubitare di questo fatto, perch'egli m'ha mandato dei rami di questa specie di Lentisco, i quali erano veramente con fiori maschi e femmine.

Aggiungerò quì un'esperienza, che ho con molta attenzione praticata. Eravi nel giardino di M. de la Serre, in via S. Giacomo a Parigi, un Terebinto femmina, che fioriva ogni anno, senza che dafse mai un frutto capace di germogliare, lo che dispiaceva a M. de la Serre, che desiderava di moltiplicarne la pianta. Credemmo, M. Bernardo di Jussieu, ed io, di poterli procurare questo diletto col far portare un Pistacchio maschio. Ed in fatti gliene mandammo uno che era carico di molti fiori, e facilmente trasportabile, essendo in un vaso. Fu questo Pistacchio posto nel giardino di M. de la Serre, vicinissimo al Pistacchio femmina, che era in spalliera: in quell'anno medesimo M. de la Serre raccolse una quantità di frutti ben condizionati, che a maraviglia germogliarono. Fu poscia levato il Pistacchio maschio; ma negli anni venturi, il Pistacchio di M. de la Serre non produsse verun frutto capace di germogliare.

Ho un pedale di Vite il quale fiorisce ogni anno, ma non produce mai frutto, perchè i suoi fiori sono senza pistillo. Ho poi delle piante di fravole, le quali sono sterili, perchè non hanno stami.

Si ponno aggiungere a tali osservazioni, ed alla esperienza del Pistacchio poc' anzi detta, molte altre fatte da molti Fisiici: 1.º E' stato osservato, che un fusto isolato di Canapa, di Spinaccio, di Mercorella, ec. non produce se non che pochissima femenza capace di germogliare. Quelli che non ammettono la distinzione dei sessi, dicono, che questa piccola quantità di femenza basta per provare, che il concorso dei due sessi non è assolutamente necessario; ma se un solo gambo di Canapa femmina, il quale trovasi circondato dai piedi maschi, fa molta femenza, e se un simile gambo femmina, il qua-

le

le resta senza soccorso, non ne fa che poca, non se ne deve dunque concludere, che l'emanazioni dei gambi maschi influiscano sulle femmine? E non si potrà anche dire, che i fiori femmine sieno stati fecondati dalle polveri delli stami portate da lontano dai venti, o che sieno stati fecondati da qualche pianta analoga, la quale sarà stata vicina a quello? Poichè sarebbe possibile, che noi prendessimo per piante di diverso genere, dell'altre piante le quali non diversificano in altro che nell'apparenza. Il Levriero è anch'egli un cane come il barbone; eppure la esterior forma di questi due animali è diversissima: ma ciò che scioglie ogni difficoltà si è, il non essere cosa rara il trovare alcuni fiori maschi sopra dei fusti femmine, e viceversa. Il Lentisco di M. Cusineri ce ne somministra un'esempio: ho osservato l'istesso sulla *Gleditsia*, ec. Assicurano alcuni Autori d'aver tagliato le pannocchie del grano Turco, o gli stami a dei Tulipani e ad altre piante, appena erano i fiori aperti quanto bastava per poter fare una tale operazione, e che tutte le semenze erano cascate. Altri dicono, che ad onta di tali operazioni, hanno raccolta qualche semenza. Del resto, potrebbesi dubitare, che troppo tardi fossero stati levati gli stami, e che potesse essere sfolata qualche porzioncella di polvere, e rispondere a tale obiezione, col servirsi di altre ragioni riportate nel precedente Articolo: ed in fatti, mentre non si è potuto veder altro, che qualche buona semenza, se ne deve concludere, che almeno sieno gli stami molto utili per la fruttificazione. Quelli che non ammettono la distinzione sessuale accordano ciò, ma non vogliono che questo succeda per la fecondazione; essi pretendono, che col tagliare quelle parti che ho detto, si vengano a sopprimere i vasi secretorj, o sieno gli organi atti a dare al fugo le preparazioni necessarie al seme. Per distruggere tali pensamenti, mi basta il far osservare, che i semi scorrono parimente quando essi son privi del soccorso delli stami prodotti da altri individui: in tal caso le preparazioni o le secrezioni fatte da un'albero, devono essere indifferentissime ai frutti prodotti da un'altro albero.

Aggiungasi a quanto ho detto, che non possono servire di molto forte opposizione certi casi straordinarj, e che rarissime volte succedono. Per qual cagione, per esempio, si vedono le pannocchie del Sorgo, le quali ordinariamente non hanno che fiori maschi, produrre qualche frutto? Ciò si è certamente, perchè contro
l'or-

l'ordine della natura , si farà in qualche parte sviluppato qualche pistillo.

E' stato corroborato il sistema della fecondazione con alcune ragioni di rapporto , le quali meritano d'essere riferite : 1.^o Si osserva , che la polvere degli stami si spande , quando la stimata dei pistilli sembra disposta a ricevere le influenze di questa polvere secondatrice : 2.^o Appena spirato il termine , in cui credesi , che segua la fecondazione , si seccano gli stami ed i pistilli : 3.^o La disposizione dei pistilli , relativamente agli stami , sembra favorevole per accogliere la polvere ; vero si è , che quando anche ciò non fosse , spandendosi la polvere in tanta abbondanza , che ella forma una specie di nebbia ondeggianti per l'aria , possono alcuni granelli della detta polvere facilmente insinuarsi in quei punti adattati ad operare la fecondazione : 4.^o Le copiose piogge sopravvenienti nel tempo del fiore , fanno cascare i frutti , e specialmente le uve ; lo che par che nasca , perchè l'umido intercetta le dette polveri , e impedisce che esse vadano al loro luogo : 5.^o La maggior parte delle piante acquatiche spuntano fuori della superficie dell'acqua per fiorire , ed alcune si rituffano , appena che sieno i loro frutti allegati : 6.^o Siccome le polveri della medesima specie di piante sono di figura simile , ed all'incontro la figura delle polveri è molto diversa nelle piante di vario genere , e che tutte sono tante capsule organizzate , pare che se ne possa concludere con qualche verisimiglianza , che la polvere degli stami non è un semplice efcremento : 7.^o Se si danno alcune piante , che producono il frutto ma di cui non bene per anche conosconsi gli organi caratteristici dei sessi loro , non si deve per questo concludere ch'esse ne sieno prive : e giacchè gli osservatori Naturalisti vanno ogni giorno scuoprendone , è da sperarsi che col tempo giungeremo a conoscere le parti sessuali dell'altre . Ora riporterò alcune osservazioni da me fatte sopra le piante di cui non ancora ben conosconsi i fiori ed i frutti .

ARTICOLO I. *Osservazioni su di quelle Pianta in cui
per anche non son ben conosciute le parti
maschie , e femmine .*

Tav. X. fig. 269. **LE** Teste dell'*Equisetum* (Tav. X. Fig. 269) sono formate d'un
Fig. 270. corpo conico vuoto (Fig. 270) , il di cui mezzo , nella parte infe-
rio-

riore, rinferra un' eminenza *a* la quale è parimente conica. Vedonsi sulla superficie del cono molti anelli qualche poco tra di loro distanti, e specialmente verso la base del cono; poichè verso la cima essi sono talmente fissi, che si toccano. I detti anelli alla semplice vista non compariscono, che una specie di crosta; ma esaminandoli colla lente, vedesi che son composti di piccioli corpi, come nella *Fig. 271*, *Tav. X. fig. 271.* i quali son simili ai funghi; sono essi formati d'un pedicelo vuoto (*Fig. 272*), e d'un cappello piatto di forma ben regolare tanto di sotto che di sopra (*Fig. 273 e 274*) contornato da cinque o sei cartocci vuoti a guisa di cucchiaino e membranosi (*Fig. 275*): i quali cartocci finchè son verdi, si uniscono abbasso ai pediculi comuni, ma si discostano a misura che si maturan le capsule (*Fig. 274*); vola allora una tenuissima polvere contenuta entro i detti cartocci, come può vederli nella già citata figura. Ho esaminata con ottimi microscopj la detta polvere; e mi è parsa formata di granelli simili a quelli del miglio, armata, o coronata di quattro fili elastici, come nella *Fig. 276 e 277*. Questa osservazione somministra un fatto assai curioso; poichè siccome questi granelli son posti alla rinfusa, appena che li loro filetti o pennacchi trovansi in libertà, cercano da per se stessi di raddirizzarsi; e ciò fassi in virtù di molti divincolamenti simili a quel movimento che far poteffero molti vermi vivi ed ammassati, i quali tentassero di separarli.

Trovansi spesso dei granelli di polvere, i quali non hanno altro che uno, o due, o tre filetti, a causa della poca loro adesione ai granelli; questa istessa ragione fa sì, che spesse volte trovinsi 3, o 4 filetti sprovvisti di granelli.

Ho esaminato con un buon microscopio alcuni dei detti granelli per anche verdi; e m'ha parso vedere, che i filetti terminati fossero da piccole capsule, come in *b* (*Fig. 277*). Chi avrà coraggio di dubitare, che queste sieno le cime delli stami? Egli è vero, che oltre a questi granelli ellittici, ne ho veduti degli altri molto più piccoli *c*, *d*, i quali potrebbonsi considerare come la polvere delli stami; ma potrebbe forse una tal polvere star rinchiusa nelle capsule *b*? Confesso, che ciò non mi sembra probabile: ma checchè ne sia, dopo avere esaminato uno di questi grani ellittici con una lente forte, vi ho scorti alcuni puntini più scuri, ed altri più lucidi *d*. Fino a qui giunfero le mie osservazioni sopra dell' *Equisetum*.

Si

Tav. X. fig. 278. Si trova sotto le foglie del *Polipedo* (Fig. 278) dei piccoli fiocchetti gialli, i quali ad occhio nudo sembrano un'ammasso di piccoli punti di irregolar figura: esaminati poi con lente di cristallo,

Fig. 279. vedesi che questi punti son tanti piccoli globetti (Fig. 279) molto simili all'ova di gambaro, tanto più ch'essi sono di color giallo.

Il microscopio gli fa comparire come un mucchio di piccoli limoncini (Fig. 281) tanto per il loro colore, tanto per la figura. Ho staccato uno di questi fiocchetti per esporli intieri, ed in positura a rovescio, al fuoco d'un microscopio. Ho visto, come può vedersi

Fig. 280. nella (Fig. 280) in gran numero di filetti, che si partono da un centro comune; ciascuno dei detti fili va a terminare in un piccolo corpo della forma d'un limone: uno dei detti corpi esposto al

Fig. 282. fuoco d'una lente acuta, m'ha parso (Fig. 282) esternamente diviso in lobi, quasi come una coccola di Cipresso per anche verde. I Filetti o pediculi che gli sostengono, mi son sembrati diafani e trasparenti, eccettuato un solo punto opaco, che si vede verso il mezzo.

Ho intaccato uno di questi corpi col fuoco del microscopio, facendovi una fessura longitudinale, che andava dal pedicelo alla punta: ed allora non viddi nulla d'osservabile; ma avendo voluto fare la detta incisione trasversalmente, questi piccoli corpi si sono aperti affatto da per sè, come i frutti del *Moncordia*, e con tanta forza, che gettarono lontano del frammenti della capsula, e nel tempo medesimo dei minuti granetti di polvere simili ai granelli di miglio,

Fig. 283. vedi (Fig. 283). Esaminati i detti granetti con acuta lente, mi hanno parso aspersi di piccole punte rilevate; come vedesi sulla fra-

Tav. XI. fig. 284. vola (Tav. XI. Fig. 284). Quando si levano i detti fiocchetti, resta sulle foglie un piccolo incavo ovale (Fig. 284), il quale si è il luogo ove stava attaccato il pedicelo comune.

La lingua di Cervo dalle foglie strette (*), ha nel rovescio delle Fig. 285. sue foglie delle piccole eminenze bislunghe (Fig. 285). Si principia Fig. 286. a vedere colla lente, che queste eminenze son vere capsule (Fig. 286); osservandole col microscopio, si vede ch'elleno son formate da una membrana la quale ricuopre i piccoli granelli della polvere. Quando queste capsule son vicine ad esser mature, s'aprono nel mezzo; e se allora si piega la foglia, che le porta per il verso della lunghezza d'una

(*) *Lingua Cervina angustifolia lucida folio serrato.*

d'una capsula, come per aprirla in due, vedesi ch'ell'è composta di due capsule (*Fig. 287*), e la membrana, che le ricuopre, sembra essere una continuazione dell'epidermide della foglia: esce dalle dette capsule un'infinita quantità di piccoli granellini, i quali esaminati con lente forte, pare che essi pure sieno altrettante capsulette ovali, guernite in una delle loro estremità, e da uno de' lati, d'un cordone fatto a corona, il quale par che faccia un sporto in fuori; ed in quella estremità a cui manca il cordone, vedesi un pedicelo cortissimo (*Fig. 289*). Quando le dette capsule ovali son giunte al loro vero punto di maturità, se allora s'espungano al Sole, o al fuoco d'un microscopio, veggonsi aprirsi con una scossa, e prendere la forma rappresentata dalla *Fig. 290*: poscia immediatamente si chiudono, e prendono la forma rappresentata nella *Fig. 288*. Le quali scosse, che tre o quattro volte ripetonsi, fanno schizzare dei piccoli granelletti ovali e dei frammenti della capsula.

Le capsule della Felce dentata (*) sono formate da una membrana, la quale si stacca dagli orli (*Fig. 291*); ella si avvolge come lo rappresenta la *Fig. 292*; queste capsule si aprono e si rompono (*Fig. 293*) nell'istessa guisa di quelle della lingua di cervo, e ne escono dei granelli di polvere (*a Fig. 294*). Siccome nell'esame di tutte queste piante capillari ho conosciuto, oltre le parti ora descritte, altri corpi, dei quali non è possibile darne un'idea giusta, si potrebbe credere, che queste capsule contenessero, come appunto i Fichi, gli organi dei due sessi, e che la fecondazione clandestinamente si facesse. Un'osservazione di M. Marchand potrebbe dar luogo a credere, che i granelli suddetti fossero vere semenze; poichè avendo questo Accademico riportato dalla campagna diverse specie di Felce, le pose sopra una finestra d'un appartamento terreno della sua casa: furono esse dimenticate; ma l'anno dopo a piè della detta finestra fu trovata molta Felce che si era alzata tra il pavimento. Comunque sia, non volendo io estendere le mie ricerche sopra tutte le piante di cui non per anche ben si conoscono gli organi della fruttificazione, ma dar solamente una passaggiera idea delle osservazioni, che far si potrebbero sopra di ciò, in vantaggio di quelli, che abitando nelle loro campagne non sdegnano di trattenerli in tali fisiche ricerche,

PARTE I.

R

che,

(*) *Filix non tamosa dentata.*

che, senza per altro abbandonarsi affatto ad un compito studio di Bottanica; darò fine a questa digressione, dicendo qualche cosa delle teste del Moscolo capillare dalle foglie un poco larghe (*).

Tav. XI. fig. 295. Questa specie di moscolo è per intiero rappresentata nella Fig. 295, e presso a poco della sua naturale grandezza: quando si espone al microscopio la di lui testa, pare che ella sia una capsula ovoidale formata dell'unione di molti fusi o raggi, e terminata da un cappuccio (Fig. 296): la Fig. 297 rappresenta la detta testa, il di cui cappuccio è separato; e vedesi dentro la capsula una specie di nocciolo parallelamente capsulare, e terminato da un coperchio. Se si

Fig. 296 e 297. fende la detta testa per lo lungo, si scuopre (Fig. 298) nel centro il nocciolo che è verde, e che è circondato d'una sostanza bianchiccia, e tendente più o meno al giallo, secondo i gradi di maturità del detto frutto; il tutto è ricoperto dalla capsula la quale è d'un bel verde: si scuopre sopra la detta capsula un coperchio o cappuccio, al quale stà attaccata una porzione della detta sostanza bianchiccia, il resto chiuso essendo nel frutto: il Nocciolo (Tav. XII. Fig. 299) è formato dalla riunione di molti fusi accoppiati sopra un fondo comune, il quale alle volte distaccasi. La Fig. 300 rappresenta questo

Fig. 298. stesso nocciolo tagliato per lungo, e l'intiero suo fondo. Del resto, quando le capsule son verdi, se ne vede uscire un'umore assai chiaro, nel quale mi è sembrato vedere dei granelli bianchi. La sostanza bianchiccia di cui ho poc'anzi parlato, pare che sia una specie di pasta o di cera ripiena di molti granelli facilmente visibili.

Tav. XII. fig. 299. Ecco qui molti organi i quali sembrano destinati alla formazione delle semenze; ma sono tanto minimi, ch'io confesso, che appena ho potuto distinguerli, ed ancora in modo talmente confuso e dubbio, ch'io non ho coraggio di avanzare congettura alcuna intorno ai loro ufficj: non possono per altro queste incertezze somministrare delle solide obiezioni al sistema generale della fecondazione; ma devono solamente indurre i Fisici a tentar nuovi sforzi per acquistare delle nuove cognizioni sopra d'un punto così importante. Il Micheli ne ha già additata la strada: quantunque non abbia egli di gran lunga approfondata questa materia, gli dobbiamo essere obbligati per aver pubblicato molte bellissime osservazioni. Siccome le ricerche che ho

Fig. 300. fat-

fat-

(*) *Muscus Capillaceus, foliis latiusculis congestis, capsulis oblongis, reflexis.*

fatte sopra le cause che producono delle nuove specie nei frutti, potranno spandere qualche lume sopra della questione del sesso delle piante, perciò le riferirò nel seguente Articolo.

ARTICOLO II. *Delle cause che producono delle nuove specie, o delle varietà nelle Pianta dello stesso genere.*

AVENDO già accennato nella Prefazione del presente Trattato ciò che determinar ci deve intorno alle denominazioni di specie, & di varietà, io non ho difficoltà di qui confondere, all'uso del volgo, questi due termini; e per fissare le idee, ecco a che io restringo lo stato della questione.

Vedo che negli antichi Cataloghi dei frutti molti ne mancano di quelli che al presente conosconsi: vedo che di tanto in tanto scappano fuori dai nostri semenzaj molti frutti di nuova specie: voglio dunque esaminare cosa sia che produca queste novelle specie o queste varietà. Comincerò dal riportare l'usanza ordinariamente praticata dai giardinieri, quando vogliansi avere delle nuove specie di frutti; poscia passerò all'esame di ciaschedun punto di una tal pratica, per arrivare a conoscere ciò che possa il più influire sopra simili cambiamenti.

Per ottenere dei frutti di nuova specie, d'uopo è il raccogliere attentamente i granelli, gli acini, o i noccioli delle specie migliori: per esempio, per le pere, i granelli delle buon-Cristiane, o delle Vergolose, delle Pere Bergamotte, delle San Germane, ec. bisogna metterli in luogo fresco ed asciutto, per poi seminarli sul venir dell'inverno, o sul principio di Primavera, a porche, in un pezzo di buona terra ben governata e lavorata. Devono ivi restare i detti granelli per due anni, o al più tre anni, durante i quali bisogna avere molta attenzione di sarchiare e levare l'erbe cattive; bisogna annaffiare di tanto in tanto i giovani arboscelli, e difenderli dal diaccio, col ricuoprirli con covoni di paglia nei rigidi inverni. Nel secondo, o nel terzo anno, si cavano dal semenzajo, per poi metterli in filare in buona terra.

Mediante il frequente vangarli e zapparli che si farà nel secondo o terzo anno, i piantoncini bene inclinati e disposti, cominceranno a distinguersi dagli altri per il vigore delle loro messe, per la gran-

dezza delle foglie, e principalmente perchè non averanno che poche spine o nessuna.

Quì è dove devonfi più fondar le speranze; poichè è cosa rarissima, che buone frutta s'ottengano da quelle piante, che non produfero se non rami piccoli e storti, stentati, pieni di lunghe spine, e di piccole foglie. Non è già, che tali alberi, i quali si affomigliano a quelli, che naturalmente crescono nei boschi, dar non possano talvolta delle frutta di buon sapore: l'Ambretta è una prova in contrario; ma l'Ambretta è un piccolissimo frutto, oltre di che questi casi sono rarissimi, ed è cosa più certa l'innestare sopra quelle sorte d'alberi conosciuti di buona specie. Debbo avvertire, che certi alberi i quali danno le più belle apparenze, sono anch'essi alle volte soggetti a non produrre se non frutti di mediocre qualità. Le Pere da libbra sono frutti di cattivo sapore, quantunque gli alberi loro molto lusinghino le altrui speranze colla bellezza delle lor foglie, e col vigore dei rampolli. Comunque siasi, non può con certezza decidersi del merito d'un'albero, se non allora, che egli ha cominciato a far frutti; e per questo egli è d'uopo di procurarsene i modi più presto che sia possibile. Per ottenere questo, il metodo più sicuro si è quello d'annestare dei rami di questi alberi giovanetti, che danno buone speranze, sopra dei grossi Peri. Questi innesti metteranno con vigore; e non staranno molto a far frutto: ed allora appunto potrà l'occhio ed il gusto specialmente decidere quali esser possano le specie perfezionabili per via d'innesto e di cultura.

Ecco quì in che consiste questa metodica cultura, ch'io m'accingo ad esaminare in tutte le sue circostanze: prego i miei Lettori a non volerla considerare come una semplice ipotesi, ma a farvi sopra qualche riflessione, ed a risguardarla come una pratica utile, e che merita d'essere conosciuta.

Le circostanze essenziali di questa cultura sono: 1.º Di bene scegliere la semenza: 2.º Di procurare alla detta semenza un sollecito accrescimento mediante una buona cultura: 3.º Di piantare ciaschedun albero in quel terreno, che più siali convenevole: 4.º Di perfezionare le buone speranze colla cultura e coll'innesto. Sembra che in tutto questo dettaglio nulla vi sia, che cagionar possa il cambiamento delle specie, poichè: 1.º Se si scelgano i granelli d'un bello e buon frutto sperar debbelsi, che l'albero, che ne verrà, parteciperà delle buo-

ne

ne qualità di quello che lo ha prodotto; tanto più, che l'esperienza ha fatto vedere, che l'*Amadotta* ed il *Besideri*, che per quanto assicurasi sono stati trovati a caso nei boschi, non sono frutti da mettersi a confronto alla *marbese*, alla *Colmar*, ed alla *pastorale*, che origin' ebbero nei semenzaj. Non è per altro, che trovar non si possono talvolta dei buoni frutti spontaneamente venuti nei boschi; può esser nel bosco cresciuto un granello o seme d'un frutto coltivato. E può servirne d'esempio quella bella specie di bergamotta, che coltivasi a Montigny vicino a Montereau, terra di M. Trudaine, il di cui primo innesto fu preso dal Nonno del Giardiniere presente, da un'albero naturalmente venuto nel bosco di Montigny.

2.º Dalla scelta d'un buon terreno, e dalla più diligente cultura, altro non può sperarsi, che d'aver dei frutti un poco più grossi, di carne più delicata, e di miglior sapore degli altri: daranno queste varietà veramente qualche pregio alle frutta, ma elleno sono accidentali; poichè sa veder l'esperienza, che lo stesso albero, il quale avrà prodotti molti bei frutti finchè sarà stato ben coltivato, piccoli e stentati gli produrrà abbandonato ch'ei venga. Lo stesso è appunto delle esposizioni più favorevoli o meno, e della buona o cattiva qualità del terreno. Egli è noto, che un'albero di Pero buon cristiano piantato al Nord o al Mezzogiorno in una terra umida, o in terra asciutta, seguirà a far frutti, che i meno intendenti conosceranno per *Buone Cristiane*: ma pure, secondo queste diverse situazioni, o secondo la differenza delle esposizioni, avranno le dette pere la pelle verde e grossa, o sottile e tinta di giallo e di rosso; la carne spugnosa ed insipida, o dolce, rompibile e grata al sapore.

3.º In quanto all'innesto, prova l'esperienza, che la medesima specie di pera innestata su del Pero salvatico, non suol'esser mai tanto perfetta come quella, che innestasi sul cotogno: anzi egli è probabile, che a forza di moltiplicare un frutto per via d'innesto, più dolce ne divenga e saporito. Proverò nell'Articolo, in cui tratteremo a posta di questa operazione di giardinaggio, ch'ella non altera in verun conto le specie; e che quand'anche s'annestasse cento volte un medesimo frutto sopra dei varj soggetti con i quali ei possa unirsi, egli avrà talmente conservato il suo carattere, che si potrà sempre facilmente conoscere, ch'egli è la medesima specie di frutto, che il primo albero aveva prodotto.

La natura del terreno, l'esposizione, la cultura, l'innesto non possono dunque cagionare quei rapidi e costanti cambiamenti, dei quali ora cerchiamo la causa. Ho creduto di poterli spiegare con quei cambiamenti analoghi, che si vedono negli animali; e in quella guisa appunto, che dall'accoppiamento di due specie di cani ne vengono degl'individui, che dell'una e dell'altra specie partecipano, e che perciò chiamansi *bastardi*. Io credo, che ogni qual volta trasporterà il vento la polvere delli stami di qualche specie di pera sopra il pistillo d'un'altra specie, ne risulterà una semenza, il di cui germe parteciperà dell'una e dell'altra. Ed infatti egli è noto, che la maggior parte dei frutti, che i Giardinieri chiamano *nuovi*, altro non sembrano essere, che tanti composti di frutti vecchi. La *Colmar*, per esempio, creduta dai Giardinieri venuta da un seme della *buona cristiana*, ella sembra effettivamente composta della *buona cristiana* e della *bergamotta* d'Autunno.

Son persuaso, che se attentamente si assaporassero i frutti delle nuove specie, si troverebbero molti esempi di simili bastardi: confesso per altro, che si trovano dei frutti d'un sapore e d'una forma talmente straordinaria, che malagevol sarebbe di rintracciarne l'origine; ma questi rari esempj atti non sono a distruggere la mia congettura, poichè possono questi *capricci esser prodotti* da un mescolglio di due fughi; tanto più, che negli animali, come nei cani, frequentemente succede l'incertezza medesima.

Il contrario di una tale osservazione vedesi in certi frutti, nei quali sono le specie abbastanza distinte, per poter mangiare uno spicchio d'un frutto separatamente da quello col quale egli è congiunto: fin dal momento della fecondazione. Tale si è, per esempio, tra gli Aranci, la specie, che impropriamente chiamasi l'*Ermafrodita*, o il *mostru*, la quale sull'istessa pianta produce dei Limoncelli di Napoli, dei Cedri, e delle Arancine separate, ovvero anche riunite a quarti o a spicchi nel medesimo frutto: tale è parimente quella specie d'Uva, la quale sul ceppo istesso produce dei grappoli neri e dei grappoli bianchi; o altri ancora, che hanno i granelli o acini mezzi rossi o a quarti bianchi e rossi. Io credo, che attribuir si possano queste varietà al mescolglio delle polveri delli stami. Accade spessissimo, che nel medesimo parto faccia una Cagna i cagnolini, alcuni dei quali sieno similissimi alla madre, altri al padre, ed altri partecipino d'ambe.

bedue; o sieno talmente confusi, che parte alcuna di quelli in verun modo alle parti della madre, nè del padre somigli, nè abbiano parte alcuna abbastanza distinta, per poter dire, che una porzione del loro corpo al padre, ed un'altra alla madre somigli: ciò che assicurar posso si è, che ho tentato senza riuscita tutti i mezzi proposti dagli Scrittori, come atti ad operare queste stravaganze della Natura.

Credo adunque, che si possa ricorrere alla medesima congettura, per dar ragione delle infinite varietà, che certi generi di piante somministrano; poichè elleno tanto più son frequenti, quanto più trovansi in maggior numero diverse specie di un istesso genere insieme radunate: ed all'incontro le piante d'un medesimo genere cresciute nella aperta campagna, siccome in certo modo isolate, varietà veruna non danno. Ne riporterò degli esempj.

Non v'ha chi non sappia, che tutti i *Rosolacci*, o i *Salvaticchi Papaveri* spontaneamente cresciuti nei campi, fanno dei fiori rossi; che le Primavere dei Prati fanno i fiori color di limone; e che queste istesse piante trasportate poi nei nostri giardini, producono moltissime varietà. D'onde nascerà mai una tal differenza? Io l'attribuisco alla fecondazione d'una pianta coll'altra; ed ora riporterò un'esperienza, che basterà a convincere, che questa tal causa realmente esiste nella natura.

Supponghiamo che levifi da un prato una barbatella di queste Primavere, le quali ordinariamente non fanno che fiori color di limone; che si divida la detta barbatella in due, che una metà si pianti in luogo distante da qualunque altra Primavera, e l'altra in un giardino, in una striscia di terra in cui abbianfi seminate delle Primavere di tutti i colori: egli è certo, che queste due barbatelle produrranno, come nei prati, dei fiori color di limone; ma se si raccolgano i semi, che verranno da queste due barbatelle, e che separatamente si seminino; si osserverà 1.^o Che le piante, che verranno dai semi prodotti dalla barbatella lasciata isolata, non daranno, che de' fiori gialli simili a quelli dei prati, perchè i semi non avranno potuto che da per sè soli fecondarsi; ed all'incontro le piante, che nasceranno dalla barbatella allevata nella striscia, produrranno alcune varietà; perchè alcuni semi avranno potuto essere fecondati da altre vicine piante. Dico che si otterranno alcune varietà, perchè la maggior parte degli embrioni saranno stati fecondati dalla pianta me-

defima ; e che in oltre molti di quelli , che faranno stati fecondati dalle piante vicine , conſerveranno tuttavia una diſpoſizione a partecipare della natura della pianta che gli ha prodotti .

Credo che a queſta iſteſſa cauſa attribuir ſi poſſa la fortuna d'alcuni Fioriſti , i quali per via dei ſemi ſi ſono procurati delle belle varietà ; poichè nulla v'ha che più atto ſia a procurarle quanto la ſpecial diligenza che uſano certi dilettranti di meſcolar nei loro quadri i Tulipani , l'orecchie d'orſo , le ſemidoppie ec. L'oggetto loro ſi è veramente di dilettrar l'occhio colla diverſità , e di procurarſi un bel ſmalto o tappeto , il quale rieſce ſempre più dilettevole che una uniformità di colori ; ma ſenza accorgerſene , ſi procurano un vantaggio , da eſſi il più delle volte attribuito alle diverſe infuſioni nelle quali poſti avevano i ſemi , ad alcuni colori meſcolati nella terra del loro giardino , a degli oggetti diverſamente colorati , che poſti avevano in ſaccia alle piante , o finalmente ad una particolar grazia del puro caſo . Ho voluto provare , ma ſenza alcun frutto , queſte infuſioni , e queſti meſcugli di colori , ed ho creduto inutile ogni eſperienza per gettare a terra gli altri due mezzi .

Poſſono gli attenti Oſſervatori trovar molti eſempj di ſimili varietà negli orti , e laſciare omai d'attribuire alla natura del terreno que' tali cambiamenti , con dire , che le loro piante degenerano . Ne riporterò un eſempio certamente molto conveniente .

Coltivaſi nei noſtri Orti , la Rapa Corallo , o ſia la barba di biſtola , la quale è quella Rapa roſſa , che ſi ſemina nei contorni di Parigi ; Coltivaſi parimente una Rapa bianca e meno delicata , che chiamafi Ravanello o Ramolaccio ; finalmente delle Radici bianche e delle Radici bigie . Quando ſi ſeminano le ſemenze delle dette piante , che ſi fanno venire da quei paefi ove comunemente coltivanſi , ſi raccolgono le dette radici , perfeſſiſſime ciaſcheduna nella loro ſpecie ; ma avendo oſſervato , che i ſemi che ſi raccolgono nei noſtri orti , ci danno dei baſtardumi , che più o meno di queſte diverſe radici partecipano , abbiamo preſo il compenſo di piantar molto tra di loro diſtanti quei capi , dai quali vuolſi prendere il ſeme ; ed in tal guiſa le noſtre ſpecie conſervanſi più coſtantemente le iſteſſe : la medefima oſſervazione , che parimente fatta abbiamo ſulle Carote pallide , ſulle gialle e le roſſe , conferma pure ciò , che ſi è detto , che reſultar poſſa dalla meſcolanza delle polveri ; come anco-

ra

ra ciò che abbiain detto nel precedente Articolo intorno al sesso delle piante.

Dopo di questo, facil cosa si è il comprendere quanto infinita sia la moltitudine delle varietà, che nascer deve da questi diversi mescugli: ed infatti quando la polvere delli stami d'un'orecchio d'orfo rosso avrà fecondato un'orecchio d'orfo bianco, deve il granello, che ne verrà, necessariamente produrre delle piante, i di cui petali non solamente saranno rossi o bianchi, o macchiati di rosso e di bianco, ma i di cui embrioni e le polveri delli stami parteciperanno ancora dell'una e dell'altra pianta; di modo che una di queste piante non ha più di bisogno, per esser picchiata, d'essere in appresso fecondata da un'altra, poichè ella non solamente averà la disposizione delle parti atte a produrre il rosso ed il bianco, ma quella eziandio di operare le diverse mescolanze di questi due colori, i quali insieme poi combinati risulteranno molte differenze gratissime all'occhio.

Potrei applicar quanto ho detto al giallo, al turchino, al rosso, al verde; ma credo d'aver detto abbastanza per far comprendere, che la moltitudine delle varietà è tanto estesa quanto esser lo possono le combinazioni, che dai diversi mescugli risultano; e nulla v'ha di più conforme quanto ciò che si osserva nella moltiplicazione degli animali. Ho tenuto dei Pavoni azzurri, i quali ogni qual volta covavano facevano dei Pavoni azzurri e dei Pavoni bianchi, perchè questa razza veniva da un Pavone azzurro e da un bianco. Ho veduto dal Signor Marchese di Gouvernet, un Pavone d'una rara bellezza, ed aveva le penne parte bianche e parte azzurre. Insomma, come ho già detto, due Cani di diversa specie produrranno dei bastardi: questi bastardi ne produrranno degli altri; e questi diversi mescugli genereranno col tempo un'infinito numero di varietà.

Seguendo sempre il sistema del mescuglio dei sessi, facilmente comprendesi, che la diversa organica disposizione delle parti deve impedire la confusione dei generi; e che se ciò talvolta succede, altro non potrà nascere, che un mostro, il quale non farà certamente nascerne un'altro simile a lui. Parimente comprendesi, che la sproporzione della grandezza e grossezza nelle piante d'un medesimo genere, deve essere un'ostacolo alla mescolanza delle specie, come pure la differenza della stagione in cui esse fioriscono. Lo Zafferano Autunnale non può essere fecondato dallo Zafferano di Primavera. Ed a qualche-

cheduna di queste cause si può attribuire la costante uniformità, che si vede in certi generi, e per la stessa ragione appunto il grano, l'orzo, e la segala, che feminansi nei campi, non producono delle specie mezzane: e se si vede, che due piante, le quali hanno apparentemente molta somiglianza tra di loro, stan confuse nel campo istesso senza alterarsi e mischiarsi, mentre che altre dissimili nel portamento, s'accoppiano e producono delle varietà; ciò nasce da quella causa medesima, che agisce ancora negli animali. Vi è, a mio credere, una maggiore analogia tra il Pollo d'India, ed il Pavone, che tralla domestica Gallina ed il Fagiano; eppure mi hanno molti assicurato, che la Gallina riceve il Fagiano per il suo gallo; ed io ho visto per esperienza, che la Tacchina o Pollo d'India ricusa il Pavone.

Credo per altro, che confondere non si debbano con queste varietà certe mostruosità, o per meglio dire, certe malattie, che molti Scrittori hanno malamente prese per nuove specie: tali appunto sono le piante a gambo piatto, quelle dalle foglie picchiate, quelle dai fiori doppi, ec. Ne parlerò nell'Articolo seguente.

ARTICOLO III. *Delle Mostruosità delle parti delle Piantе.*

L'ESAME dei fiori e dei frutti mi ha condotto a trattare delle mostruosità; e queste mostruosità qualche cosa a dir m'impegnano di certe malattie le quali cagionano delle difformità. Di tal genere sono le galle, che si formano sulle foglie delle piante, sui fusti, su i castoni, ec. Egli è noto, per esempio, che le foglie degli Olmi, le quali esser sogliono ordinariamente sottili, formano alle volte delle vesciche grosse quanto una noce (Fig. 301 e 302), nelle quali trovansi degli insetti ed un fugo fitto, a cui si attribuisce qualche virtù salubre per le piaghe (*). Non porrei mai fine, se fare io volessi la enumerazione di tutte le galle o gallozzole, grosse e piccole, le quali formansi sopra le foglie di quasi tutti gli alberi; quindi mi contenterò di dar per esempio quella che cresce sulle foglie della Quercia, e che vien comunemente detta *Gallozzola*. Sono talvolta

Fig. 303. gli stami della Quercia carichi di galle tenere e colorite (Fig. 303) le

(*) Si può vedere, intorno a questa sorta di vesciche, ciò che dice il Malpighi ed il Geoffroy; Istor. dell'Accadem. dell'Anno 1724.

le quali potrebbero esser prese per frutti (1). Il Turneforzio (2), parlando delle galle, che si formano sulla *Salvia* in Levante, dice, ch'elleno sono buone a mangiarsi, e che si portano a vendere per i mercati.

Gli stami del Terebinto formano anch'essi talvolta delle vesciche in forma di due corni, nelle quali si trovano degl'insetti, e della limpidissima trementina. I pomi dello Spino o Pugnitopo, o quelle singolari concrezioni, che si trovano sul Rovo (*Fig. 304*) ci danno un'efempio delle galle, che si formano sui rami. Essendo già stata data in luce qualche opera molto interessante in cui trattasi espressamente di queste sorte di galle, mi basta di dire in generale, ch'elleno sono tutte formate dalla beccatura d'alcuni insetti, e che servono di ricovero alle loro uova, le quali poi nascendo, producono in quelle parti dei tumori accidentali, ch'egli è ben conoscerli, per non confonderli colle naturali produzioni delle piante. Cade eziandio in acconcio il premettere, che si trovano su d'alcune piante dell'altre produzioni, che non son loro proprie, e quella che chiamasi Grana di scarlatto è di tal genere; ella trovasi sui piccoli Lecci; vien detta *Kermes*. M. de Reamur ha con forti ragioni provato, che questa pretesa grana (3) altro non è che un tumore cagionato dagl'insetti simili presso a poco alle cimici degli Aranci; che i detti insetti si fermano sui rami del piccolo *Ilex* (4) alimentandosi della loro sostanza, s'ingrossano là dove si sono attaccati, e non cambiano mai situazione finchè vivono: queste circostanze hanno impegnato M. de Reamur a chiamar tali animali *Galle-insetti*.

Tav. XII. fig. 304.

Avvi un'altra specie di mostrosità, la quale nasce da uno sviluppo contro natura d'alcune parti delle piante. Non è cosa rara, come altrove abbiain detto, il vedere gli stami d'alcuni fiori distendersi a guisa di petali. In tal guisa molti fiori doppj si formano. Quando tutti gli stami si convertono in petali, allora i fiori sono stradoppj, ma egli è vero altresì, ch'essi non fanno frutto: ciò quasi sempre succede ai Garofoli o Viole; e nell'altre piante, come i Ra-

nun-

(1) M. Marchand le ha fatte incidere nell'antiche *Mémoires* dell'Accadem.

(2) Viaggio di Levante, del detto Autore.

(3) *Coccus infestoria*.

(4) *Ilex aculeata coccis glandifera*, C. B. Pin.

nuncoli e le semidoppie, tanto più si diminuisce la fecondità, quanto maggiore si è la quantità delli stami che si convertono in petali.

Non è raro il trovare in questa sorta di fiori doppj degli stami, che sono solamente per metà cangiati in petali (Fig. 305). Ho una specie di Visciole ed un Ciriegio, che fanno i fiori stradoppj, loro mancano tutti gli stami, e i detti fiori non danno mai frutto. Ho un Ciriegio, che fa i fiori solamente semidoppj; siccome egli conserva delli stami abbastanza per fecondare i suoi frutti, alle volte egli ne fa in buona copia. La maggior parte delle rose sono di questo genere, come pure molte altre piante dal fior stradoppio, alle quali restano tuttavia delli stami. Ma si offervi, che la fruttificazione è sempre meno copiosa nelle piante semidoppie, che nei fiori semplici.

Anche i pistilli vanno soggetti a simili mostruosità; ma ordinariamente invece di formar dei petali, come fanno gli stami, essi si cangiano in foglie. Ho una specie particolare di Ciriegio i di cui pistilli formano molte volte due piccole foglie appuntate, ed allora i fiori sono sterili. Vedonsi pure talvolta delle rose il di cui pistillo trasformasi in un ramo carico di foglie, o d'un secondo fiore

Fig. 306. (Fig. 306). Siccome questo accidente nasce in molte altre piante, ciò ha dato loro il nome di *prolifere*. I Garofoli o Viole vanno

Fig. 307. spesso soggette a questa mostruosità: eccone un esempio nella Fig. 307, in cui il gambo è segnato *a*, *b*, il calice lacerato, e che nulla ha di singolare; *c* qualche petalo situato come ordinariamente suol' esserlo: se ne è solamente disegnata una parte per evitare la confusione; *d* gli stami, i quali come il pistillo, prendono origine da un corpo carnosio, su di cui stà ordinariamente piantata la capsula dei semi, ma che nel presente esempio è rimpiazzata da un'altra Viola o Garofano *e*, il quale ha un calice, dei petali, delli stami, un pistillo, e che fa dei semi. Ho veduto nel giardino dei Certosini di Parigi, un Pero giovane carico di frutti: vedevansi uscir dall'occhio di quasi tutte le pere un ramicello o un fiore, e qualcheduno di quei fiori che allegato avevano il frutto producevano una pera doppia,

Fig. 308. che usciva dalla estremità dell'altra (Fig. 308). Succede spesso qualche cosa di simile ad una specie di Cedro, quando non fosse, che il frutto soprannumerario stesse rinchiuso, o in parte, o talvolta anche tutto, nel vero frutto.

GI'

Gl' insetti, che attaccano i frutti da una parte, la grandine; o qualche altro accidente rendono i frutti difformi per la mancanza di qualche parte; ma ve ne sono di quelli, che si possono considerare come rachitici, perchè la loro difformità nasce dal loro interno. Potrebbe darfi, che qualcheduno dei principali vasi inservienti alla formazione della carne sofferto avendo qualche alterazione, si faccia irregolarmente l'accrescimento del frutto, e che da ciò provenga quel contorno irregolare, che si vede nei frutti in tal guisa offesi.

Non ho mai veduto una difformità tanto singolare, prodotta da questo principio, quanto quella che successe ai frutti d'un Prugno mirabolano: quasi tutti i frutti del medesimo avevano delle forme stravaganti, molte delle quali ne descriverò: ponno queste vederfi nelle Fig. 309, 310, 311, 312. Quelle (Fig. 309) erano bucate nel mezzo *a*, vuote di dentro, e altro non avevano, che un piccolo rimafuglio di nocciolo verso l'estremità superiore *b* (Fig. 310): altri meno difformi al di fuori, altro non erano, come nelle Fig. 311 e 312, che una semplice vescica vuota, in cima alla quale, verso *c*, vedevasi l'apparenza d'un piccolissimo nocciolo: altri finalmente erano di forma anche più stravagante: sene potrà avere un'idea dalle Fig. 313 e 314, in cui i detti frutti copiati dal naturale, sono contrassegnati colle Lettere *d*, *e*, *f*, *g*, *h*. Tav. XII. fig. 309. Fig. 310. Fig. 311. Fig. 312. Tav. XIII. Fig. 313 e 314.

Non ho potuto sapere, se tali accidenti originati fossero dalla punteggiatura di qualche insetto, o da una soprabbondanza di sugo, per essere stato molto piovoso quell'anno. Leggesi nelle memorie dell'Accademia Reale delle Scienze, che M. de Reamur andando da Saumur a Thouars, osservò, che tutti i pruni, che vedeva camminando, avevano tutti i frutti offesi da una simile mostruosità; che i frutti degli altri alberi erano nello stato suo naturale, e che questa malattia particolare dei Pruni non si stendeva lungo la strada, che per lo spazio di quasi cinque quarti di lega: osservò in oltre, che sopra questi medesimi Pruni, i quali facevano tanti frutti così mostruosi, altri pure ve n'erano belli e perfetti.

Molti frutti diventano mostruosi per soprabbondanza di parti. Andando alle volte il nutrimento troppo copioso a fissarsi in una parte, ivi fanno un mostruoso sviluppo: ciò osservasi principalmente sopra d'alcune specie di Colloquintidi, di Cìrìegie, e di Limoni; talvolta ancora tali addizioni di parti dipendono dagl'innesti, che si fan-

fanno nel bottone istesso. Quel particolare accidente, che produce quei frutti che chiamansi *Gemelli*, accade il più delle volte a quei frutti, che radunati stanno più alla volta nel bottone medesimo. I Fiori che stanno stretti insieme, anch'essi si uniscono, s'annestano a vicenda; e se accade talora, che due embrioni trovinsi in tal guisa abbracciati, ne risulta un frutto doppio; ed allorquando l'unione di questi due frutti si fa in una maggiore o minore estensione, i frutti in tal guisa congiunti acquistano relativamente l'uno all'altro una maggiore o minore estensione, dal che talvolta ne nascono delle stravaganti forme.

Tav. XIII. fig. 315. La *Figura* 315 rappresenta due prugne attaccate ad un gambo

Fig. 316. comune, largo e stacciato, come vedesi nella *Fig.* 316: hanno am-

Fig. 317. bedue un nocciolo ben formato *b b* (*Fig.* 317), e sono d'un'uguale grandezza. Spesso succede, che l'uno dei due frutti sia molto grosso, e l'altro piccolissimo: tra poco ne vedremo un'esempio.

Sebbene una simile riunione di molti frutti sia più comune in quelle specie in cui molti frutti racchiudonsi nello istesso bottone, pure se ne vedono eziandio dei simili nei frutti solitarj. Addurrò per

Fig. 318 e 319. esempio il Carciofo, come vedesi rappresentato nelle *Fig.* 318 e 319;

Tav. XIV.

Fig. 320 e 321. un Popone (*Fig.* 320 e 321. *Tav.* XIV.) ed i Cucumeri o Cetrioli

Fig. 322 e 323.

(*Fig.* 322 e 323). Nella *Fig.* 222 il piccolo Cetriolo *a* si parte immediatamente dal più grosso *b*; ed ha un gambo suo particolare, il quale è assicurato al corpo del Cetriolo più grosso. Nella *Fig.* 323, il piccolo Cetriolo *a* non stà attaccato al grosso *b*, che per una fem-

Fig. 324. plice membrana. La *Fig.* 324 fa vedere una foglia, che erasi incalmata per il gambo su d'un grosso Cetriolo. Egli è ragionevole

il credere, che nei due Cetrioli 322, e 323, vi si fossero trovati due pistilli nel medesimo fiore; poichè vedesi il resto dei pistilli in cima dei piccoli Cetrioli, come pure in cima del grosso. Vedesi

Fig. 325. (*Fig.* 325) due pomi strettamente uniti; e quello che essi hanno di singolare si è, che il più piccolo che pareva abortito, conteneva dei granelli ben condizionati, come dimostra la spaccatura dei detti po-

Fig. 326. mi (*Fig.* 326).

Simili innessi io credo che si facciano alle volte nei bottoni da legno; poichè io penso, che essi appunto sieno quelli che producono quei rami stacciati e larghi, che vedonsi alle volte sui Frassini, sui Salci, ec. Quando si supponga, secondo una tale idea, che molti rami

mi

mi si sieno annessati accanto gli uni agli altri, potrà succedere, che essi non crescano ugualmente, e che allora quello, che crescerà di più, obbligherà l'altro a ripiegarsi e a non fornire in tutti due altro che un ramo solo, che termina in una specie di voluta, o come una grucciona: ed infatti moltissimi di questi rami stacciati prendono una simile forma.

M. Bonnet ha riportato molti esempj di foglie, che si sono tra di loro annestate entro i bottoni.

Da quanto abbiamo detto si raccoglie, esservi delle mostruosità le quali dipendono, 1.^o da una soprabbondanza di sostanza, o sia ella causata da un'insetto, o sia ch'ella dipenda dalla interna organizzazione: si ponno paragonare tali mostruosità ai bubboni, ai tumori, all'exostosi, o sopr'ossi: succede parimente, che negli animali certe parti acquistano una straordinaria e smisurata estensione: 2.^o altre mostruosità dipendono da una mancanza di nutrimento, il quale avrà ristrette certe parti ad un mediocre accrescimento, e l'altre intanto avranno già acquistata una maggiore estensione: tali mostruosità ponno essere paragonate alla rachitide, la quale rende deformi molti animali.

3.^o Avvi un'altra causa di mostruosità, la quale tanto è comune al Regno vegetabile quanto all'animale; e questa si è la riunione di due Embrioni in tutto, o in parte.


Non conosco per altro cosa alcuna negli animali, che possa essere paragonata a quelle mostruosità, che producono dei fiori doppi e dei Proliferi. Si vede, che queste mostruosità particolari dei vegetabili dipendono dalla interna disposizione degli organi: poichè, come abbiamo già osservato nell'Articolo degli stami, questi organi maschi sono in gran parte formati dalle medesime sostanze dei petali. Uno sforzo del fugo può bastare a produrre uno sfiancamento delle capsule, le quali formano le cime o le antere, ed allora quelle parti diventano tanti veri petali.

In quanto alle produzioni mostruose dei pistilli, siccome abbiamo già fatto osservare, che i vasi dei rami si prolungano nei gambi, ed anche nell'asse di certi frutti fino al pistillo, sorprende meno il vedere questa parte diventare una foglia oppure un ramo. Confesso per altro, che tutto ciò non deve essere considerato, che come tante pure congetture che hanno bisogno di valide prove, o che possono


sono essere distrutte dalle osservazioni dei Fisici , i quali esaminar vorranno attentamente , e con nuovi metodi , queste mostruose produzioni .

Non debbo omettere di fare osservare , che talvolta accade , che le produzioni mostruose si perpetuino nella posterità d'una medesima specie ; poichè , per esempio , il seme d'un garofolo il quale abbia alcuni petali soprannumerarj , è più atto a dare dei garofoli doppij , di quello lo sieno i semi raccolti da quei talli o piante , che facefsero tutti i fiori semplicissimi ; ed hanno ben ragione i Fioristi a raccogliere i semi dei Ranuncoli detti *Semidoppi* , sulle piante , che sono le più doppie . Egli è lo stesso di questi come degli animali , tra i quali vedonsi delle intiere Famiglie , che conservano il medesimo difetto di conformazione , tanto internamente che esternamente .

Fine del Libro terzo.

Fig. 8.*Fig. 9.**Fig. 15.**Fig. 16.**Fig. 17.*











Fig. 11.*Fig. 12.**Fig. 9.*

Fuori degl' Alberi Libro I. Tav. 5.


*Fisica deol' Alberi Libro I. Tav. 6.**Fig. 4.**Fig. 5.*




Fig. 3.*Fig. 5.**Fig. 8.**Fig. 9.*



Fisica deal' Alberi Libro II. Tav. 8.







Fisica dell'Alberi Libro II Tav. 11.


Handwritten text, possibly a list or notes, including the number 70 and the word "of".







Fisica degl' Alberi Libro II. Tav. 13.












Fisica degl' Alberi Libro III. Tav. 2.



Fisica deol'Albeni Libro III. Tav. 4.

*Fisica degl' Alberi Libro III. Tav. 5.**Fig. 140.**Fig. 142.**Fig. 147.**Fig. 161.**Fig. 166.**Fig. 162.*



182.



Fig. 183.



Fig. 184.



Fig. 185.



Fig. 186.



191.



Fig. 192.



Fig. 193.



Fig. 195.



Fig. 197.



Fig. 198.



Fig. 200.



Fig. 202.



Fig. 203



Fig. 204.



Fig. 206.



Fig. 207.



Fig. 208.



Fig. 211.



Fig. 212.






Fig. 240.



Fig. 241.



Fig. 245.



Fig. 246.



Fig. 247.



Fig. 251.



Fig. 252.



Fig. 257.



Fig. 258.



Fig. 265.



Fig. 266.



Fig. 267.



Fig. 269.



Fig. 268.



Fisica deol' Alberi Libro III Tav. 10.

Fig. 272.



Fig. 273.



Fig. 276.




Fig. 277.



280.



Fig. 281.



Fig. 283.





Fig. 285.



Fig. 286.



Fig. 288.



Fig. 292.



Fig. 293.




Fig. 297.



Fig. 298.



Fig. 302.*Fig. 303.**Fig. 304.**Fig. 308.**Fig. 310.**Fig. 312.*




*Finca deol' Albers Libro III. Tav. 13.**Fig. 314.**Fig. 319.*



Fig. 322.



Fig. 326.




Fig. 325.



Z

5.4.422

5.4.422



005662125

